



Um aus den Eigenschaften des Arzneimittels Eziclen® den größtmöglichen Nutzen für Ihre Gesundheit zu ziehen, die korrekte Anwendung zu gewährleisten und unerwünschte Nebenwirkungen zu begrenzen, sind bestimmte Maßnahmen/Vorkehrungen zu beachten, die in dem vorliegenden Material erläutert werden (RMA-Version 10/2025).

EZICLEN®

konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Wasserfreies Natriumsulfat,
Magnesiumsulfat-Heptahydrat
und Kaliumsulfat

INFORMATIONSBROSCHÜRE FÜR PATIENTEN

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie Eziclen® Medikamente einnehmen. Der vollständige und aktualisierte Text dieser Packungsbeilage ist auf der Website www.fagg.be unter der Rubrik "Packungsbeilage und Fachinformationen eines Arzneimittels" verfügbar.

INDIKATION:

Eziclen® wird bei Erwachsenen verwendet, um Ihren Darm zu reinigen, bevor eine medizinische Untersuchung oder ein chirurgischer Eingriff am Darm durchgeführt wird.

Eziclen® ist keine Behandlung einer Konstipation (Verstopfung).

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI GEBRAUCH:

Zur sachgerechten Anwendung von Eziclen® sollten Sie wissen, dass:

- die Aufnahme der richtigen Flüssigkeitsmenge erforderlich ist und die Eziclen®-Lösung nicht direkt, sondern erst nach Verdünnung eingenommen werden darf, immer gefolgt von der Einnahme von zwei zusätzlichen Gläser Wasser oder eines klaren Getränks;
- Sie mindestens eine Stunde vor Beginn des Eingriffs nichts trinken sollten, wenn keine Narkose vorgesehen ist; ,
- Sie im Falle einer Narkose mindestens zwei Stunden vor Beginn des Eingriffs unter Beachtung der Anweisungen des Narkosearztes nichts mehr trinken dürfen;
- Sie einen Tag vor dem Eingriff keine feste Nahrung oder Milchprodukte essen dürfen und dass es sehr wichtig ist, während und nach der Einnahme von Eziclen® bis zum Abschluss des Eingriffs nur klare Getränke (keinen Alkohol oder rot- oder violettfarbene Getränke) zu sich zu nehmen, um eine Austrocknung zu verhindern.

Kontaktinformation des Zulassungsinhabers:

MAYOLY PHARMA FRANCE
3, Place Renault
92500 Rueil Malmaison
Frankreich

EZICLEN® Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Wasserfreies Natriumsulfat,
Magnesiumsulfat-Heptahydrat und
Kaliumsulfat

Arzt:

Datum:

Am:

Ort:

Schema:

- EIN-TAGES-PLAN:**
2 Dosen am Tag VOR dem Eingriff
- ZWEI-TAGES-PLAN (GETEILTE DOSIERUNG):**
Erste Dosis am Tag VOR dem Eingriff
Zweite Dosis am Tag des Eingriffs

► BEDEUTUNG VON AUSREICHENDEM TRINKEN

Da Durchfall zu Dehydrierung führen kann, ist es sehr wichtig, dass Sie diese Anweisungen genau befolgen und klare Getränke in ausreichender Menge trinken, um eine ausreichende Hydratierung zu gewährleisten.



Die folgenden klaren Getränke sind erlaubt:

Klare Getränke wie Wasser, Tee oder Kaffee (ohne Milch oder alternativer Kaffeesahne), ungefärbte rote oder violette Erfrischungsgetränke (mit oder ohne Kohlensäure), Fruchtsaft (**ohne** Fruchtfleisch), Bouillon oder klare Suppen, die gesiebt wurden, um alle festen Nahrungsbestandteile zu entfernen.



NICHT trinken:

Milch, rot- oder violett-gefärbte Getränke, Alkohol, Fruchtsäfte oder Erfrischungsgetränke **mit** Fruchtfleisch.

WIE SIE SICH AUF DEN EINGRIFF VORBEREITEN MÜSSEN

Um sicherzustellen, dass Ihr Darm vollständig gereinigt werden und der Eingriff gut verläuft, ist es sehr wichtig, dass Sie folgende Anweisungen befolgen. Am Tag vor dem Eingriff können Sie ein leichtes Frühstück zu sich nehmen; danach sollten Sie **NUR klare Getränke** zu sich nehmen und kein Mittagessen, Abendessen oder eine andere Mahlzeit einnehmen, bis der Eingriff erfolgt ist.

WIE SIE EZICLEN® EINNEHMEN?

Die Zubereitung von Eziclen® beinhaltet **2 Dosen**, die **wie folgt eingenommen werden müssen**:

► Datum erste Dosis:

Beginn am:

ERSTE STUNDE



Gießen Sie den Inhalt **eines Fläschens Eziclen®** in den Becher.



Wasser bis zur Bechermarkierung hinzufügen.



Nehmen Sie sich Zeit (**eine halbe bis eine Stunde**), um den Becher vollständig auszutrinken.

ZWEITE STUNDE



WICHTIG
Trinken Sie in der nächsten Stunde **2 weitere Becher mit Wasser (oder erlaubten klaren Flüssigkeiten)**.

► Datum zweite Dosis:

Beginn am:

ERSTE STUNDE



Gießen Sie den Inhalt **des zweiten Fläschens Eziclen®** in den Becher.



Wasser bis zur Bechermarkierung hinzufügen.



Nehmen Sie sich Zeit (**eine halbe bis eine Stunde**), um den Becher vollständig auszutrinken.

ZWEITE STUNDE



WICHTIG
Trinken Sie in der nächsten Stunde **2 weitere Becher mit Wasser (oder erlaubten klaren Flüssigkeiten)**.

Anmerkungen:

- In Abwesenheit einer Narkose dürfen Sie mindestens 1 Stunde vor Beginn des Eingriffs nichts mehr trinken.
- Wenn eine Narkose vorgesehen ist, dürfen Sie mindestens 2 Stunden vor Beginn des Eingriffs unter Beachtung der Anweisungen des





LESEN SIE DIE PACKUNGSBEILAGE BITTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES ARZNEIMITTEL EINNEHMEN.

Vergessen Sie nicht, dieses Formular auszufüllen und am Tag des Eingriffs Ihrem Arzt zurückzugeben.

Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie kontrollieren, ob Sie die Anweisungen sorgfältig befolgt haben und so gut wie möglich für Ihren Arzt vorbereitet sind. Bitte notieren Sie Datum und Zeitpunkt der verschiedenen Einnahmen, die in der Tabelle aufgeführt sind.

Versuchen Sie, alle Zubereitungen und extra Becher Getränke vollständig zu trinken.

▶ Datum erste Dosis:

SCHRITT		Zeitpunkt der Einnahme
<p>Behandlungsbeginn – SCHRITTE 1 - 3</p> <p>Gießen Sie den Inhalt des ersten Fläschens Eziclen® in den Becher und fügen Wasser bis zur Bechermarkierung zu.</p>	  	<p>Zeitpunkt der Einnahme der ersten Dosis des verdünnten Eziclen®:</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p>Zusätzliche Einnahme von Wasser oder eines klaren Getränks – SCHRITT 4</p> <p>2 x den Becher, gefüllt mit Wasser oder einem erlaubten klaren Getränk</p>		<p>Zeitpunkt der Einnahme des ersten Becher Wasser (oder eines klaren Getränks):</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Zeitpunkt der Einnahme des zweiten Becher Wasser (oder eines klaren Getränks):</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></p>

Haben Sie die Zubereitung ganz ausgetrunken?





Ja Nein

Wenn **NEIN**, ungefähr getrunkene Menge angeben:

Klare Getränke, die Sie getrunken haben, um eine Dehydrierung zu verhindern?

ART DER FLÜSSIGKEIT(EN)	HABEN SIE DEN GESAMTEN BECHERINHALT GETRUNKEN?
Erster Becher	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn NEIN , ungefähr getrunkene Menge angeben: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Zweiter Becher	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn NEIN , ungefähr getrunkene Menge angeben: <input style="width: 100%;" type="text"/>

▶ Datum zweite Dosis:

SCHRITT		Zeitpunkt der Einnahme
<p>Zweiter Teil der Behandlung – SCHRITTE 1 - 3</p> <p>Gießen Sie den Inhalt des zweiten Fläschens Eziclen® in den Becher und fügen Wasser bis zur Bechermarkierung zu.</p>	  	<p>Zeitpunkt der Einnahme der zweiten Dosis des verdünnten Eziclen®:</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></p>
<p>Zusätzliche Einnahme von Wasser oder eines klaren Getränks – SCHRITT 4</p> <p>2 x den Becher, gefüllt mit Wasser oder einem erlaubten klaren Getränk</p>		<p>Zeitpunkt der Einnahme des ersten Becher Wasser (oder eines klaren Getränks):</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Zeitpunkt der Einnahme des zweiten Becher Wasser (oder eines klaren Getränks):</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></p>

Haben Sie die Zubereitung ganz ausgetrunken?

Ja Nein

Wenn **NEIN**, ungefähr getrunkene Menge angeben:

Klare Getränke, die Sie getrunken haben, um eine Dehydrierung zu verhindern?

ART DER FLÜSSIGKEIT(EN)	HABEN SIE DEN GESAMTEN BECHERINHALT GETRUNKEN?
Erster Becher	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn NEIN , ungefähr getrunkene Menge angeben: <input style="width: 100%;" type="text"/>
Zweiter Becher	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn NEIN , ungefähr getrunkene Menge angeben: <input style="width: 100%;" type="text"/>

Nach dem Eingriff: Um die bei der Vorbereitung auf den Eingriff verlorene Flüssigkeit zu ersetzen, trinken Sie bitte ausreichend, um eine ausreichende Hydratation zu gewährleisten.