

# FASTUM 2,5% GEL (ketoprofen): PATIËNTENKAART

Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie.

## FASTUM Gel kan aanleiding geven tot bijwerkingen.

Deze bijwerkingen betreffen vooral huidreacties:

- Allergische huidreacties
- Ernstige huidreacties tijdens blootstelling aan zonlicht
- Gevallen van ernstigere reacties zoals bulleus (gepaard gaand met de vorming van blaren) of flyctenulair (gepaard gaand met de vorming van blaasjes) eczeem dat kan uitbreiden of veralgemeend kan worden, zijn zelden voorgekomen.

## Hoe het risico van fotosensibilisatie, zoals fotoallergische reacties, beperken?

1. De handen grondig wassen na elke toepassing van de gel.
2. De behandelde zones niet blootstellen aan de zon, zelfs als het bewolkt is, of aan UVA-stralen tijdens de behandeling en gedurende 2 weken na stopzetting van de behandeling.

**NIET** blootstellen aan  
zonlicht, zelfs indien  
bewolkt



**NIET** blootstellen aan  
UV-licht van zonnebank



SOLARIUM

3. De behandelde zones beschermen tegen zonlicht door kleding te dragen.
4. Niet gebruiken onder een afsluitend verband.
5. De behandeling onmiddellijk stopzetten bij de ontwikkeling van om het even welke huidreactie na de toepassing van het product.

## Wanneer mag u FASTUM Gel niet gebruiken?

1. als u allergisch bent voor ketoprofen, tiaprofeenzuur, fenofibraat, UV-blokkers of parfums, acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen
2. als u bij gebruik van acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen astma, neusslijmvliesontsteking (allergische rhinitis) of netelroos (urticaria) krijgt.
3. op eczeem of acne, besmette verwondingen of open wonden.



**STOP onmiddellijk het gebruik van FASTUM GEL als u huidreacties ervaart, met inbegrip van huidreacties na gelijktijdig aanbrengen van producten die octocryleen bevatten (cosmetische en verzorgingsproducten, zoals shampoo, after-shave, douche- en badgels, huidcrèmes, lippenstiften, anti-verouderingscrèmes, make-up verwijderaars, haarsprays).**

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel FASTUM GEL gebruikt.