

 **Carte de surveillance du patient**  
**OLUMIANT® (baricitinib)**

(RMA version 07/2023)

**Ce document contient des informations importantes que vous devez connaître avant et pendant le traitement par Olumiant®.**

Gardez cette carte avec vous et montrez-la aux autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge médicale ou dans le traitement.

Numéro de téléphone du médecin :

Nom du médecin (qui a prescrit Olumiant®) :

Votre nom :

## Grossesse :



- Ne prenez pas Olumiant® si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être
- Utilisez un moyen de contraception efficace pendant le traitement par Olumiant® (et pendant 1 semaine après l'arrêt du traitement)
- Informez immédiatement votre médecin si vous débutez une grossesse (ou si vous souhaitez être enceinte)

## Infections :

Olumiant® peut aggraver une infection existante ou augmenter la probabilité de développer une nouvelle infection ou augmenter le risque de réactivation virale. Si vous êtes diabétique ou que vous avez 65 ans et plus, vous pourriez avoir un risque majoré de contracter des infections. L'infection peut devenir grave si elle n'est pas traitée.

Consultez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes d'infection, notamment :

- Fièvre, plaies, sensation anormale de fatigue ou problèmes dentaires.
- Toux persistante, sueurs nocturnes et perte de poids.  
Ils peuvent être les symptômes d'une tuberculose (une maladie infectieuse des poumons).
- Éruption cutanée douloureuse accompagnée de cloques.  
Elle peut être le signe d'une infection à zona.

## Cancer de la peau non-mélanomateux :

Un cancer de la peau non-mélanomateux a été observé chez des patients prenant Olumiant®. Avertissez votre médecin si de nouvelles lésions cutanées apparaissent pendant ou après le traitement ou si des lésions existantes changent d'aspect.

## Caillots sanguins :

Olumiant® pourrait être à l'origine d'un état favorisant la formation dans votre jambe d'un caillot sanguin, qui pourrait se déplacer dans vos poumons. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes :

Gonflement ou douleur dans une jambe ou un bras / Chaleur ou rougeur d'une jambe ou un bras / Essoufflement inattendu / Respiration rapide / Douleur à la poitrine

## Crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral

Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants : Douleur ou oppression intense dans la poitrine (qui peut s'étendre aux bras, à la mâchoire, au cou, au dos) / Essoufflement / Sueurs froides / Faiblesse unilatérale dans un bras et/ou une jambe / Troubles de la parole

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Olumiant®.  
Editeur responsable: ELB - Rue du Marquis 1/4B - 1000 Bruxelles