

Zwangerschap, borstvoeding en anticonceptie

RINVOQ® mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

- Als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen moet u tijdens uw gebruik van RINVOQ® en gedurende minstens 4 weken na uw laatste RINVOQ®-dosis doeltreffende anticonceptie gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt. Raadpleeg uw arts om een doeltreffende anticonceptie te verkrijgen.
- Als u van plan bent om zwanger te worden of als u zwanger wordt tijdens die periode, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
- U mag RINVOQ® niet gebruiken als u borstvoeding geeft.



Diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE)

Er is melding gemaakt van bloedstolsels in de aderen of longen met RINVOQ®. Informeer onmiddellijk uw arts als u tekenen van bloedstolsels in de aderen of in de longen hebt, zoals zwelling, pijn, gevoeligheid, roodheid of verkleuring van de benen of armen, kortademigheid of pijn op de borst.

Risico op hartziekten

De behandeling met RINVOQ® is in verband gebracht met een verhoogd vetgehalte in het bloed (cholesterol). Daarom moeten bloedonderzoeken worden uitgevoerd voordat u RINVOQ® begint te gebruiken of terwijl u het gebruikt.

Laat uw arts onmiddellijk weten als u symptomen zoals pijn of benauwdheid op de borst ontwikkelt, omdat dit tekenen kunnen zijn van een hartziekte.

Risico op kanker

RINVOQ® kan uw risico op het ontwikkelen van kanker, vooral huidkanker, mogelijk verhogen.

Laat uw arts weten als u een verandering bemerkt op een deel van uw huid, of als u nieuwe groei erop merkt.

Risico op darmperforatie

RINVOQ® kan uw risico op een gastro-intestinale perforatie verhogen, met name voor patiënten met actieve ziekte van Crohn. Laat uw arts onmiddellijk weten als u onverklaarbare of onverwachte buikpijn heeft.

RINVOQ® (Upadacitinib)

Patiëntenkaart

**Houd deze kaart altijd bij u
(toon deze kaart aan alle gezondheidsbeoefenaars).**

Veiligheidsinformatie voor patiënten voor RINVOQ® (upadacitinib)

- Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voorafgaand aan en tijdens de behandeling met RINVOQ®.
- Zie de RINVOQ® bijsluiter voor meer informatie.

Gelieve deze kaart aan alle gezondheidsbeoefenaars te tonen (arts, apotheker, tandarts, spoed diensten, ...) die u raadpleegt.

U kunt helpen door contact op te nemen met het FAGG (www.eenbijwerkingmelden.be) om bijwerkingen te melden.

Naam patiënt:

Naam arts — wie RINVOQ® heeft voorgeschreven:

Telefoonnummer arts:

Datum waarop u gestart bent met RINVOQ®:

Risico op infecties

RINVOQ® kan een infectie die u al heeft verergeren of de kans vergroten dat u een nieuwe infectie krijgt - bv. tuberculose (TB), herpes zoster of virale hepatitis.

Neem contact op met uw arts als u tekenen van infectie vertoont, zoals:

- Koorts, zweten, koude rillingen, gewichtsverlies of aanhoudende hoest — dit kunnen tekenen van tuberculose zijn.
- Pijnlijke uitslag met blaren — dit kan een teken van herpes zoster zijn.
- Gevoel van vermoeidheid of kortademigheid, — Dit kunnen tekenen zijn van een longontsteking.

Breng uw arts op de hoogte als:

- U recent gediagnosticeerd bent met tuberculose (TB), of als u eerder tuberculose heeft gehad.
- U recent nauw contact hebt gehad met iemand die tuberculose (TB) heeft.

Vaccinaties - ter preventie van infecties

Levende vaccins (bv. combinatievaccins tegen mazelen en varicella) mogen niet worden toegediend tijdens of net vóór het gebruik van RINVOQ®.

Neem contact op met uw arts indien u onlangs een vaccinatie (immunisatie) heeft gehad of van plan bent deze te krijgen