

7. Wat zijn andere belangrijke dingen die ik moet weten over het gebruik van Oxybate Kalceks?

- U mag Oxybate Kalceks niet met anderen delen.
- Gebruik alleen de dosis die uw arts heeft voorgeschreven.
- Als u denkt dat de dosis aangepast moet worden, contacteer dan uw arts.
- Neem Oxybate Kalceks 2 of 3 uur na het avondeten, en niet eerder. Laat elke dag even veel tijd tussen het avondeten en de eerste inname van Oxybate Kalceks.
- Bewaar Oxybate Kalceks altijd in de originele verpakking op een veilige plek.
- Houd Oxybate Kalceks buiten het bereik van kinderen.
- Eventueel ongebruikt middel moet bij de apotheek worden ingeleverd.
- Als u tijdens het gebruik van Oxybate Kalceks ongewone symptomen ervaart zoals gewelddadige gedachten waaronder gedachten om anderen pijn te doen, informeer dan onmiddellijk uw arts.
- Gebruik alleen de spuit die bij de verpakking van het product wordt geleverd om het risico van medicatiefouten (bij een specifieke overdosis) tot een minimum te beperken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. U kunt bijwerkingen ook melden via Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AS Kalceks (kalceks@kalceks.lv) of de lokale distributeur Grindeks Kalceks België (info@grindeks.be).

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel Oxybate Kalceks, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/ voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA version 08/2025)

Oxybate Kalceks (natriumoxybaat) 500 mg/ml drank

Brochure voor de patiënt met veel gestelde vragen

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Oxybate Kalceks gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek " Zoek informatie over een vergund geneesmiddel "

1. Wat is Oxybate Kalceks?

Oxybate Kalceks is een op voorschrift verkrijgbaar merkgeneesmiddel voor oraal gebruik dat wordt voorgeschreven aan volwassenen die:

- overdag vaak en op onverwachte momenten in slaap vallen (narcolepsie);
- bij hevige emoties last hebben van plotselinge spierverslapping of -verlamming (kataplexie)

2. Mag ik alcohol drinken tijdens het gebruik van Oxybate Kalceks?

Nee, u mag tijdens het gebruik van Oxybatet Kalceks geen alcohol drinken. Alcohol kan de werking van Oxybate Kalceks versterken. Ook kan uw ademhaling verstoord raken (ademhalingsdepressie), wat dodelijk kan zijn. Verder kan uw denkvermogen minder goed worden of kunt u last krijgen van verwardheid.

3. Wat zijn ernstige bijwerkingen van Oxybate Kalceks?

Ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie)

Oxybate Kalceks kan de ademhaling beïnvloeden. Als u ademhalings- of longproblemen hebt, moet u dit aan uw arts melden voordat u Oxybate Kalceks gebruikt. Als u overgewicht hebt, hebt u ook een verhoogde kans op ademhalingsdepressie. U mag geen alcohol gebruiken, omdat ook hierdoor de kans op ademhalingsdepressie kan toenemen. Ademhalingsdepressie kan ernstig en zelfs dodelijk zijn.

Depressie en zelfmoordgedachten

Als u zich tijdens het gebruik van Oxybate Kalceks depressief voelt of eraan denkt om uzelf iets aan te doen, moet u dit meteen aan uw arts laten weten. U moet uw arts ook op de hoogte brengen als u in het verleden een depressie hebt doorgemaakt.

Verlaagd bewustzijnsniveau

Omdat Oxybate Kalceks rechtstreeks op de hersenen inwerkt, veroorzaakt het middel sufheid en kan het uw bewustzijnsniveau verlagen. Dit kan resulteren in een coma en kan dodelijk zijn. Het is belangrijk dat u tijdens het gebruik van Oxybate Kalceks geen alcohol gebruikt. U mag geen andere geneesmiddelen gebruiken die sufheid veroorzaken. Ook mag u na het innemen van Oxybate Kalceks gedurende ten minste 6 uur niet autorijden of machines bedienen.

Convulsies

Oxybate Kalceks kan convulsies (stuipen) veroorzaken. Als u eerder convulsies hebt gehad, moet u dit aan uw arts melden voordat u Oxybate Kalceks gebruikt.

Afhankelijk/misbruik/oneigenlijk gebruik

Het werkzame bestanddeel van Oxybate Kalceks is gammahydroxyboterzuur (GHB). GHB is een chemische stof die is misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Om deze reden zal uw arts u concreet vragen of u ooit drugs hebt misbruikt. Misbruik en oneigenlijk gebruik van Oxybate Kalceks is gevaarlijk en kan dodelijke gevolgen hebben.

Deze lijst met bijwerkingen van Oxybate Kalceks is niet volledig. Uw arts kan u medisch advies geven over bijwerkingen.

4. Kan Oxybate Kalceks veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen?

Zoals bij alle geneesmiddelen geldt, is het heel belangrijk dat u uw arts op de hoogte stelt van het eventuele gebruik van andere geneesmiddelen, waaronder ook middelen die u zonder voorschrift haalt. Oxybate Kalceks mag niet worden gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die sufheid veroorzaken, of met middelen als narcotische analgetica die depressie van het centrale zenuwstelsel kunnen veroorzaken. Meld het uw arts vooral als u geneesmiddelen gebruikt die de activiteit van het centrale zenuwstelsel verhogen, antidepressiva of geneesmiddelen die op vergelijkbare wijze worden verwerkt door het lichaam, zoals valproaat, fenytoïne, topiramaat of ethosuximide. Vraag uw medische zorgverlener om de Oxybate Kalceks waarschuwingskaart voor de patiënt, die u bij zich kunt dragen als geheugensteuntje voor het gebruik van Oxybate Kalceks. Laat deze kaart aan al uw artsen zien, zodat zij weten dat u Oxybate Kalceks gebruikt. Dit is vooral belangrijk als u een ander geneesmiddel krijgt voorgeschreven.

5. Wat moet ik doen als ik per ongeluk meer gebruik dan de Voorgeschreven dosis?



Als u te veel Oxybate Kalceks gebruikt (overdosis), moet u onmiddellijk spoedhulp inroepen.

Als u te veel Oxybate Kalceks inneemt, kan dit klachten veroorzaken als rusteloosheid, verwardheid, bewegingsstoornis, ademhalingsstoornis, wazig zien, hevig zweten, hoofdpijn, braken en verminderd bewustzijn resulterend in coma en convulsies. Als u de de medicijnfles met etiket meeneemt, ook al is deze leeg, dan zal dit het medisch personeel helpen om uw klachten te kunnen behandelen.

6. Wat gebeurt er als ik plotseling stop met het gebruik van Oxybate Kalceks?

Als u plotseling stopt met het gebruik van Oxybate Kalceks, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Mogelijk keren de kataplexieaanvallen terug. In zeldzame gevallen kunt u last krijgen van slaperigheid, hoofdpijn, angsten, duizeligheid, slaapproblemen, slaperigheid, hallucinaties en abnormale gedachten.