Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bibrocathol-POS 20 mg/g oogzalf
bibrocathol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
- U moet een arts raadplegen als u zich binnen 2 tot 3 dagen slechter voelt of als u zich na 7 dagen niet beter voelt.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Bibrocathol-POS en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u Bibrocathol-POS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Bibrocathol-POS?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bibrocathol-POS?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Bibrocathol-POS en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Bibrocathol-POS is een ontsmettende (desinfecterende), samentrekkende (adstringerende) en afscheidingsremmende oogzalf.

Bibrocathol-POS wordt gebruikt bij langdurige ontstekingen van de ooglidrand die niet door bacteriën worden veroorzaakt, bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

U moet een arts raadplegen als u zich binnen 2 tot 3 dagen slechter voelt of als u zich na 7 dagen niet beter voelt.

2. Wanneer mag u Bibrocathol-POS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?
- U bent allergisch voor bibrocathol of een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
Draag geen contactlenzen tijdens het gebruik van Bibrocathol-POS.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Bibrocathol-POS wordt aanbevolen bij adolescenten en kinderen van 6 jaar en ouder.

Gebruikt u nog andere medicijnen?
Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd.

Gebruikt u naast Bibrocathol-POS nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als er meer dan één lokaal oogproduct wordt gebruikt, moeten de producten met een tussenpoos van ten minste 15 minuten worden toegediend. Oogzalf dient als laatste te worden aangebracht.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.
Er zijn geen gegevens over het gebruik van bibrocathol bij zwangere vrouwen. Bibrocathol-POS mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk.
Het is ook niet bekend of bibrocathol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor het zogende kind kan niet worden uitgesloten. Uw arts zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of met uw behandeling met Bibrocathol-POS.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Na het aanbrengen van Bibrocathol-POS zal de oogzalf een vettige film op het oogoppervlak veroorzaken die het gezichtsvermogen tijdelijk zal verminderen. Daarom zal uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen verminderd zijn. Bestuur geen voertuig, rijd niet op een fiets en bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.

Posiforlid bevat wolvet
Wolvet kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

3. Hoe gebruikt u Bibrocathol-POS?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Als oogirritaties herhaaldelijk optreden, dient u vóór het gebruik van de oogzalf altijd een oogarts te raadplegen.

Volwassenen
De geadviseerde dosering is 3 tot 5 maal daags een strookje van ongeveer 0,5 cm in het betreffende oog gedurende maximaal 14 dagen.

Kinderen
De aanbevolen dosering voor kinderen van 6 jaar en ouder is 3 keer per dag een streepje van ongeveer 0,5 cm in het betreffende oog, gedurende maximaal 10 dagen.

Breng de oogzalf met regelmatige tussenpozen gedurende de dag aan.
Gebruiksaanwijzing:

- Was je handen.
- Open de tube.
- Zorg ervoor dat de punt van de tube het oog of de huid niet raakt.
- Verwijder de dop.
- Kantel uw hoofd iets naar achteren, trek het onderste ooglid iets van het oog af en breng door zachtjes op de tube te duwen een klein strookje oogzalf aan in de ontstane zak.
- Sluit de ogen langzaam. Houd het oog (of de ogen) na toediening enige tijd gesloten en masseer het oog (of de ogen) zachtjes in de richting van de neus om de zalf te verdelen.

- Sluit de tube zorgvuldig na gebruik.

De oogzalf kan eenvoudig worden aangebracht door zachtjes op de tube te drukken zonder de tube te scheuren of op te rollen.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Wanneer u te veel van Bibrocathol-POS heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig. Een kortdurende overdosis Bibrocathol-POS veroorzaakt geen bekende bijwerkingen.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar gebruik de volgende dosis zo snel mogelijk en ga daarna verder met dezelfde dosis en met dezelfde tussenpozen als hierboven beschreven of zoals door uw arts voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Zelden: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen
Irritatie van oog en ooglid, zoals: jeuk, zwelling, pijn, rode ogen, branderig gevoel, tranende ogen.
Overgevoeligheid, allergie (bijv. zwelling van het gezicht, roodheid in het gezicht)
Roodheid van de huid, jeuk van de huid, huiduitslag
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u Bibrocathol-POS?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de tube na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30 °C.
Houdbaarheid na opening: Niet langer gebruiken dan 4 weken na eerste opening.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?
De werkzame stof in dit medicijn is bibrocathol. Elke gram bevat 20 mg bibrocathol..
De andere stoffen in dit medicijn zijn witte vaseline, vloeibare paraffine en wolvet.

Hoe ziet Bibrocathol-POS eruit en wat zit er in een verpakking?
Bibrocathol-POS is een okergele zalf in aluminium tubes met schroefdop.
Elke verpakking bevat één tube met 5 g oogzalf.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
URSAPHARM Benelux B. V., Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, Nederland
Tel.: +31 (0)492 472 473
Fax: +31(0)492 472 673
Internet: www.ursapharm.nl
e-mail: info@ursapharm.nl

Fabrikant
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE592275

Afleveringswijze: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd / goedgekeurd in 10-2026.
Goedkeuringsdatum FAGG: 10/2026