

Gebrauchsinformation: Information für Patienten
Colchicin Pharmaselect 0,5 mg Tabletten
Colchicin

Wichtiger Warnhinweis!

Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein. Eine Überdosierung, auch durch Nichtbeachtung von Wechselwirkungen, kann zu einer lebensbedrohlichen, sehr schmerzhaften und unumkehrbaren Vergiftung mit tödlichem Ausgang führen. Siehe Abschnitte 2, 3 und 4 dieser Gebrauchsinformation. Das Arzneimittel muss vor und nach der Anwendung für andere Personen unzugänglich aufbewahrt werden.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Colchicin Pharmaselect Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Colchicin Pharmaselect Tabletten beachten?
3. Wie ist Colchicin Pharmaselect einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Colchicin Pharmaselect aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Colchicin Pharmaselect Tabletten und wofür wird es angewendet?

Colchicin Pharmaselect enthalten den Wirkstoff Colchicin.

Colchicin Pharmaselect gehört zur Gruppe der Antigichtmittel und wird zur Vorbeugung oder Kontrolle eines Gichtanfalls eingesetzt.

Bei Gicht ist die Konzentration von Harnsäure im Blut erhöht. Infolgedessen können sich Harnsäurekristalle in der Gelenkflüssigkeit ablagern. Colchicin Pharmaselect hemmt die dadurch ausgelöste Entzündungsreaktion.

Colchicin Pharmaselect wird Kindern, Jugendliche und Erwachsenen mit Familiärem Mittelmeerfieber (FMF) verschrieben, um Krampfanfälle und Amyloidose (abnorme Ablagerung von Proteinen in Geweben und Organen) zu verhindern.

Wenn Sie sich nicht besser oder schlechter fühlen, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

2. Was Sollten Sie vor der Einnahme von Colchicin Pharmaselect Tabletten beachten?

Colchicin Pharmaselect darf nicht eingenommen:

- Wenn Sie allergisch gegen Colchicin oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Wenn Sie eine schwere Nierenfunktionsstörung haben

- Wenn Sie eine schwere Beeinträchtigung Ihrer Leberfunktion haben.
- wenn Sie schwere Blutanomalien haben;

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Colchicin Pharmaselect einnehmen:

- Probleme mit dem Herzen, den Nieren, der Leber oder dem Verdauungssystem haben
- alt und schwach sind
- eine Bluterkrankung haben

Colchicin Pharmaselect können giftig sein, daher ist es wichtig, dass Sie die von Ihrem Arzt verschriebene Dosis nicht überschreiten

Es gibt nur einen geringen Unterschied zwischen einer wirksamen Dosis von Colchicin Pharmaselect und einer Überdosierung. Wenn Sie daher Symptome wie Brennen im Mund oder Rachen, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen und Durchfall bekommen, beenden Sie die Einnahme von Colchicin Pharmaselect und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt (siehe auch Abschnitt 4 "Mögliche Nebenwirkungen").

- Wenn Sie Symptome von Blutkrankheiten wie Fieber, Entzündungen des Mundes, Halsschmerzen oder anhaltende Blutungen Blutergüsse oder Hautprobleme entwickeln, beenden Sie die Einnahme dieses Arzneimittels und kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt. Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass Sie ein ernsthaftes Blutproblem haben, und Ihr Arzt wird Sie möglicherweise sofort zu Blutuntersuchungen schicken (siehe auch Abschnitt 4 "Mögliche Nebenwirkungen").
- Colchicin Pharmaselect können eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Funktion des Knochenmarks verursachen (Verschwinden bestimmter weißer Blutkörperchen aus dem Blut (Agranulozytose), niedrige Thrombozytenzahl (Thrombozytopenie), Verringerung des Blutfarbstoffs und der roten Blutkörperchen aufgrund einer mangelnden Produktion roter Blutkörperchen (aplastische Anämie). Insbesondere die aplastische Anämie birgt ein hohes Sterberisiko. Eine regelmäßige Überwachung des Blutes ist notwendig.

Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren

Bei Kindern darf Colchicin nur unter Aufsicht eines Facharztes verschrieben werden, der über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Es liegen keine Daten über die Auswirkungen einer langfristigen Einnahme von Colchicin bei Kindern vor. Colchicin wird hauptsächlich für Kinder mit familiärem Mittelmeerfieber verschrieben.

Andere Arzneimittel und Colchicin Pharmaselect:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Die Einnahme eines anderen Arzneimittels, während Sie Colchicin Pharmaselect einnehmen, kann die Wirkung des anderen Arzneimittels beeinflussen.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten, die das Blutbild beeinflussen oder die Leber- oder Nierenfunktion beeinträchtigen können.

Wenn Colchicin Pharmaselect zusammen mit einem der folgenden Arzneimittel eingenommen werden, sind Nebenwirkungen aufgrund einer Colchicin Pharmaselect-Toxizität wahrscheinlicher, und diese können schwerwiegend und lebensbedrohlich sein:

Die gleichzeitige Anwendung von Colchicin Pharmaselect mit diesen Arzneimitteln sollte vermieden werden. -

- Erythromycin und Clarithromycin (bestimmte Antibiotika, Mittel gegen Infektionen mit Bakterien). Die gleichzeitige Einnahme von Colchicin Pharmaselect und diesen Antibiotika kann zu Vergiftungen mit Colchicin Pharmaselect führen. Die gleichzeitige Einnahme sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Wenn keine alternative Behandlung zur Verfügung steht, kann Ihr Arzt die Dosis von Colchicin reduzieren und unter Aufsicht halten;
- Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol (Arzneimittel gegen Pilzkrankungen)
- Verapamil und Diltiazem (Arzneimittel zur Behandlung von Herzkrankheiten);
- Ritonavir (spezifischer Proteaseinhibitor, der zur Behandlung von HIV eingesetzt wird).
- Ciclosporin (Arzneimittel zur Verringerung der körpereigenen Widerstandskraft gegen Infektionen durch Unterdrückung des Immunsystems).

Wenn Sie eines der oben genannten Arzneimittel einnehmen, wird Ihr Arzt möglicherweise Ihre Dosis von Colchicin Pharmaselect anpassen oder Ihre Behandlung mit Colchicin Pharmaselect vorübergehend unterbrechen. Wenn Sie Leber- oder Nierenprobleme haben und eines der oben genannten Arzneimittel einnehmen, dürfen Sie Colchicin Pharmaselect nicht einnehmen.

Informieren Sie auch Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie einen der folgenden Medikamente einnehmen:

- Die Einnahme der folgenden Arzneimittel während der Behandlung mit Colchicin kann zu einer schweren Muskelerkrankung (Myopathie) und zum Abbau von Muskelgewebe führen, die mit Muskelkrämpfen, Fieber und rotbrauner Verfärbung des Urins (Rhabdomyolyse) einhergeht:
- Simvastatin, Fluvastatin oder Pravastatin (Statine, Arzneimittel zur Senkung des Cholesterinspiegels)
- Fibrate (z. B. Gemfirbozil, Fenofibrat - Arzneimittel zur Senkung des Cholesterinspiegels und einiger Blutfette)
- Digoxin (Arzneimittel zur Behandlung von Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen).
- Cimetidin (zur Behandlung von Magen- und Darmgeschwüren) und Tolbutamid (zur Blutzuckersenkung). Sie können die Wirkung von Colchicin Pharmaselect verstärken
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Die Absorption von Vitamin B12 aus dem Magen-Darm-Trakt kann durch Colchicin verringert werden.

Colchicin Pharmaselect mit Speisen, Getränken

Die gleichzeitige Einnahme von Grapefruitsaft und Colchicin sollte vermieden werden. Grapefruitsaft kann die Menge an Colchicin Pharmaselect im Blut erhöhen und zu Vergiftungen führen.

Schwangerschaft und Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten oder beabsichtigen, schwanger zu sein, bzw. zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Sie sollten Colchicin Pharmaselect nicht verwenden, wenn Sie während der Behandlung von Gicht und dem bekannten Mittelmeerfieber schwanger sind oder schwanger werden können. Tritt dennoch während der Behandlung mit Colchicin Pharmaselect oder innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Behandlung eine Schwangerschaft ein, sollte eine genetische Beratung veranlasst werden.

Stillzeit

Der Wirkstoff Colchicin geht in Ihre Muttermilch über.

Colchicin Pharmaselect sollten bei stillenden Frauen mit Gicht nicht angewendet werden. Bei stillenden Müttern mit FMF muss unter Berücksichtigung des Nutzens des Stillens für das Kind und des Nutzens der Therapie für die Frau entschieden werden, ob das Stillen unterbrochen oder die Colchicin-Therapie abgebrochen/abgesetzt werden soll.

Fortpflanzungsfähigkeit

Da ein unbehandelter Verlauf der FMF auch zu Unfruchtbarkeit führen kann, sollte die Einnahme von Colchicin Pharmaselect gegen die potenziellen Risiken abgewogen werden und kann in Betracht gezogen werden, wenn dies klinisch erforderlich ist.

Wenn Colchicin zur Behandlung akuter Gicht oder zur Prophylaxe eines Gichtanfalls zu Beginn einer harnsäuresenkenden Therapie eingesetzt wird

Männliche Patienten sollten während und für mindestens 6 Monate nach Beendigung der Colchicin-Therapie kein Kind zeugen. Kommt es in diesem Zeitraum dennoch zu einer Schwangerschaft, sollte eine genetische Beratung beauftragt werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Die Möglichkeit von Schläfrigkeit und Schwindel sollte in Betracht gezogen werden. Wenn Sie betroffen sind, fahren Sie nicht Auto und bedienen Sie keine Maschinen.

Colchicin Pharmaselect enthalten

Colchicin Pharmaselect enthalten Laktose-Monohydrat.

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen Ihr Arzt mitgeteilt hat, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Colchicin Pharmaselect einzunehmen?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Sollten Sie unsicher sein, holen Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker Rat ein. Sollten Sie unsicher sein, holen Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker Rat ein. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wie viele Colchicin Pharmaselect Sie einnehmen müssen und wie lange Sie sie einnehmen sollten.

Colchicin kann toxisch sein. Deswegen dürfen keine höheren Dosen als vom Arzt verordnet eingenommen werden.

Gicht

Anwendung bei Erwachsenen:

Dosierung bei einem akuten Gichtanfall:

Die empfohlene Dosierung beträgt 0,5 mg zwei- bis dreimal täglich, eventuell mit einer Anfangsdosis von 1 mg. Die Behandlung sollte bei Auftreten von gastrointestinalen Symptomen und fehlender Wirkung nach 2 bis 3 Tagen abgebrochen werden.

Die Behandlung sollte beendet werden, wenn die Symptome gelindert sind oder wenn eine Gesamtdosis von 6 mg Colchicin Pharmaselect eingenommen wurde. Sie dürfen nicht mehr als eine Behandlungskur einnehmen.

Nach Beendigung der Einnahme von Colchicin Pharmaselect sollten Sie frühestens nach drei Tagen mit einer weiteren Behandlung beginnen.

Dosierung zur Vorbeugung eines Gichtanfalls:

Die übliche Dosis beträgt 0,5 mg bis 1 mg pro Tag und sollte am Abend eingenommen werden.

Familiäres Mittelmeerfieber

Erwachsene

Die empfohlene Dosis beträgt 1 - 3 mg pro Tag. Die Dosis kann als Einzeldosis verabreicht werden oder in zwei Gaben über den Tag verteilt (bei Dosen über 1 mg / Tag).

Wenn die Symptome nicht abnehmen, sollte die Colchicin Pharmaselect-Dosis schrittweise auf bis zu 3 mg/Tag erhöht werden. Jede Dosissteigerung sollte genau auf Nebenwirkungen hin überwacht werden.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren

Bei Kindern mit familiärem Mittelmeerfieber hängt die empfohlene Dosierung vom Alter ab.

- Kinder unter 5 Jahren: 0,5 mg/Tag
- Kinder von 5 bis 10 Jahren: 1 mg/Tag
- Kinder über 10 Jahre: 1,5 mg/Tag

Bei Kindern mit Amyloid-Nephropathie ist es möglich, dass die Dosis auf 2 mg pro Tag erhöht werden muss.

Wenn Sie Nieren- und Leberprobleme haben

Ihr Arzt kann Ihre Dosis von Colchicin Pharmaselect zu reduzieren, ist die Dosis 0,5 mg Colchicin pro Tag und Sie sollten sorgfältig auf Nebenwirkungen überwacht werden.

Nehmen Sie Colchicin Pharmaselect nicht ein, wenn Sie schwere Nieren- oder Leberprobleme haben (siehe Abschnitt 2): „Was Sie vor der Einnahme von Colchicin Pharmaselect Tabletten wissen müssen“:

Methode und Art der Verabreichung

Zum Einnehmen (durch den Mund)

Die Tablette sollte mit einem Glas Wasser eingenommen werden.

Behandlungsdauer

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie viele Tabletten Sie einnehmen müssen und wie lange Sie die Tabletten einnehmen dürfen.

Wenn Sie feststellen, dass die Colchicin Pharmaselect zu stark oder zu wenig wirken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie größere Menge von Colchicin Pharmaselect eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel von der Colchicin Pharmaselect-Tablette eingenommen haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie mehr Colchicin Pharmaselect eingenommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder die nächste Unfall- und Notaufnahme eines Krankenhauses.

Nehmen Sie diese Packungsbeilage und alle Colchicin Pharmaselect, die Sie noch haben, mit. Bei einer zu hohen Dosis können Colchicin Pharmaselect ernsthaft giftig, sogar tödlich sein. Zu den frühen Symptomen einer Überdosierung (die im Durchschnitt nach 3 Stunden auftreten, aber auch länger dauern können) können Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, blutiger Durchfall und niedriger Blutdruck gehören.

Etwa 7 Tage nach der Einnahme kann es zu einem vorübergehenden Anstieg der weißen Blutkörperchen (Leukozytose) und Haarausfall kommen.

Wenn Sie zu viel Colchicin Pharmaselect eingenommen haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem "Antigifzentrum" (070/245.245) in Verbindung.

Wenn Sie die Einnahme von Colchicin Pharmaselect vergessen haben

Nicht die doppelte Dosis einnehmen, auch wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, nehmen Sie sie so bald wie möglich ein.. Wenn es jedoch fast Zeit für die nächste Dosis ist, lassen Sie die vergessene Dosis aus und fahren Sie mit der regelmäßigen Einnahme fort. Nehmen Sie Colchicin Pharmaselect nicht in kürzeren Abständen ein als von Ihrem Arzt verordnet. Im Zweifelsfall fragen Sie immer Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Colchicin Pharmaselect abbrechen

Wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels plötzlich abbrechen, können die Symptome, die vor Beginn der Behandlung aufgetreten sind, wieder auftreten. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, wenn Sie die Einnahme abbrechen wollen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Einnahme von Colchicin Pharmaselect ab und wenden Sie sich sofort an einen Arzt oder an die nächste Unfall- und Notaufnahme eines Krankenhauses:

- Übelkeit, Erbrechen, Unterleibskrämpfe und Durchfall (siehe auch Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“). Diese Nebenwirkungen treten häufig auf (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)
- Symptome wie Fieber, Mundentzündung, Halsschmerzen, anhaltende Blutungen, Blutergüsse oder Hautprobleme. Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass Sie aufgrund einer Knochenmarksdepression an einer ernsthaften Bluterkrankung leiden (siehe auch Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“). Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt (kann auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden).

Weitere beobachtete Nebenwirkungen (mit unbekannter Häufigkeit) sind:

- Nervenentzündung, die die Schmerzen, Schwäche, Kribbeln verursachen kann
- Taubheitsgefühl
- Nervenschäden
- Leberschaden
- Haarausfall

- Ausschlag
- Schmerzen oder Schwäche in den Muskeln
- Abnormaler Muskelabbau, der zu Nierenproblemen führen kann (Rhabdomyolyse)
- Nierenschäden
- Ausbleiben der Menstruation
- Schmerzhaftes Perioden
- Vitamin-B12-Mangel
- Halsentzündung
- Reduzierte Fähigkeit, Spermien zu produzieren (geringe oder keine Spermienzahl)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz :

Website: www.notifieruneffetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Colchicin Pharmaselect aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen Colchicin Pharmaselect nach dem auf der Blisterpackung und dem Umkarton nach dem Verfallsdatum angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie nicht länger benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen helfen, die Umwelt zu schützen.

Diese Packungsbeilage enthält nicht alle Informationen über Ihr Arzneimittel. Wenn Sie Fragen haben oder sich über etwas nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ist Colchicin Pharmaselect enthält

Der Wirkstoff in diesem Produkt ist Colchicin. Jede Colchicin Pharmaselect 0,5 mg Tablette enthält 0,5 mg Colchicin.

Die sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe) sind Laktose-Monohydrat, Quellstärke, Natriumstärkeglykolat, kolloidales wasserfreies Siliciumdioxid, Stearinsäure

Wie Colchicin Pharmaselect aussehen und Inhalt der Packung

Colchicin Pharmaselect 0,5 mg Tabletten

Weiß bis cremefarbene, runde, bikonvexe, unbeschichtete Tabletten mit eingepprägtem "L"

auf der einen Seite und glatter Oberfläche auf der anderen Seite. (ungefähr 5 mm Durchmesser und ungefähr 2,6 mm dick)

Colchicin Pharmaselect-Tabletten sind in Blisterpackung aus PVC/PVDC mit Al-Deckfolie verpackt. Jede Packung enthält 20, 30, 50, 60, 75, 90 und 100 Tabletten.

Nicht alle Packungsgrößen dürfen vermarktet werden.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen und Hersteller Ihrer Tablette ist:

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Wien, Österreich

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

Mitgliedstaat	Name des Arzneimittels
Deutschland	Colchanova 0,5 mg / 1 mg Tabletten
Österreich	Colchanova 0,5 mg / 1 mg Tabletten
Bulgarien	Колханова 0,5 mg / 1 mg таблетки
Kroatien	Colcamexx 0,5 mg / 1 mg tablete
Ungarn	Colcamexx 0,5 mg / 1 mg tableta
Tschechische Republik	Colchicine Pharmaselect
Slowakei	Colcamedin 0,5 mg / 1 mg tablety
Belgien	Colchicin Pharmaselect 0,5 mg / 1 mg Tabletten
Griechenland	Colchicin Pharmaselect
Italien	Colchicina Pharmaselect
Rumänien	Colchicin Pharmaselect 0,5 mg / 1 mg comprimate
Portugal	Colcamexx 0,5 mg / 1 mg comprimidos
Spanien	Colcamexx 0,5 mg comprimidos

Wenn Sie diese Packungsbeilage in einem anderen Format wünschen oder Nebenwirkungen melden möchten, wenden Sie sich bitte an den oben genannten Zulassungsinhaber.

Zulassungsnummer(n)

BE592213

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 10/2023.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 02/2024.