

## Notice : Information de l'utilisateur

### Lorazepam Macure 4 mg/ml solution injectable lorazépam

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que Lorazepam Macure et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lorazepam Macure
3. Comment utiliser Lorazepam Macure
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Lorazepam Macure
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Lorazepam Macure et dans quel cas est-il utilisé**

Lorazepam Macure fait partie d'une famille de médicaments sédatifs hypnotiques, appelés benzodiazépines.

Lorazepam Macure peut être utilisé chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 12 ans :

- comme sédatif pour certaines interventions (prémédication), comme des petites ou de grosses interventions chirurgicales ou certains examens physiques approfondis.
- chez les personnes qui souffrent de peurs ou de tensions sévères et qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas prendre de comprimé.

Lorazepam Macure peut également être utilisé chez les adultes, les adolescents, les enfants et les nourrissons à partir de l'âge de 1 mois :

- pour le contrôle de l'état de mal épileptique.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lorazepam Macure**

##### **Vous ne devez pas recevoir Lorazepam Macure :**

- si vous êtes allergique à la substance active, à d'autres benzodiazépines, à des analogues de la benzodiazépine ou à un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous souffrez de myasthénie grave (maladie entraînant une faiblesse des muscles et une fatigue excessive)
- si vous souffrez de troubles respiratoires sévères
- si vous souffrez du syndrome d'apnée du sommeil (problèmes respiratoires qui surviennent quand vous dormez)
- si vous présentez des problèmes hépatiques sévères

Lorazepam Macure ne doit pas être injecté dans une artère.

## **Enfants**

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas utiliser Lorazepam Macure, sauf pour le contrôle de l'état de mal épileptique. En cas d'état de mal épileptique, Lorazepam Macure ne doit pas être utilisé chez les nouveau-nés.

## **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou votre infirmier/ère avant d'utiliser Lorazepam Macure :

- si vous souffrez de troubles respiratoires chroniques
- si votre fonction hépatique ou rénale est diminuée
- si vous êtes âgé(e) ou affaibli(e)
- si vous souffrez d'épilepsie
- si vous souffrez de glaucome aigu par fermeture de l'angle
- si vous êtes enceinte ou avez un projet de grossesse
- si vous allaitez, car le médicament pourrait passer dans le lait maternel

Vous devez rester en observation pendant 24 heures après l'administration de Lorazepam Macure. Une marche précoce (dans les 8 heures qui suivent l'utilisation de Lorazepam Macure) peut favoriser les chutes et les blessures.

La diminution de la vigilance peut également durer plus de 24 heures, notamment si vous êtes plus âgé(e) ou si vous prenez d'autres médicaments.

Si vous êtes un patient non hospitalisé et que Lorazepam Macure est utilisé pour une procédure de courte durée, vous devez être accompagné(e) d'un adulte responsable pour votre sortie de l'hôpital.

Vous ne devez pas conduire de véhicules ni entreprendre d'activités nécessitant de la vigilance pendant les 24-48 heures qui suivent l'administration.

Il se peut que vous ne vous souveniez pas de ce que vous avez vécu, pendant une certaine durée après l'administration de Lorazepam Macure.

Après le traitement, il se peut que vous ne vous souveniez pas de ce que vous avez vécu pendant une certaine durée après avoir reçu Lorazepam Macure.

## **Patients avec troubles mentaux**

Lorazepam Macure n'est pas un premier choix pour le traitement de troubles mentaux. Lorazepam Macure ne doit pas être utilisé sans un traitement antidépresseur adéquat chez les patients déprimés. Les benzodiazépines peuvent avoir un effet désinhibiteur chez les patients déprimés et entraîner des tendances suicidaires.

La posologie de Lorazepam Macure doit être diminuée progressivement.

## **L'utilisation de Lorazepam Macure peut entraîner une dépendance.**

L'utilisation de benzodiazépines peut entraîner une dépendance physique ou psychologique. Pour réduire le risque de dépendance, il convient d'utiliser la dose efficace la plus faible de Lorazepam Macure, pendant la durée la plus courte possible.

Si vous arrêtez brusquement le traitement, vous pourriez ressentir les symptômes de sevrage suivants : maux de tête, douleurs musculaires, peur extrême, tension, agitation, confusion, irritabilité, sautes d'humeur, dépression et insomnie.

Il est également possible que les symptômes pour lesquels vous avez reçu temporairement Lorazepam Macure réapparaissent (voir également « Si vous arrêtez d'utiliser Lorazepam Macure » dans la rubrique 3).

## **Habitude**

En cas d'utilisation répétée pendant plusieurs semaines, ce médicament peut perdre ses effets.

## **Patients âgés ou affaiblis et enfants**

Les personnes âgées et les enfants peuvent présenter des réactions totalement contraires à celles attendues du traitement par Lorazepam Macure, comme les suivantes : agitation, excitation, agressivité, délires, crises de rage, cauchemars, certains troubles mentaux (psychoses) et autres

comportements inappropriés ou d'opposition. Si ces réactions surviennent, votre médecin arrêtera le traitement.

Les enfants peuvent être allergiques à certains des excipients contenus dans Lorazepam Macure (voir la rubrique « Lorazepam Macure contient de l'alcool benzylique, du polyéthylène glycol et du propylène glycol »).

### **Autres médicaments et Lorazepam Macure**

Informez votre médecin si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

L'utilisation concomitante des médicaments suivants peut augmenter l'effet calmant/relaxant de Lorazepam Macure :

- scopolamine (médicament pour le mal des transports et les problèmes intestinaux)
- antipsychotiques
- somnifères
- sédatifs et/ou tranquillisants
- antidépresseurs
- relaxants musculaires
- certains analgésiques puissants délivrés sur ordonnance (analgésiques narcotiques)
- anti-épileptiques
- médicaments utilisés pour des problèmes respiratoires (théophylline/aminophylline)
- médicaments qui induisent une anesthésie générale ou locale (anesthésiques)
- médicaments utilisés dans les allergies ou pour le mal des transports (antihistaminiques)
- médicaments utilisés pour traiter la goutte et les taux élevés d'acide urique dans le sang (comme le probénécide)
- disulfirame (médicament utilisé pour traiter l'alcoolisme chronique)
- métronidazole (antibiotique)

L'utilisation concomitante de lorazepam et d'opioïdes (antidouleurs puissants, traitements de substitution et certains antitussifs) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire) et de coma, et peut engager le pronostic vital. L'utilisation concomitante ne doit donc être envisagée que si d'autres options thérapeutiques ne sont pas possibles.

Cependant, si votre médecin prescrit Lorazepam Macure avec des opioïdes, la posologie et la durée de l'administration concomitante doivent être limitées par votre médecin.

Veillez informer votre médecin de tous les médicaments opioïdes que vous prenez, et respecter strictement la posologie recommandée par votre médecin. Il peut être utile d'inviter vos amis et votre famille à être attentifs aux signes et symptômes indiqués ci-dessus. Contactez votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.

### **Lorazepam Macure avec des aliments, des boissons et de l'alcool**

L'effet calmant/relaxant de Lorazepam Macure peut être amplifié par la consommation simultanée de boissons alcoolisées. Cela peut persister jusqu'à 48 heures après l'administration de Lorazepam Macure.

Vous ne devez pas consommer d'alcool pendant les 48 heures qui suivent l'administration de Lorazepam Macure.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez utiliser Lorazepam Macure pendant la grossesse que si c'est strictement nécessaire, pendant une durée aussi courte que possible, et à la posologie la plus faible possible.

Le lorazepam passe dans le lait maternel en faible quantité. Il n'est pas recommandé d'allaiter pendant la prise de Lorazepam Macure.

On ne dispose pas de données sur les éventuels effets sur la fertilité féminine du lorazepam administré par injection ou perfusion.

Par ailleurs, Lorazepam Macure contient de l'alcool benzylique, un conservateur qui peut traverser le placenta et passer dans le lait maternel. Lorazepam Macure contient également du propylène glycol (voir « Lorazepam Macure contient de l'alcool benzylique, du propylène glycol et du polyéthylène glycol »).

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Pour contrôler un véhicule ou utiliser des machines, vous devez être capable de réagir et de prendre des décisions correctement et adéquates. Vous devez également être capable de vous déplacer rapidement et correctement.

Si vous recevez Lorazepam Macure, ces aptitudes peuvent être réduites parce que Lorazepam Macure peut réduire la vigilance, la réactivité, la mémoire et la précision des mouvements musculaires.

En conséquence, vous ne devez pas conduire de véhicules ou pratiquer d'autres activités nécessitant de la vigilance pendant les 24 à 48 heures qui suivent l'administration.

### **Lorazepam Macure contient de l'alcool benzylique, du propylène glycol et du polyéthylène glycol**

Lorazepam Macure contient 21 mg d'alcool benzylique, 840 mg de propylène glycol et 189 mg de polyéthylène glycol par ml.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si votre enfant a moins de 5 ans, si vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein, ou si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. En effet, les excipients peuvent provoquer des effets indésirables. Votre médecin devra peut-être adapter la dose si vous ou votre enfant utilisez d'autres médicaments qui contiennent de l'alcool benzylique, du propylène glycol ou de l'alcool.

L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques.

L'alcool benzylique est associé à un risque d'effets secondaires graves, y compris des problèmes respiratoires (appelés « syndrome de suffocation ») chez les jeunes enfants. Les médicaments contenant de l'alcool benzylique ne doivent pas être donnés au nouveau-né (jusqu'à 4 semaines) et ne doivent pas être utilisés pendant plus d'une semaine chez les jeunes enfants (moins de 3 ans), sauf avis contraire de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne prenez pas ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin. Votre médecin pourra procéder à des contrôles supplémentaires pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein, ne prenez ce médicament que sur avis de votre médecin. Votre médecin pourra procéder à des examens complémentaires pendant que vous prenez ce médicament.

Des cas de toxicité du polyéthylène glycol (nécrose tubulaire aiguë, par exemple) ont été signalés lors de l'administration de lorazepam, notamment lorsque le lorazepam a été administré à des doses supérieures aux doses recommandées.

## **3. Comment utiliser Lorazepam Macure**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

### **1. Prémédication**

La dose recommandée que vous recevrez normalement en injection dans une veine (voie intraveineuse) dépend de votre poids (0,044 mg par kg de poids corporel), sans dépasser un total de 2 mg, 15 à 20 minutes avant l'intervention prévue. Dans certains cas, des doses supérieures, allant jusqu'à 4 mg, peuvent être administrées.

La dose recommandée en cas d'administration dans un muscle (voie intramusculaire) est de 0,05 mg par kg de poids corporel, jusqu'à un maximum de 4 mg, au moins 2 heures avant l'intervention prévue.

2. Traitement des symptômes d'anxiété et de tension sévères chez les personnes qui ne peuvent pas prendre des comprimés

La dose recommandée est de 2 à 4 mg, soit 0,05 mg par kg de poids corporel. Si nécessaire, une nouvelle dose peut être administrée au bout de 2 heures. Le médicament sera injecté dans une veine (voie intraveineuse) ou dans un muscle (voie intramusculaire).

3. État de mal épileptique

Dose chez l'adulte : 4 mg par voie intraveineuse.

Personnes âgées (plus de 65 ans) : une réponse peut être obtenue avec des doses plus faibles chez les personnes âgées ; la moitié de la dose normalement utilisée chez les adultes peut donc suffire.

Posologie chez les adolescents, les enfants et les nourrissons à partir de l'âge de 1 mois : 0,1 mg/kg de poids corporel par voie intraveineuse, avec un maximum de 4 mg par dose.

Si la crise d'épilepsie dure plus de 10-15 minutes, le médecin peut décider d'administrer une dose supplémentaire. Au maximum, 2 doses pourront être administrées.

Votre enfant ne doit pas recevoir plus de deux doses répétées le même jour, s'il est âgé de moins de 5 ans.

#### **Utilisation chez l'enfant**

Lorazepam Macure ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans, sauf pour le contrôle de l'état de mal épileptique. En cas d'état de mal épileptique, ce médicament ne doit pas être utilisé chez les nouveau-nés (voir rubrique 2).

#### **Utilisation chez les patients âgés et affaiblis**

Votre médecin vous prescrira une dose plus faible. En outre, votre médecin vous surveillera régulièrement et adaptera la dose en fonction de votre réponse.

#### **Patients avec maladie rénale ou hépatique**

Lorazepam Macure ne doit pas être utilisé chez les patients qui présentent des troubles hépatiques sévères. Quand Lorazepam Macure est utilisé chez des patients avec troubles hépatiques ou rénaux légers ou modérés, le médecin peut prescrire une dose plus faible.

#### **Si vous avez reçu plus de Lorazepam Macure que vous n'auriez dû**

Si on vous a administré plus de médicament que vous n'auriez dû, vous pourriez connaître les symptômes suivants : somnolence, confusion mentale et léthargie en cas de surdosage léger ; hypotension artérielle, difficulté à contrôler les mouvements, problèmes respiratoires et coma, dans les cas graves.

En cas de surdosage, le traitement reposera principalement sur des mesures de soutien, notamment le maintien de la respiration et la surveillance de l'équilibre hydrique (quantité de liquide absorbé et éliminé).

Si vous avez utilisé ou pris trop de Lorazepam Macure, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

#### **Si vous arrêtez d'utiliser Lorazepam Macure**

Vous devez suspendre ou arrêter le traitement uniquement en suivant les instructions du médecin.

Si vous êtes traité(e) pour des symptômes d'anxiété sévère et que le traitement est arrêté brusquement, il est possible qu'un ou plusieurs des symptômes de sevrage suivants surviennent : maux de tête, douleurs musculaires, peur extrême, anxiété, tension, excitation, agitation, confusion, irritabilité, sautes d'humeur, sudation, dépression et insomnie.

Dans les cas plus graves, les symptômes de sevrage peuvent être les suivants : perte des sensations, perte de la réalité, où l'environnement (familier) semble irréel, aliénation de soi et de l'estime de soi

(dépersonnalisation), engourdissement et picotements dans les bras et les jambes, augmentation importante de la sensibilité à la lumière, au bruit et au toucher, augmentation de la sensibilité de l'audition, douleurs dans les oreilles, mouvements involontaires, vomissements, délires (hallucinations) ou crises de chute (crises d'épilepsie).

En outre, les symptômes pour lesquels vous avez reçu Lorazepam Macure peuvent revenir temporairement avec une forte intensité.

Afin de minimiser le risque d'apparition de ces symptômes, il est recommandé de réduire progressivement la posologie lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre infirmier/ère.

#### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables surviennent généralement au début du traitement et disparaissent progressivement au cours du traitement ou lorsque la dose est diminuée.

Les effets indésirables suivants ont été signalés lors d'utilisation de lorazépam :

**Très fréquent** : peut affecter plus de 1 personne sur 10

- fatigue

**Fréquent** : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- somnolence pendant la journée
- somnolence
- vertiges
- troubles de la coordination
- vomissements
- faiblesse musculaire

**Peu fréquent** : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- confusion
- dépression
- indifférence émotionnelle
- troubles du sommeil
- mal de tête
- diminution de la vigilance
- troubles de la vue
- vision double (diplopie)
- nausées
- troubles gastro-intestinaux
- réactions cutanées, chute de cheveux
- modification de la libido

**Rare** : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- anomalies sanguines (dyscrasie)
- perte de mémoire temporaire
- réactions paradoxales
- diminution de la pression sanguine (hypotension)
- augmentation de la pression sanguine (hypertension)
- anomalies liées à une maladie du foie
- troubles psychiatriques : excitation (agitation), nervosité, irritabilité, agressivité, méfiance, crises de rage, cauchemars, observation de choses qui n'existent pas (hallucinations), maladie

mentale sévère dans laquelle le contrôle du comportement et le comportement sont perturbés (psychose), comportement inapproprié. Ces effets indésirables surviennent principalement chez les enfants et les patients âgés.

**Autres effets indésirables :**

- réactions d'hypersensibilité soudaines (dans les minutes ou les heures suivant l'administration), incluant des difficultés respiratoires, des éruptions cutanées et un évanouissement (réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes). Ces réactions peuvent menacer le pronostic vital.
- anomalies sanguines (thrombopénie, agranulocytose, pancytopénie)
- douleur, sensation de brûlure, rougeur et inflammation au niveau du site d'injection
- dépendance pouvant apparaître après une utilisation répétée pendant plusieurs semaines (voir rubrique 2)
- difficultés respiratoires en cas d'anesthésie profonde
- symptômes de sevrage après l'arrêt du traitement (voir la rubrique « Si vous arrêtez d'utiliser Lorazepam Macure »)
- gonflement
- pensées suicidaires ou tentatives de suicide
- difficultés à parler
- crises convulsives
- coma
- diminution de la température corporelle

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Division Vigilance :

Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail : [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver Lorazepam Macure**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver et transporter réfrigéré (entre 2 °C et 8 °C).

Conserver l'ampoule dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Une stabilité chimique et physique effective a été démontrée pendant 1 heure entre 2 et 8 °C. D'un point de vue microbiologique, le médicament doit être utilisé immédiatement, à moins que la méthode d'ouverture/dilution n'exclue tout risque de contamination microbienne. Si l'utilisation n'est pas immédiate, l'utilisateur est responsable de la durée et des conditions de conservation du médicament.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous observez des particules visibles dans la solution.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Lorazepam Macure

- La substance active est le lorazépam ; chaque ml de solution contient 4 mg de lorazépam.
- Les autres composants sont le propylène glycol (E1520), le polyéthylène glycol 400 (macrogol 400) et l'alcool benzylique.

### Aspect de Lorazepam Macure et contenu de l'emballage extérieur

Solution hypertonique transparente, incolore ou presque incolore, exempte de particules visibles. Lorazepam Macure est conditionné en ampoule de verre transparent de type I (PE), d'une capacité de remplissage de 2 ml.

Chaque ampoule contient 1 ml de solution.

Les ampoules sont placées dans des plateaux thermoformés en chlorure de polyvinyle, qui sont ensuite scellés par un film de protection transparent en PE. Les plateaux en chlorure de polyvinyle sont insérés dans une boîte en carton avec une notice.

Lorazepam Macure est fourni en emballages de 5 ou 10 ampoules de 1 ml de solution.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Macure Pharma ApS  
Hejrevej 39  
2400 Copenhagen NV  
Danemark

### Fabricant

Medochemie Ltd  
48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area  
4101 Agios Athanassios, Lemesos  
Chypre

### Numéro(s) de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BE590924

**Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace économique européen sous les noms suivants :**

Pays-Bas	Lorazepam Macure 4 mg/ml oplossing voor injectie
Danemark	Lorazepam Macure
Suède	Lorazepam Macure 4 mg/ml injektionsvätska, lösning
Finlande	Lorazepam Macure 4 mg/ml injektioneste, liuos
Norvège	Lorazepam Macure
Autriche	Lorazepam Macure 4 mg/ml Injektionslösung
Allemagne	Lorazepam Macure 4 mg/ml Injektionslösung
Belgique	Lorazepam Macure 4 mg/ml solution injectable/ oplossing voor injectie/ Injektionslösung
Irlande	Lorazepam Macure 4 mg/ml solution for injection
Italie	Lorazepam Macure
Slovénie	Lorazepam Macure 4 mg/ml raztopina za injiciranje

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2025.**

-----  
Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de la santé :

**Indications d'utilisation**

Lorazepam Macure est légèrement visqueux quand il est froid.

Administration intramusculaire :

Afin de faciliter l'administration intramusculaire, il est recommandé de diluer avec un volume égal d'une solution compatible, comme une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %), une solution de glucose à 50 mg/ml (5 %) ou de l'eau pour préparations injectables.

Lorazepam Macure peut aussi être administré non dilué par injection profonde dans une masse musculaire importante.

Administration intraveineuse :

Pour une administration intraveineuse, Lorazepam Macure doit toujours être dilué avec un volume égal d'un des diluants suivants : solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %), solution de glucose à 50 mg/ml (5 %) ou eau pour préparations injectables

La vitesse d'injection ne doit pas dépasser 2 mg/min. Avant l'administration, les médicaments parentéraux doivent être examinés visuellement pour détecter la présence de particules ou de changement de coloration.

*Instructions de dilution pour l'administration intraveineuse*

Prélever la quantité désirée de Lorazepam Macure dans la seringue, puis aspirer lentement le volume désiré de diluant. Reculer légèrement le piston pour disposer d'un espace de mélange supplémentaire. Mélanger immédiatement le contenu en retournant plusieurs fois la seringue jusqu'à obtention d'une solution homogène. Ne pas agiter afin d'éviter la formation de bulles d'air.

Lorazepam Macure ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments dans la même seringue. Ne pas utiliser si la solution présente un changement de couleur ou un précipité.

Pas d'exigences particulières pour l'élimination. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.