

Notice : information de l'utilisateur

RENNIE ANTIACIDE-ANTIREFLUX 625 MG/73,5 MG/150 MG COMPRIMÉS À CROQUER

carbonate de calcium, carbonate de magnésium, acide alginique

Comprimés à croquer

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 14 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer
3. Comment prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer et dans quel cas est-il utilisé ?

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer appartiennent à un groupe de médicaments appelés antiacides. Ce médicament soulage les symptômes associés à une production excessive d'acide gastrique et à l'indigestion acide, tels que les brûlures d'estomac, la sensation de plénitude, les nausées, les vomissements et les ballonnements. À ces fins, ce médicament antiacide peut être administré aux adultes et aux adolescents de plus de 12 ans.

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer possède un double mécanisme d'action :

1. L'acide alginique forme une barrière protectrice dans l'estomac, qui empêche les remontées acides et apaise les brûlures d'estomac
2. Le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium neutralisent rapidement et durablement l'excès d'acide dans l'estomac

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer ?

Ne prenez jamais Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer:

- Si vous avez une grave maladie rénale ou si vous souffrez de calculs rénaux (pierres aux reins).
- Si vous avez des taux élevés de calcium ou de faibles taux de phosphate dans le sang.
- Si vous êtes allergique au carbonate de calcium, au carbonate de magnésium, à l'acide alginique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions :

Comme avec les autres antiacides, la prise de ces comprimés à croquer peut masquer les symptômes d'autres troubles médicaux sous-jacents, plus graves. Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer si vous avez des problèmes au niveau des reins, si on vous a diagnostiqué une sarcoïdose (maladie inflammatoire affectant plusieurs organes dans le corps) ou si vous souffrez de maladies ou de symptômes gastro-intestinaux sévères ou chroniques.

Autres médicaments et Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer :

- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
- Si vous prenez des antibiotiques (tétracyclines, quinolones), des glycosides cardiaques (digoxine, digitoxine), des bisphosphonates (utilisés pour le traitement de l'ostéoporose), du dolutégravir (un antirétroviral utilisé pour le traitement de l'infection par le VIH), de la lévothyroxine (une hormone thyroïdienne), de l'eltrombopag (un médicament utilisé pour augmenter le nombre de plaquettes) ou d'autres médicaments sur prescription (p. ex. produits contenant du fluor, du phosphate ou du fer), adressez-vous à votre médecin avant de prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer, car ce dernier peut avoir une influence sur l'efficacité de ces médicaments. Afin de maximiser les bénéfices de tous les médicaments utilisés, veuillez prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer 1 à 2 heures après avoir pris tout autre médicament.
- Si vous prenez des diurétiques thiazidiques (p. ex. bendrofluméthiazide), qui sont utilisés pour augmenter la production d'urine, adressez-vous à votre médecin avant de prendre ce médicament, car il pourrait être souhaitable de surveiller les taux de calcium dans votre sang.

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer avec des aliments et boissons

Comme avec tous les antiacides contenant du calcium, la consommation simultanée de grandes quantités de lait ou de produits laitiers doit être évitée.

Grossesse et allaitement : Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer peut être utilisé pendant la grossesse s'il est pris conformément aux instructions. Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer peut être utilisé pendant la période d'allaitement s'il est pris conformément aux instructions (voir rubrique 3).

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer fournissant une quantité considérable de calcium en plus de l'apport alimentaire de calcium, les femmes enceintes doivent strictement limiter leur utilisation de Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer à la dose quotidienne maximale recommandée et éviter toute consommation excessive concomitante de lait (1 litre contient jusqu'à 1,2 g de calcium élémentaire) et de produits laitiers.

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer contient du sodium, du glucose et du saccharose :

Ce médicament contient 14 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par comprimé. Cela équivaut à 0,7 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

Ce médicament contient également 230 mg de saccharose et environ 555,2 mg de glucose (y compris issu de dextrans). Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Le glucose et le saccharose peuvent en outre être nocifs pour les dents.

3. Comment prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans uniquement : 2 comprimés à croquer, de préférence 1 heure après le repas et avant le coucher. Pour les brûlures d'estomac, 2 comprimés à croquer supplémentaires peuvent être croqués entre ces deux prises. Ne pas dépasser 12 comprimés à croquer par 24 heures.

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer peut être utilisé pendant la grossesse et la période d'allaitement s'il est pris conformément aux instructions ci-dessus.

Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin afin d'exclure une maladie plus grave. Éviter toute utilisation prolongée. Ce médicament n'est pas destiné à être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Si vous avez pris plus de Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer que vous n'auriez dû : Buvez beaucoup d'eau et prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, un hôpital ou le Centre Antipoison (070/245.245). Les symptômes d'un surdosage comprennent : nausées et vomissements, constipation, fatigue, augmentation de la production d'urine, soif excessive, déshydratation et faiblesse musculaire anormale.

Si vous oubliez de prendre Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables sont peu probables aux doses recommandées.

On a rarement rapporté des réactions allergiques aux ingrédients, p. ex. éruption cutanée, démangeaisons, difficultés à respirer ou gonflement du visage, de la bouche ou de la gorge, et choc anaphylactique. Si vous présentez ce type de réactions, arrêtez immédiatement le traitement et demandez un avis médical.

L'utilisation prolongée de doses élevées peut entraîner des taux sanguins élevés de calcium et de magnésium, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes rénaux. Ces taux élevés peuvent provoquer des nausées et des vomissements, des dérangements d'estomac, une diarrhée, une fatigue, une faiblesse musculaire, un état confusionnel, une augmentation de la production d'urine, une soif excessive et une déshydratation.

La prise de Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer avec du lait ou des produits laitiers pendant une longue période peut provoquer un syndrome des buveurs de lait, susceptible d'entraîner des taux élevés de calcium dans le sang. Les symptômes spécifiques du syndrome des buveurs de lait peuvent comprendre une altération du sens du goût, des maux de tête, des problèmes au niveau des reins, une fatigue et la formation de petites boules sous la peau.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

www.afmps.be
Département Vigilance
Site Internet : www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé
Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le film après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. A conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer :

Les substances actives sont : carbonate de calcium (625 mg), carbonate de magnésium (73,5 mg) et acide alginique (150 mg).

Les autres composants sont : bicarbonate de sodium, saccharose, glucose monohydraté, povidone, talc, stéarate de magnésium, dextrans, saccharine de sodium, arôme de crème au citron (contenant : essence de citron, essence de lime, essence d'orange, L-menthol, vanilline, maltodextrine, gomme arabique, acide ascorbique, butylhydroxyanisole), arôme de menthe poivrée (contenant : essence de menthe poivrée, maltodextrine, gomme arabique, dioxyde de silicium).

Aspect de Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer et contenu de l'emballage extérieur :

Rennie Antiacide-Antireflux comprimés à croquer se présente sous la forme de comprimés à croquer de forme circulaire, de couleur blanc cassé tacheté, lisses sur les deux faces, à bords biseautés.

Ils sont fournis sous films thermosoudés, dans une boîte contenant cette notice.

Les comprimés à croquer sont disponibles en emballages de 12, 18, 24, 30, 36 et 48.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Bayer SA-NV

Kouterveldstraat 7A 301

B-1831 Diegem

Fabricant

Delpharm Gaillard

33 rue de l'Industrie

74240 Gaillard

France

Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché

BE585040

LU : 2021060126

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Autriche: Rennie Antacidum plus Alginat, 625mg/73,5mg/150mg Kautabletten

Belgique/Luxembourg: Rennie Antiacide-Antireflux, comprimés à croquer

Chypre/Grèce: Rennie Double Action, chewable tablets

République tchèque: Rennie PLUS

Finlande: Rennie Comp

Hongrie: Rennie Extra, rágótabletta

Malte: Rennie Dual Action, Chewable tablet

Pologne: Rennie Extra

Portugal: Rennie Dual Action

Slovaquie: Rennie Plus 625mg/73,5mg/150mg žuvacie tablety

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2024