

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**Carbobel mono 300 mg tabletten**

Geactiveerde kool

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Carbobel mono tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Carbobel mono tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Dit geneesmiddel, op basis van planten, wordt ingenomen bij de symptomatische behandeling van moeilijke spijsvertering gepaard gaande met lucht in het maag-darmkanaal en lichte diarree, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.

Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Na gebruik van ipeca of in geval van intoxicaties met cyaniden, sterke zuren, sterke basen, ijzersulfaat, lithium, malathion en DDT, organische oplossingen zoals methanol, ethyleenglycol.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Indien u suikerziekte hebt. Zie rubriek "Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Carbobel".
- Het inademen van geactiveerde kool moet vermeden worden.
- Tijdens de behandeling, van diarree, moet u voldoende drinken. Elke diarree veroorzaakt vochtverlies en verlies aan minerale zouten. Dit verlies moet gecompenseerd worden.
- Zeer hoge doses, gedurende langere tijd ingenomen, kunnen door opname van spijsverteringsenzymen en vitaminen, spijsverteringsmoeilijkheden en vitaminegebrek veroorzaken.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.

Kinderen

- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar.

- Niet toedienen aan kinderen tussen 3 en 6 jaar indien dit niet door uw arts werd voorgeschreven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neemt u naast Carbobel mono tabletten nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Niet samen met andere geneesmiddelen gebruiken. Door zijn niet selectieve adsorberende werking kan geactiveerde kool de opname van verschillende geneesmiddelen verminderen. Bijzondere voorzorgen worden bijgevolg aanbevolen bij het gebruik van een oraal voorbehoedmiddel, een antistolling-middel, antibiotica.

Bij gelijktijdig gebruik van geactiveerde kool en orale contraceptiva ('de pil') is een aanvullende methode van geboortebeperring noodzakelijk.

Het is aangewezen om tussen de inname van Carbobel mono tabletten en de inname van een ander geneesmiddel een periode van 2 tot 4 uur in acht te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Carbobel Mono tabletten kan tijdens zwangerschap en borstvoeding overwogen worden, indien nodig.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Carbobel Mono 300 heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Carbobel mono tabletten bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt. 1 tablet bevat 501 mg sucrose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Carbobel mono tabletten bevat natrium. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Carbobel is een middel tegen diarree en is enkel bestemd om, als zodanig, langs de mond in te nemen.

De aanbevolen dosering is voor volwassenen 2 tot 4 tabletten per inname (dit komt overeen met 600 tot 1.200 mg geactiveerde kool). De maximale dagelijkse dosering is 12 tabletten (overeenkomend met 3.600 mg).

Gebruik bij kinderen

De aanbevolen dosering voor kinderen vanaf 3 jaar is 1 tot 3 tabletten per inname (dit komt overeen met 300 tot 900 mg geactiveerde kool). De maximale dagelijkse dosering is 9 tabletten (overeenkomend met 2.700 mg).

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar en zonder medisch advies niet gebruiken bij kinderen van 3 tot 6 jaar.

De tabletten kauwen en eventueel de mond met een glas water naspoelen.

Deze dosering kan driemaal per dag worden gegeven. De inname gebeurt na de maaltijd.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van Carbobel mono tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dunne darm obstructie kan ontstaan na toediening van hoge doses geactiveerde kool. Contacteer in voorkomend geval uw apotheker of behandelende arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel.

Niet van toepassing.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Frequentie niet bekend (kan aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
na gebruik van Carbobel mono tabletten kan de stoelgang zwart gekleurd zijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website www.eenbijwerkingmelden.be

Email adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is actieve koolstof
- De andere stoffen in dit middel zijn Sucrose, Magnesium stearaat en Natriumcarboxymethylcellulose. (Zie rubriek 2 'Carbobel mono tabletten bevat sucrose')

Hoe ziet Carbobel mono, 300 mg tabletten eruit en wat zit er in een verpakking?

PET fles met draaidop, 35 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Perrigo Belgium NV
Gaston Crommenlaan 6 bus 606
B-9050 Gent

Fabrikant

Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3
7891 EV Klazienaveen
Nederland

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE565173

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2025.