

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tadalafil EG 20 mg filmomhulde tabletten Tadalafil

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Tadalafil EG en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Tadalafil EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Tadalafil EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tadalafil EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Tadalafil EG en waarvoor wordt het ingenomen?

Tadalafil EG bevat de actieve stof tadalafil, die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiësteraseremmers type 5 worden genoemd.

Tadalafil EG wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen mannen met:

- **erectiestoornis.** Dit is wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Het is gebleken dat tadalafil de mogelijkheid om een voor seksuele activiteit geschikte erectie significant verbetert.

Na seksuele prikkeling helpt Tadalafil EG de bloedvaten in de penis te ontspannen, waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie.

Tadalafil EG werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft. Het is belangrijk om te weten dat Tadalafil EG voor de behandeling van erectiestoornis niet werkt als er geen seksuele prikkel is.

U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

2. Wanneer mag u Tadalafil EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

- U bent allergisch voor tadalafil of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft (zoals amylnitriet). Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat tadalafil de werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts.
- U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
- U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.

- U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
- U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”.
- U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals tadalafil, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts.

Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen hebt:

- sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen),
- multipel myeloom (beenmergkanker),
- leukemie (bloedcelkanker),
- een misvorming van uw penis,
- een ernstig leverprobleem,
- een ernstig nierprobleem.

Het is niet bekend of Tadalafil EG werkzaam is bij patiënten die:

- een bekkenoperatie hebben ondergaan,
- een algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier hebben ondergaan, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn doorsneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie).

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, of als uw gezichtsvermogen vervormd of vervaagd is terwijl u Tadalafil EG gebruikt, stop dan de inname van Tadalafil EG en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet u stoppen met de inname van Tadalafil EG en contact opnemen met uw arts zodra u plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt.

Tadalafil EG is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Tadalafil EG is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Tadalafil EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem Tadalafil EG niet in als u al nitraten inneemt.

Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door Tadalafil EG of kunnen invloed hebben op hoe Tadalafil EG werkt. Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:

- een alfablokker (gebruikt tegen hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigne prostaathypertrofie),

- andere geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk,
- riociguat,
- een 5-alfareductaseremmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie),
- geneesmiddelen zoals ketoconazoltabletten (tegen schimmelinfecties) en proteaseremmers tegen aids of een hiv-infectie,
- fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen tegen toevallen),
- rifampicine, erythromicine, clarithromycine of intraconazol,
- andere behandelingen voor erectiestoornissen.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed Tadalafil EG zal werken en voorzichtigheid is geboden bij de consumptie ervan. Vraag uw arts voor meer informatie hierover.

Vruchtbaarheid

In experimenten bij dieren was er minder spermaproductie in de testes. Een vermindering in sperma is ook gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mannen die tadalafil in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid. Controleer hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient.

Tadalafil EG bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Tadalafil EG bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u dit Tadalafil EG in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen startdosis is 10 mg tadalafil voordat seksuele activiteit plaatsvindt.

U werd echter de dosis van één tablet van 20 mg voorgeschreven, aangezien uw arts oordeelde dat de aanbevolen dosis van 10 mg te laag is.

Niet alle aanbevolen doses zijn mogelijk met tabletten van 20 mg; tadalafil kan ook beschikbaar zijn als tabletten van 2,5, 5 en 10 mg. Mogelijk worden niet alle doseringen in de handel gebracht.

Toedieningswijze

Tadalafil EG tabletten zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. De tablet kan met of zonder voedsel ingenomen worden.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses. Druk met één vinger op de tablet op een stevige ondergrond om de tablet te breken.

U dient een tablet Tadalafil EG ten minste 30 minuten voor de seksuele activiteit in te nemen. Tadalafil EG kan nog tot 36 uur na inname van de tablet werkzaam zijn.

Neem Tadalafil EG niet meer dan eenmaal per dag. Doses van 10 en 20 mg zijn bedoeld voor gebruik vóór verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor doorlopend dagelijks gebruik.

Let op

Het is belangrijk om te weten dat Tadalafil EG niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan tijdelijk uw bloeddruk verlagen. Als u Tadalafil EG hebt ingenomen of als u van plan bent Tadalafil EG in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (bijv. meer dan 900 ml bier of 350 ml wijn), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten.

Heeft u te veel van Tadalafil EG ingenomen?

Licht uw arts in. U kunt bijwerkingen krijgen zoals beschreven in rubriek 4.

Wanneer u te veel van Tadalafil EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht tot matig van aard.

Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Tadalafil EG en zoek dan directe medische hulp:

- allergische reactie waaronder huiduitslag (soms voorkomend).
- pijn op de borst - gebruik geen nitraten, maar raadpleeg onmiddellijk een arts (soms voorkomend)
- priapisme, een verlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van Tadalafil EG (zelden voorkomend). Als u een erectie heeft die langer dan 4 uur aanhoudt, neem dan direct contact op met uw arts.
- plots gezichtsverlies (zelden voorkomend), vervormd, vervaagd, wazig centraal zicht of plotseling verminderd zicht (frequentie niet bekend).

Andere bijwerkingen die worden gemeld zijn:

Vaak (kunnen tot 1 op 10 mensen treffen)

- hoofdpijn
- rugpijn
- spierpijn
- pijn in armen en benen
- blozen in het gezicht
- neusverstopping
- spijsverteringsproblemen

Soms (kunnen tot 1 op 100 mensen treffen)

- duizeligheid
- buikpijn
- misselijkheid
- overgeven

- reflux
- wazig zien
- oogpijn
- moeite met ademen
- aanwezigheid van bloed in de urine
- langdurige erectie
- hartkloppingen
- een snelle hartslag
- hoge bloeddruk
- lage bloeddruk
- neusbloedingen
- oorsuizingen
- zwellen van de handen, voeten of enkels
- vermoeidheid

Zelden (kunnen tot 1 op 1000 mensen treffen)

- flauwvallen
- toevallen
- voorbijgaand geheugenverlies
- zwelling van de ogen
- rode ogen
- plotselinge vermindering of verlies van het gehoor
- netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak)
- bloeding van de penis
- aanwezigheid van bloed in het sperma
- toegenomen transpiratie

Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die tadalafil gebruiken. De meeste van die mannen hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen.

Er is in zeldzame gevallen melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen.

Sommige andere bijwerkingen zijn **zelden** gemeld bij mannen die tadalafil innamen die niet werden gezien tijdens klinische onderzoeken. Deze omvatten:

- migraine
- opgezwollen gezicht
- ernstige allergische reactie waardoor het gezicht en de keel opzwellen
- ernstige huiduitslag
- bepaalde stoornissen in de bloedtoevoer naar de ogen
- onregelmatige hartslag
- angina
- plotse hartstilstand
- vervormd, vervaagd, wazig centraal zicht of plotseling vermindering van het gezichtsvermogen (frequentie niet bekend)

Duizeligheid is vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die tadalafil gebruiken. Diarree is vaker gemeld bij mannen boven de 65 jaar die tadalafil gebruiken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: **België:** Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) – Afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03, 1210 Brussel of Postbus 97, 1000 Brussel Madou. Website: www.eenbijwerkingmelden.be of e-mail: adr@fagg.be. **Luxemburg:** Centre Régional de

Pharmacovigilance de Nancy of Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé : www.guichet.lu/pharmacovigilance. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Tadalafil EG?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na "EXP". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebroken tabletten mogen niet meer worden gebruikt na 4 weken bewaring.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Tadalafil EG?

- De **werkzame stof** in dit middel is tadalafil.
Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg tadalafil.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern:
Lactosemonohydraat
Crosscarmellosematrium
Natriumlaurylsulfaat (E487)
Hydroxypropylcellulose
Polysorbaat
Microkristallijne cellulose
Magnesiumstearaat.

Filmomhulling:
Hypromellose
Lactosemonohydraat
Titaandioxide (E171)
Triacetine
Geel ijzeroxide (E172)
Talk

Hoe ziet Tadalafil EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tadalafil EG 20 mg is een gele, ronde, biconvexe filmomhulde tablet met een kruisvormige breukstreep aan beide kanten, wit bij de dwarsdoorsnede met een diameter van $10,1 \pm 0,2$ mm. De tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke doses.

Verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4x 1, 8x 1, 12x 1, 16x 1, 20x 1, 24x 1, 28x 1, 30x 1, 36x 1, 48x 1, 56x 1 en 60x 1 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EG (Eurogenerics) NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brussel

Fabrikanten

STADA Arzneimittel AG – Stadastrasse 2-18 – Dortelweil – 61118 Bad Vilbel – Hesse – Duitsland

Stada Arzneimittel GmbH – Muthgasse 36/2 – Doebling – 1190 Wenen – Oostenrijk

Clonmel Healthcare Limited – 3 Waterford Road – E91 D768 Clonmel – Co. Tipperary - Ierland

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

NL: Tadalafil STADA 20 mg filmomhulde tabletten

AT: Lehasofu 20 mg Filmtabletten

BE: Tadalafil EG 20 mg filmomhulde tabletten

DE: Tadalafil STADA 20 mg Filmtabletten

ES: Tadalafil STADAGEN 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

FR: Tadalafil EG LABO 20 mg comprimé pelliculé

IE: Tadalafil Clonmel 20 mg Film-coated Tablets

LU: Tadalafil EG 20 mg comprimés pelliculés

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE561946

Afleveringswijze: op medisch voorschrift

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2023.