

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Airbufo Forspiro, 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm/Inhalation, einzeldosiert Pulver zur Inhalation

Budesonid/Formoterolfumarat-Dihydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Airbufo Forspiro und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Airbufo Forspiro beachten?
3. Wie ist Airbufo Forspiro anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Airbufo Forspiro aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Airbufo Forspiro und wofür wird es angewendet?

Airbufo Forspiro ist ein Inhalator, der angewendet wird zur Behandlung von:

- **Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren.**
- Symptomen einer **chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) bei Erwachsenen** im Alter ab 18 Jahren.

Es enthält zwei unterschiedliche Arzneimitteln: Budesonid und Formoterolfumarat-Dihydrat.

- Budesonid gehört zur Arzneimittelgruppe der sogenannten „Corticosteroide“. Es wirkt, indem es Schwellungen und Entzündungen in Ihren Lungen verringert und verhindert.
- Formoterolfumarat-Dihydrat gehört zur Arzneimittelgruppe der sogenannten lang wirksamen „Beta₂-Adrenozeptor-Agonisten“ oder „Bronchodilatoren“. Es wirkt, indem es die Muskeln in deinen Atemwegen entspannt. Dies trägt dazu bei, dass Sie freier atmen.

Asthma

Für eine Asthmabehandlung kann Airbufo Forspiro auf zwei unterschiedliche Arten verordnet werden.

- a) Einigen Personen werden zwei Asthma-Inhalatoren verordnet: Airbufo Forspiro und ein separater „Reliever-Inhalator“.
 - Sie wenden Airbufo Forspiro jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern.
 - Sie wenden ihren „Reliever-Inhalator“ an, wenn sie Asthmasymptome bekommen, damit sie wieder freier atmen können.
- b) Einigen Personen wird Airbufo Forspiro als einziger Asthma-Inhalator verschrieben.
 - Sie wenden Airbufo Forspiro jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern.
 - Sie wenden Airbufo Forspiro auch an, wenn sie zusätzliche Dosen zur Linderung der Asthmasymptome benötigen, damit sie wieder freier atmen können. Sie benötigen dafür keinen separaten Inhalator.

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

Airbufo Forspiro kann auch zur Behandlung der Symptome einer COPD bei Erwachsenen angewendet werden. Die COPD ist eine langfristige Erkrankung, die durch anhaltende, durch verengte Atemwege in der Lunge verursachte Atembeschwerden gekennzeichnet ist und oft mit Husten und Auswurf einhergeht. Sie wird häufig durch Zigarettenrauchen verursacht.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Airbufo Forspiro beachten?

Airbufo Forspiro darf nicht angewendet werden, wenn

- Sie allergisch gegen Budesonid, Formoterol oder den sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels, Lactose (die geringe Mengen Milchproteine enthält), sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Airbufo Forspiro anwenden, wenn:

- Sie Diabetiker sind.
- Sie eine Lungeninfektion haben.
- Sie einen hohen Blutdruck haben oder jemals ein Herzproblem hatten (einschließlich eines unregelmäßigen Herzschlags, eines sehr schnellen Pulses, einer Arterienverengung oder einer Herzinsuffizienz).
- Sie Probleme mit der Schilddrüse oder den Nebennieren haben.
- Sie niedrige Kaliumspiegel im Blut haben.
- Sie eine schwere Lebererkrankung haben.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn bei Ihnen verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen auftreten.

Anwendung von Airbufo Forspiro zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker insbesondere, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel anwenden:

- Betablocker (wie Atenolol oder Propranolol zur Behandlung von Bluthochdruck), einschließlich Augentropfen (wie Timolol zur Behandlung eines Glaukoms).
- Arzneimittel zur Behandlung eines schnellen oder unregelmäßigen Herzschlags (wie Chinidin, Disopyramid, Procainamid).
- Arzneimittel zur Behandlung von Allergien, die auch als Antihistaminika bezeichnet werden, wie Terfenadin.
- Oxytocin, ein Arzneimittel zur Erleichterung einer Entbindung.
- Procarbazin, ein Arzneimittel zur Behandlung von Krebs.
- Arzneimittel wie Digoxin, die häufig zur Behandlung einer Herzinsuffizienz angewendet werden.
- Diuretika, die auch „Wassertabletten“ genannt werden (wie z. B. Furosemid). Diese werden zur Behandlung eines Bluthochdrucks angewendet.
- Corticosteroide (wie Prednisolon). Diese werden zur Behandlung von Entzündungen verwendet, oder um zu verhindern, dass ein transplantiertes Organ abgestoßen wird.
- Arzneimittel, die Xanthine (z. B. Theophyllin oder Aminophyllin) enthalten. Diese werden häufig zur Behandlung von Asthma angewendet.
- Andere Arzneimittel zur Erweiterung der Atemwege, die auch Bronchodilatoren genannt werden (wie Salbutamol).
- Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen, die auch als trizyklische Antidepressiva

bezeichnet werden (z. B. Amitriptylin) und das Antidepressivum Nefazodon.

- Arzneimittel zur Behandlung von psychischen Erkrankungen, Übelkeit oder Erbrechen, die Phenothiazine genannt werden (z. B. Chlorpromazin und Prochlorperazin).
- Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen (wie Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol) und bakteriellen Infektionen (wie Clarithromycin und Telithromycin, Furazolidon).
- Arzneimittel zur Behandlung der Parkinson-Krankheit (z. B. Levodopa).
- Arzneimittel zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen (z. B. Levothyroxin).
- Ritonavir, Cobicistat (Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen). Die Wirkungen von Airbufo Forspiro können gesteigert werden und Ihr Arzt möchte Sie möglicherweise sorgfältig überwachen.

Wenn eine der oben genannten Angaben auf Sie zutrifft, oder falls Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der Anwendung von Airbufo Forspiro mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker ebenfalls, bevor Sie sich einer Narkose wegen einer Operation oder einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

- Wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden, sprechen Sie vor der Anwendung von Airbufo Forspiro mit Ihrem Arzt – wenden Sie Airbufo Forspiro nur auf ausdrückliche Anweisung Ihres Arztes an.
- Wenn Sie während der Anwendung von Airbufo Forspiro schwanger werden, brechen Sie die Behandlung mit Airbufo Forspiro nicht ab, aber sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt.
- Wenn Sie stillen, sprechen Sie bitte vor der Anwendung von Airbufo Forspiro mit Ihrem Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Airbufo Forspiro hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit oder Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen.

Airbufo Forspiro enthält Lactose

Airbufo Forspiro enthält Lactose, eine Zuckerart. Bitte wenden Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Die in diesem Arzneimittel enthaltene Lactosemenge verursacht gewöhnlich keine Probleme bei Personen mit einer Lactoseunverträglichkeit.

Der sonstige Bestandteil Lactose enthält geringe Mengen Milchproteine, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

3. Wie ist Airbufo Forspiro anzuwenden?

- Wenden Sie Airbufo Forspiro immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Es ist wichtig, dass Sie Airbufo Forspiro jeden Tag anwenden, auch dann, wenn Sie zu dieser Zeit keine Asthma- oder COPD-Beschwerden haben.
- Wenn Sie Airbufo Forspiro zur Behandlung von Asthma anwenden, Ihr Arzt Ihre Symptome regelmäßig kontrollieren.

Wenn Sie bereits Corticosteroid-Tabletten zur Behandlung Ihres Asthmas oder Ihrer COPD einnehmen, kann Ihr Arzt die Anzahl der Tabletten, die Sie einnehmen, verringern, sobald Sie beginnen, Airbufo Forspiro anzuwenden. Wenn Sie schon lange Zeit Corticosteroid-Tabletten einnehmen, möchte Ihr Arzt möglicherweise, dass Sie sich von Zeit zu Zeit Bluttests unterziehen. Wenn Sie die Menge der Corticosteroid-Tabletten verringern, kann es sein, dass Sie sich allgemein unwohl fühlen, obwohl sich Ihre Beschwerden im Brustkorb vielleicht verbessern. Es können

Symptome wie eine verstopfte oder laufende Nase, Schwäche oder Gelenk- oder Muskelschmerzen sowie ein Ausschlag (Ekzem) auftreten. Wenn eines dieser Symptome Sie stört oder wenn Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit oder Erbrechen auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt. Es kann sein, dass Sie ein anderes Arzneimittel einnehmen müssen, wenn bei Ihnen Symptome einer Allergie oder einer Gelenkentzündung auftreten. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Airbufo Forspiro weiter anwenden sollen.

Ihr Arzt wird möglicherweise in Betracht ziehen, Ihnen in Stressphasen (beispielsweise bei einer Atemwegsinfektion oder vor einer Operation) zusätzlich zu Ihrer üblichen Therapie Corticosteroid-Tabletten zu verschreiben.

Wichtige Informationen über Ihre Asthma- oder COPD-Beschwerden

Wenn Sie während der Behandlung mit Airbufo Forspiro bemerken, dass Sie außer Atem sind oder pfeifend atmen, sollten Sie Airbufo Forspiro zunächst weiter anwenden, aber Ihren Arzt so schnell wie möglich aufsuchen, da Sie möglicherweise eine zusätzliche Behandlung benötigen.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn:

- Ihre Atmung sich verschlechtert oder Sie häufig nachts mit Asthma aufwachen
- sich bei Ihnen morgens ein Engegefühl im Brustkorb einstellt oder Ihr Engegefühl im Brustkorb länger als gewöhnlich anhält.

Diese Anzeichen könnten bedeuten, dass Ihr Asthma oder Ihre COPD nicht ausreichend unter Kontrolle ist und Sie sofort eine andere oder eine zusätzliche Behandlung benötigen.

Asthma

Für eine Asthmabehandlung kann Airbufo Forspiro auf zwei unterschiedliche Arten verordnet werden. Die anzuwendende Menge von Airbufo Forspiro und der Zeitpunkt der Anwendung hängen davon ab, wie es Ihnen verschrieben worden ist.

- a) Wenn Ihnen Airbufo Forspiro und ein separater Reliever-Inhalator verschrieben wurden, lesen Sie bitte Abschnitt „a) Anwendung von Airbufo Forspiro zusammen mit einem separaten Reliever-Inhalator“.
- b) Wenn Ihnen Airbufo Forspiro als einziger Inhalator verschrieben wurde, lesen Sie bitte Abschnitt „b) Anwendung von Airbufo Forspiro als einziger Asthma-Inhalator“.

a) Anwendung von Airbufo Forspiro zusammen mit einem separaten Reliever-Inhalator.

Wenden Sie Airbufo Forspiro jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern.

Erwachsene (ab 18 Jahren)

- Die übliche Dosis beträgt zweimal täglich 1 oder 2 Inhalationen.
- Ihr Arzt kann diese Dosis auf zweimal täglich 4 Inhalationen erhöhen.
- Wenn Ihre Symptome gut unter Kontrolle sind, kann Ihr Arzt Ihnen empfehlen, das Arzneimittel einmal täglich anzuwenden.

Jugendliche (12 bis 17 Jahre)

- Die übliche Dosis beträgt zweimal täglich 1 oder 2 Inhalationen.
- Wenn die Symptome gut unter Kontrolle sind, kann der Arzt empfehlen, das Arzneimittel einmal täglich anzuwenden.

Airbufo Forspiro wird nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren empfohlen.

Ihr Arzt (oder Ihre Asthmaberaterin) werden Ihnen helfen, Ihr Asthma zu behandeln. Sie werden die Dosierung dieses Arzneimittels auf die niedrigste Dosis einstellen, mit der eine Kontrolle Ihrer Asthmasymptome erreicht wird. Verändern Sie jedoch Ihre Dosis ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt (oder Ihrer Asthmaberaterin) nicht selbst.

Verwenden Sie Ihren separaten „Reliever-Inhalator“ zur Behandlung von Asthmasymptomen.

Tragen Sie Ihren „Reliever-Inhalator“ immer bei sich, damit Sie ihn anwenden können, wenn Sie ihn benötigen. Verwenden Sie bei Auftreten von Asthmasymptomen nicht Airbufo Forspiro – verwenden Sie Ihren Reliever-Inhalator.

b) Anwendung von Airbufo Forspiro als einziger Asthma-Inhalator.

Wenden Sie Airbufo Forspiro auf diese Weise nur dann an, wenn Ihr Arzt Ihnen dies verordnet hat und wenn Sie mindestens 12 Jahre alt sind.

Wenden Sie Ihren Airbufo Forspiro jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern. Sie können Airbufo Forspiro wie folgt anwenden:

- 1 Inhalation morgens und 1 Inhalation abends
oder
- 2 Inhalationen morgens
oder
- 2 Inhalationen abends.

Ihr Arzt kann diese Dosis auf zweimal täglich 2 Inhalationen erhöhen.

Wenden Sie Airbufo Forspiro auch als „Reliever-Inhalator“ zur Behandlung von Asthmasymptomen an, wenn sie auftreten.

- Wenn bei Ihnen Asthmasymptome auftreten, wenden Sie 1 Inhalation an und warten Sie einige Minuten.
- Wenn Sie sich nicht besser fühlen, inhalieren Sie ein weiteres Mal.
- Wenden Sie nicht mehr als 6 Inhalationen unmittelbar nacheinander an.

Tragen Sie Ihren Airbufo Forspiro immer bei sich, damit Sie es anwenden können, wenn Sie es benötigen.

Eine Tagesgesamtdosis von mehr als 8 Inhalationen ist normalerweise nicht erforderlich. Unter Umständen kann Ihr Arzt Ihnen jedoch erlauben, für einen begrenzten Zeitraum bis zu 12 Inhalationen pro Tag anzuwenden.

Wenn Sie regelmäßig 8 oder mehr Inhalationen pro Tag benötigen, vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Arzt oder Ihrer Asthmabewerterin. Sie müssen möglicherweise Ihre Behandlung ändern.

Wenden Sie nicht mehr als insgesamt 12 Inhalationen innerhalb von 24 Stunden an.

Wenn Sie Sport treiben und Asthmasymptome bekommen, wenden Sie Airbufo Forspiro wie hier beschrieben an. Wenden Sie Airbufo Forspiro jedoch nicht kurz vor dem Training an, um dem Auftreten von Asthmasymptomen vorzubeugen.

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

- Nur für die Anwendung bei Erwachsenen (ab 18 Jahren).
- Die übliche Dosis beträgt zweimal täglich 2 Inhalationen.

Zur Behandlung Ihrer COPD-Erkrankung wird Ihr Arzt Ihnen möglicherweise auch andere Arzneimittel zur Erweiterung der Atemwege, sogenannte Bronchodilatoren (wie Tiotropium- oder Ipratropiumbromid), verschreiben.


Hinweise für den Gebrauch

Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker sollten Ihnen zeigen, wie der Inhalator anzuwenden ist, und Ihre Anwendung regelmäßig kontrollieren.

Der Inhalator enthält 60 Dosen des Arzneimittels als Pulver in einem aufgerollten Folienstreifen. Er hat ein Dosis-Zählwerk, das Ihnen zeigt, wie viele Dosen übrig sind, indem eine Zahl von 60 bis 0


angezeigt wird. Wenn Sie die letzten 10 Dosen erreicht haben, erscheinen die Zahlen auf rotem Hintergrund.

Der Inhalator ist nicht wiederbefüllbar – entsorgen Sie ihn bitte, wenn er leer ist, und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.



Vor der Anwendung des Inhalators

- Öffnen Sie die transparente Klappe des Seitenfachs.
- Nehmen Sie den Folienstreifen aus dem Seitenfach, indem Sie ihn vorsichtig in voller Länge von den „Zähnen“ des Seitenfachs abziehen, wie es unten gezeigt ist. Sie dürfen **nicht** am Folienstreifen **ziehen oder reißen**.



- Schließen Sie die Klappe des Seitenfachs und entsorgen Sie den verbrauchten Folienstreifen.


Wichtig:

Wenn Sie den Inhalator benutzen, füllt sich das Seitenfach allmählich mit verbrauchtem Folienstreifen. Die Folienstreifen mit **schwarzen Balken enthalten kein Arzneimittel**. Anschließend erscheinen die nummerierten Abschnitte des Folienstreifens in dem Seitenfach. In dem Seitenfach dürfen sich **nie mehr als 2 Abschnitte des Folienstreifens befinden**, da dies zu einer Blockierung des Inhalators führen könnte. Reißen Sie den Folienstreifen wie oben gezeigt vorsichtig ab, und entsorgen Sie ihn sicher.

Anwendung des Inhalators


Halten Sie den Inhalator in Ihren Händen, wie es auf den Abbildungen zu sehen ist.

1. Öffnen




- **Öffnen Sie die Schutzkappe nach unten**, so dass das Mundstück sichtbar wird.
- Prüfen Sie das Dosis-Zählwerk, um zu sehen, wie viele Dosen noch übrig sind.

2. Die Anwendung vorbereiten




- Den Rand des **weißen Hebels nach oben klappen**. Achten Sie darauf, dass das Seitenfach geschlossen ist.

Hinweis: Betätigen Sie den weißen Hebel nur dann, wenn Sie bereit sind, eine Dosis des Arzneimittels zu inhalieren. Wenn Sie den weißen Hebel unnötig betätigen, werden Dosen verschwendet.



- **Öffnen:** Legen Sie den **weißen Hebel** so weit, wie es geht, **um, bis er mit einem klickenden Geräusch einrastet**. Hierdurch gelangt eine neue Dosis, deren Nummer an der Oberseite zu sehen ist, in die Position.



- **Schließen:** Bringen Sie dann den weißen Hebel wieder vollständig zurück, sodass er **mit einem klickenden Geräusch** in seiner ursprünglichen Position **einrastet**. Der Inhalator ist nun für die sofortige Anwendung bereit.

3. Inhalieren

- Halten Sie das Mundstück des Inhalators von Ihrem Mund entfernt und atmen Sie so weit aus, wie es Ihnen mühelos möglich ist. **Atmen Sie niemals direkt in den Inhalator aus**, da dies die Dosis beeinflussen kann.
- Halten Sie den Inhalator waagrecht und mit der **Schutzkappe nach unten**.
- Umschließen Sie das Mundstück fest mit den Lippen.
- **Atmen Sie** so **tief** und so **hart** wie möglich durch den Inhalator ein, nicht durch die Nase.



- Nehmen Sie den Inhalator aus dem Mund und **halten Sie 5–10 Sekunden lang den Atem an** oder so lange, wie es Ihnen ohne Anstrengung möglich ist.
- Atmen Sie danach langsam aus, **aber nicht in den Inhalator hinein**.
- Setzen Sie die Schutzkappe auf das Mundstück.
- Spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und spucken Sie es danach aus. Dies kann helfen, das Auftreten von Pilzinfektionen im Mund und Heiserkeit zu verhindern.

Reinigung

- Wischen Sie bei Bedarf das Mundstück außen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Versuchen Sie nicht, den Inhalator zum Reinigen oder aus anderen Gründen auseinanderzunehmen!
- Reinigen Sie die Teile des Inhalators nicht mit Wasser oder feuchten Tüchern, da Feuchtigkeit die Dosis beeinträchtigen kann!
- Stecken Sie niemals eine Nadel oder andere spitze Gegenstände in das Mundstück oder in andere Geräteteile, da dies den Inhalator beschädigen kann!

Wenn Sie eine größere Menge von Airbufo Forspiro angewendet haben, als Sie sollten

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Dosis so, wie es den Anwendungshinweisen des Apothekers angegeben ist, oder gemäß der Anweisung Ihres Arztes. Sie sollten Ihre verschriebene Dosis nicht überschreiten, ohne zuvor ärztlichen Rat einzuholen.

Die häufigsten Symptome, die auftreten können, wenn Sie eine größere Menge von Airbufo Forspiro angewendet haben, als Sie sollten, sind Zittern, Kopfschmerzen oder ein schneller oder unregelmäßiger Herzschlag.

Wenn Sie eine größere Menge von Airbufo Forspiro haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Airbufo Forspiro vergessen haben

- Wenn Sie die Inhalation einer Dosis vergessen haben, holen Sie diese nach, sobald Sie daran denken. Falls es jedoch fast Zeit für Ihre nächste Dosis ist, lassen Sie die vergessene Dosis aus.
- Wenden Sie **nicht** die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie Airbufo Forspiro nicht weiter an und sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt:

- Schwellungen im Gesicht, insbesondere in der Mundgegend (Zunge und/oder Rachen und/oder Schluckbeschwerden) oder Nesselsucht zusammen mit Atembeschwerden (Angioödem) und/oder ein plötzliches Gefühl, ohnmächtig zu werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine allergische Reaktion haben. Dies geschieht selten (kann bis zu 1 von 1000 Personen betreffen).
- Plötzlich auftretende, akute pfeifende Atmung oder Kurzatmigkeit unmittelbar nach der Anwendung des Inhalators. **Wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt, wenden Sie Airbufo Forspiro nicht weiter an und verwenden Sie Ihren „Reliever-Inhalator“.** **Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, da Ihre Behandlung gegebenenfalls umgestellt werden muss.** Dies geschieht sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Personen betreffen).

Weitere mögliche Nebenwirkungen:

Häufig (können bis zu 1 von 10 Personen betreffen)

- Palpitationen (Spüren des Herzschlags), leichtes oder starkes Zittern. Wenn diese Nebenwirkungen auftreten, sind sie in der Regel leicht und verschwinden gewöhnlich, wenn Sie die Behandlung mit Airbufo Forspiro fortsetzen.
- Soor (eine Pilzinfektion) im Mund. Dies kommt seltener vor, wenn Sie den Mund nach Anwendung von Airbufo Forspiro mit Wasser ausspülen.
- Leichte Halsschmerzen, Husten und eine heisere Stimme.
- Kopfschmerzen.
- Pneumonie (Lungenentzündung) bei COPD-Patienten.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie während der Anwendung von Airbufo Forspiro folgende Beschwerden bemerken – sie könnten Symptome einer Lungenentzündung sein:

- Fieber oder Schüttelfrost.

- Vermehrte Bildung von Schleim, Farbänderung des Schleims.
- Stärkerer Husten oder verstärkte Atembeschwerden.

Gelegentlich (können bis zu 1 von 100 Personen betreffen)

- Rastlosigkeit, Nervosität oder Unruhe.
- Schlafstörungen.
- Schwindelgefühl.
- Verschwommenes Sehen.
- Übelkeit.
- Schneller Herzschlag.
- Blaue Flecken an der Haut.
- Muskelkrämpfe.
- Aggressivität.
- Angst.

Selten (können bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen)

- Hautausschlag, Juckreiz.
- Bronchospasmen (Anspannung der Muskeln in den Atemwegen, die zu einer pfeifenden Atmung führt). Wenn das Pfeifen plötzlich nach Anwendung von Airbufo Forspiro einsetzt, wenden Sie Airbufo Forspiro nicht weiter an und sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Niedrige Kaliumspiegel im Blut.
- Unregelmäßiger Herzschlag.

Sehr selten (können bis zu 1 von 10.000 Personen betreffen)

- Depressionen.
- Verhaltensänderungen, insbesondere bei Kindern.
- Schmerzen oder Engegefühl im Brustkorb (Angina pectoris).
- Zunahme der Menge an Zucker (Glucose) im Blut.
- Geschmacksveränderungen, wie z. B. ein unangenehmer Geschmack im Mund.
- Veränderungen des Blutdrucks.
- Gewichtszunahme, mondförmiges Gesicht, Schwäche, Stammfettsucht (Cushing-Syndrom).

Corticosteroide zum Inhalieren können die normale Steroidhormonproduktion im Körper beeinflussen, insbesondere, wenn Sie hohe Dosen über längere Zeit anwenden. Zu diesen Wirkungen zählen:

- Veränderungen der Knochendichte (Dünnerwerden der Knochen)
- Katarakt (Trübung der Augenlinse)
- Glaukom (erhöhter Augeninnendruck)
- Verlangsamung der Wachstumsrate bei Kindern und Jugendlichen
- Beeinflussung der Nebennieren (kleine Drüsen an den Nieren)
- Vorübergehende Symptome eines Cushing-Syndroms
- Eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen und eine Beeinträchtigung der Fähigkeit, sich an Belastungen anzupassen, können ebenfalls auftreten.

Diese Nebenwirkungen treten bei Corticosteroiden zum Inhalieren weitaus seltener als bei Corticosteroid-Tabletten auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, www.afmps.be, Abteilung Vigilanz: Website: www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Airbufo Forspiro aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton oder dem Etikett des Inhalators nach EXP bzw. EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Airbufo Forspiro enthält

- Die Wirkstoffe sind: Budesonid und Formoterolfumarat-Dihydrat. Jede inhalierte Dosis enthält 160 Mikrogramm Budesonid und 4,5 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat; dies entspricht einer abgemessenen Dosis (einzeldosierte Dosis, die in dem Blisterstreifen enthalten ist) von 194,7 Mikrogramm Budesonid und 6,1 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat.
- Der sonstige Bestandteil ist: Lactose-Monohydrat (enthält Milchproteine).

Wie Airbufo Forspiro aussieht und Inhalt der Packung

Airbufo Forspiro ist ein rot-weißer Kunststoff-Inhalator, der das Arzneimittel enthält. In jedem Inhalator befindet sich ein OPA/Al/PVC-Al-Blisterstreifen mit 60 Dosen des Pulvers zur Inhalation (einzeldosiert). Das Pulver zur Inhalation ist weiß bis gebrochen weiß oder leicht gelblich und nicht verfestigt.

Airbufo Forspiro ist in Packungen mit 1, 2 oder 6 Inhalatoren zu je 60 Dosen erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Sandoz nv/sa, Hermeslaan 1H, 1831 Machelen

Hersteller

AEROPHARM GmbH, François-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Deutschland

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slowenien

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Deutschland

Zulassungsnummer

BE532817

Art der Abgabe

Verschreibungspflichtig

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

BE	Airbufo Forspiro 160 Mikrogramme/4,5 Mikrogramme/Inhalation, einzeldosiert Pulver zur Inhalation
DK	Airbufo Forspiro 160 mikrogram/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt
ES	Budesonida/Formoterol Cipla 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación, polvo para inhalación (unidosis)
FI	AEROCOMP Forspiro160 mikrog/4,5 mikrog/annos, inhalaatiojauhe, annosteltu
FR	BUDESONIDE/FORMOTEROL FORSPIRO SANDOZ 160 microgrammes/4,5 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose
IE	AirBuFo Forspiro 160 microgram/4.5 microgram/dose inhalation powder, pre-dispensed
IT	Budesonide e Formoterolo Sandoz
MT	AirBuFo Forspiro 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, inhalation powder, pre-dispensed
NO	Airbufo Forspiro 160 mikrog/dose/4,5 mikrog/dose inhalasjonspulver, dosedispensert
PT	Airbufol Forspiro
SE	Airbufo Forspiro 160 mikrog/4,5 mikrog/dos, inhalationspulver, avdelad dos

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 08/2025.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 01/2026.