

Notice : information de l'utilisateur

Mifegyne 200 mg comprimés mifépristone

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Mifegyne et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mifegyne
3. Comment prendre Mifegyne
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Mifegyne
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Mifegyne et dans quel cas est-il utilisé

Les comprimés de Mifegyne contiennent de la mifépristone, une anti-hormone qui bloque l'action de la progestérone, une hormone nécessaire au maintien de la grossesse. Mifegyne peut donc provoquer une interruption de grossesse. Mifegyne est également utilisé pour ramollir et dilater l'orifice extérieur de l'utérus (col utérin).

Mifegyne est préconisé dans les indications suivantes :

- 1) Comme méthode d'interruption médicamenteuse de grossesse intra-utérine évolutive:
 - au plus tard jusqu'au 63^{ème} jour de vos dernières règles,
 - en association à un autre médicament appelé prostaglandine (substance qui augmente les contractions de l'utérus et ramollit le col utérin), administrée 36 à 48 heures après la prise de Mifegyne.
- 2) Dans la préparation du col de l'utérus à l'interruption de grossesse du premier trimestre par aspiration.
- 3) En préparation à l'action des prostaglandines lors des interruptions de grossesse pour raisons médicales au-delà du 1^{er} trimestre.
- 4) Pour induire le travail lors des grossesses interrompues (mort du fœtus dans l'utérus), et lorsque l'administration de prostaglandine ou d'ocytocine n'est pas possible.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mifegyne

Ne prenez jamais Mifegyne

- **D'une façon générale, si vous souffrez**
 - d'une allergie à la mifépristone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,
 - d'une insuffisance de fonctionnement des glandes surrénales,
 - d'asthme sévère, non équilibré par le traitement,
 - de porphyrie héréditaire (une certaine anomalie de l'enzyme).

- **Autres**

Dans l'interruption de grossesse au plus tard de 63^e jour d'aménorrhée

- si la grossesse n'a pas été confirmée par un examen biologique ou par une échographie,
- si le premier jour de vos dernières règles remonte à plus de 63 jours,
- si votre médecin soupçonne une grossesse extra-utérine (l'œuf est implanté dans la trompe et non à l'intérieur de l'utérus),
- si vous ne pouvez pas prendre l'analogue de prostaglandine utilisé.

Dans le ramollissement et la dilatation du col utérin en préparation à l'interruption chirurgicale de grossesse

- si la grossesse n'a pas été confirmée par un examen biologique ou une échographie,
- si votre médecin soupçonne une grossesse extra-utérine,
- si le premier jour des dernières règles remonte à 84 jours et au-delà.

Dans l'interruption de grossesse au-delà du 1^{er} trimestre

- si vous ne pouvez pas prendre l'analogue de prostaglandine utilisé.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Mifegyne:

- si vous souffrez d'une maladie hépatique ou rénale,
- en cas d'anémie ou de malnutrition,
- si vous avez des problèmes cardiovasculaires (maladie cardiaque ou circulatoire),
- si vous présentez des facteurs de risque élevé de maladie cardiovasculaire. Parmi les facteurs de risque figurent un âge supérieur à 35 ans, le tabagisme, une tension artérielle élevée, des taux élevés de cholestérol sanguin ou du diabète,
- si vous souffrez d'une maladie susceptible d'affecter la coagulation sanguine,
- si vous souffrez d'asthme.

Si vous utilisez un stérilet, le dispositif doit être retiré avant l'administration de Mifegyne.

Avant de prendre Mifegyne, votre sang sera analysé pour déterminer le facteur Rhésus. Si votre Rhésus est négatif, votre médecin vous informera du traitement normalement requis.

De graves réactions cutanées, y compris des cas de nécrolyse épidermique toxique et de pustulose exanthématique aiguë généralisée, ont été rapportés en association avec un traitement par Mifegyne. Cessez de prendre Mifegyne et consultez immédiatement un médecin si vous constatez l'un des symptômes décrits dans la rubrique 4. Si vous présentez une réaction cutanée grave, vous ne devez plus reprendre de mifépristone à l'avenir.

Autres médicaments et Mifegyne

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même ceux obtenus sans ordonnance.

En particulier, indiquez à votre médecin si vous prenez l'un des produits suivants :

- corticostéroïdes (utilisés dans le traitement de l'asthme ou autres traitements anti-inflammatoires),
- kétoconazole, itraconazole (utilisés en traitement antifongique),
- érythromycine, rifampicine (antibiotiques),
- millepertuis (remède naturel utilisé dans le traitement de la dépression légère),
- phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine (utilisés dans le traitement des crises d'épilepsie),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme l'acide acétylsalicylique ou le diclofénac.

Mifegyne avec des aliments et boissons

Ne pas prendre de jus de pamplemousse lors du traitement par Mifegyne.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

L'échec de l'interruption de grossesse (grossesse évolutive) suite à la prise de Mifegyne, seule ou associée à une prostaglandine, a été associé à des malformations congénitales (à la naissance).

Le risque d'échec de ce médicament augmente :

- si la prostaglandine n'est pas administrée conformément à la prescription (voir rubrique 3),
- avec la durée de la grossesse,
- avec le nombre de grossesses que vous avez déjà eues.

En cas d'échec de l'interruption de grossesse après la prise de ce(s) médicament(s), le risque encouru par le fœtus est inconnu. Si vous décidez de poursuivre la grossesse, un suivi prénatal attentif et des échographies répétées, avec une attention particulière portée aux extrémités, devront avoir lieu dans un centre spécialisé. Votre médecin vous fournira d'autres informations à ce sujet.

Si vous décidez de continuer l'interruption de grossesse, une autre méthode sera réalisée. Votre médecin vous indiquera les options dont vous disposez.

Allaitement

Si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament. Vous ne devez pas allaiter quand vous prenez Mifegyne, car ce médicament passe dans le lait maternel.

Fertilité

Ce médicament n'a pas d'effet sur la fécondité. Vous pouvez débiter une nouvelle grossesse dès que votre grossesse a été interrompue. Une méthode de contraception devra immédiatement être initiée après la confirmation de l'interruption de grossesse par votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des vertiges peuvent survenir à conséquence de l'avortement. En l'absence de connaissance des effets que Mifegyne peut vous occasionner, vous devez faire particulièrement attention quand vous conduisez des véhicules ou utilisez des machines après avoir pris ce médicament.

3. Comment prendre Mifegyne

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

1) Interruption médicamenteuse de grossesse intra-utérine évolutive :

Interruption de grossesse jusqu'au 49^e jour après vos dernières règles

Posologie chez l'adulte

- 3 comprimés à prendre par voie orale

Administration du comprimé

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau en présence d'un médecin ou d'un membre de l'équipe médicale.
- Prenez l'analogue de prostaglandine 36 à 48 heures après Mifegyne. La prostaglandine est donnée soit en comprimés qui doivent être avalés avec de l'eau (misoprostol 400 microgrammes) soit comme un ovule vaginal (géméprost 1 mg).
- Si vous vomissez moins de 45 minutes après avoir pris les comprimés de mifépristone, prévenez immédiatement votre médecin. Vous aurez besoin de prendre les comprimés de nouveau.

Interruption de grossesse entre 50 et 63 jours après vos dernières règles

Posologie chez l'adulte

- 3 comprimés à prendre par voie orale

Administration du comprimé

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau en présence d'un médecin ou d'un membre de l'équipe médicale.
- Prenez l'analogue de prostaglandine 36 à 48 heures après Mifegyne. La prostaglandine est un ovule vaginal (géméprost 1 mg).
- Si vous vomissez moins de 45 minutes après avoir pris les comprimés de mifépristone, prévenez immédiatement votre médecin. Vous aurez besoin de prendre les comprimés de nouveau.

Cette méthode implique votre participation active ; vous devez donc savoir que :

- Vous devez prendre le deuxième médicament (prostaglandine) pour assurer l'efficacité du traitement.
- Vous devrez vous soumettre à une consultation de contrôle (3^e consultation) 14 à 21 jours après la prise de Mifegyne afin de vérifier si l'expulsion a été complète et de contrôler votre état de santé.

L'interruption de grossesse se déroulera comme suit :

- 1) Au centre prescripteur, vous recevrez Mifegyne, qui doit être pris par voie orale.
- 2) 36 à 48 heures après, l'analogue de prostaglandine sera administré. Vous devriez rester au repos pendant 3 heures après avoir pris l'analogue de prostaglandine.
- 3) L'embryon peut être expulsé en quelques heures après la prise de l'analogue de prostaglandine, ou au cours des quelques jours suivants. Vous aurez des saignements vaginaux qui dureront en moyenne 12 jours après la prise de Mifegyne; le saignement deviendra progressivement moins important.
- 4) Vous devez retourner au centre 14 - 21 jours après avoir pris Mifegyne, pour une consultation de contrôle afin de vérifier qu'une expulsion complète a eu lieu.

Contactez immédiatement votre centre prescripteur :

- **si vous avez des saignements vaginaux durant plus de 12 jours et/ou très abondants (par exemple si vous avez besoin de plus de 2 serviettes hygiéniques par heure pendant 2 heures)** ;
- **si vous souffrez de douleurs abdominales sévères ;**
- **si vous avez de la fièvre, ou si vous avez froid et frissonnez.**

Autres points importants à prendre en compte :

- Les saignements vaginaux ne signifient pas que l'expulsion a eu lieu.

Les saignements utérins commencent généralement 1 à 2 jours après la prise de Mifegyne.

Dans de rares cas, une expulsion peut se produire avant la prise de prostaglandine. Une vérification de l'évacuation complète s'impose et vous devez donc retourner au centre pour cela.

Si votre grossesse n'est pas interrompue ou en cas d'expulsion incomplète, votre médecin vous indiquera les options dont vous disposez pour interrompre la grossesse.

Il est conseillé de ne pas vous éloigner du centre prescripteur tant que la consultation de contrôle n'a pas eu lieu.

En cas d'urgence ou si vous avez des questions, téléphonez à votre centre prescripteur ou rendez-vous au centre. Vous n'avez pas besoin dans ce cas d'attendre votre rendez-vous pour la consultation de contrôle.

2) Dans le ramollissement et la dilatation du col utérin en préparation à l'interruption de grossesse du premier trimestre par aspiration :

Posologie chez l'adulte

- 1 comprimé à prendre par voie orale

Administration du comprimé

- Avalez le comprimé entier avec un verre d'eau
- Si vous vomissez moins de 45 minutes après avoir pris le comprimé de mifépristone, prévenez immédiatement votre médecin. Vous aurez besoin de prendre un autre comprimé.

L'interruption de grossesse se déroulera comme suit :

- 1) Au centre prescripteur, vous recevrez Mifegyne, qui doit être pris par voie orale.
- 2) 36 à 48 heures après, vous devrez vous rendre à nouveau au centre prescripteur pour l'intervention chirurgicale.

Votre médecin vous expliquera ce qui va se passer. Des saignements peuvent survenir après la prise de Mifegyne, avant l'aspiration.

Dans de rares cas, l'expulsion peut également avoir lieu avant l'aspiration. Il est important de confirmer qu'une expulsion complète a eu lieu.

Vous devez donc retourner au centre indiqué pour l'intervention.

En cas d'urgence ou si vous avez des questions, téléphonez à votre centre prescripteur ou rendez-vous au centre. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre rendez-vous pour la consultation de contrôle.

3) En cas d'interruption thérapeutique de grossesse au-delà du premier trimestre :

Posologie chez l'adulte

- 3 comprimés à prendre par voie orale

Administration du comprimé

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau
- 36 à 48 heures après, prenez l'analogue de prostaglandine dont l'administration sera éventuellement répétée plusieurs fois à intervalles réguliers jusqu'à ce que l'expulsion soit complète.
- Si vous vomissez moins de 45 minutes après avoir pris les comprimés de mifépristone, prévenez immédiatement votre médecin. Vous aurez besoin de prendre les comprimés de nouveau.

4) En cas d'induction du travail lors des grossesses interrompues (mort du fœtus dans l'utérus) :

Posologie chez l'adulte

- 3 comprimés à prendre par voie orale pendant deux jours

Administration du comprimé

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau
- Si vous vomissez moins de 45 minutes après avoir pris les comprimés de mifépristone, prévenez immédiatement votre médecin. Vous aurez besoin de prendre les comprimés de nouveau.

Utilisation chez les adolescentes

Les données sur l'utilisation de Mifegyne chez les adolescentes sont limitées.

Si vous avez pris plus de Mifegyne que vous n'auriez dû

Si vous prenez trop de comprimés, contactez immédiatement votre médecin ou le centre Antipoison (070/245 245) ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Le médecin vous remettra la quantité exacte de Mifegyne dont vous avez besoin ; il est donc peu probable que vous preniez trop de comprimés. La prise d'un nombre excessif de comprimés peut causer des symptômes d'insuffisance surrénale. Toute notion d'intoxication aiguë impose donc un traitement approprié avec notamment l'administration de dexaméthasone.

Si vous oubliez de prendre Mifegyne

Si vous oubliez de prendre un médicament, l'interruption de grossesse ne sera probablement pas complète. Demandez conseil à votre médecin si vous avez oublié de prendre Mifegyne ou un autre médicament prescrit.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables graves :

- Réaction allergique. Éruptions cutanées, gonflement localisé du visage et/ou du larynx pouvant s'accompagner d'urticaire.
- Taches rougeâtres sur le tronc, se présentant comme des macules en forme de cible ou des taches circulaires, souvent avec une vésicule centrale, desquamation de la peau, ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et des yeux. Ces graves éruptions cutanées peuvent être précédées de fièvre et de symptômes grippaux (nécrolyse épidermique toxique, fréquence : rare).
- Éruption cutanée généralisée rouge et squameuse avec des bosses sous la peau et des vésicules s'accompagnant de fièvre. Les symptômes apparaissent généralement dès l'instauration du traitement (pustulose exanthématique aiguë généralisée, fréquence : indéterminée).

Autres effets indésirables graves :

- Cas graves ou fatals de choc toxique ou septique. Fièvre avec douleurs musculaires, fréquence cardiaque rapide, étourdissements, diarrhées, vomissements, ou sensation de faiblesse. Cet effet indésirable peut survenir si vous ne prenez pas le deuxième médicament (comprimé de misoprostol) par voie orale.

Si vous ressentez un de ces effets indésirables, quel qu'il soit, contactez IMMÉDIATEMENT votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Autres effets indésirables

Très fréquents (peuvent toucher plus de 1 personne sur 10) :

- contractions utérines ou crampes
- diarrhées
- envie de vomir (nausées) ou vomissements.

Fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10) :

- saignements abondants
- crampes gastro-intestinales, légères à modérées
- infection de l'utérus (endométrite et maladie inflammatoire pelvienne).

Peu fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100) :

- chute de tension artérielle.

Rares (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

- fièvre

- maux de tête
- sensation générale de mal-être ou de fatigue
- symptômes vagues (bouffées de chaleur, vertiges, frissons)
- urticaire et troubles cutanés pouvant être graves
- rupture utérine après la prise de prostaglandines lors du deuxième ou troisième trimestre de grossesse, notamment chez des femmes multipares ou ayant subi une césarienne.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance :

Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail : adr@fagg-afmps.be

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

ou

Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Mifegyne

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température. A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne prenez pas ce médicament si vous remarquez que la boîte ou les plaquettes sont endommagées.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Mifegyne

La substance active est la mifépristone.

Un comprimé de Mifegyne contient 200 mg de mifépristone.

Les autres composants sont : silice colloïdale anhydre, amidon de maïs, povidone, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline.

Aspect de Mifegyne et contenu de l'emballage extérieur.

Mifegyne se présente sous la forme d'un comprimé biconvexe jaune, ayant un diamètre de 11 mm et portant la marque « 167 B » sur une face.

Mifegyne est disponible en boîtes de 1, 3 x 1, 15 x 1 ou 30 x 1 comprimés en plaquette pour délivrance à l'unité (PVC/aluminium).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

EXELGYN

216 boulevard Saint-Germain

75007 Paris

France

Fabricant

Laboratoires MACORS

22 rue des Caillottes

89000 Auxerre

France

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE207487

LU : 2000110052

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous le nom suivant :

Mifegyne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2025.