

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Veinofytol magensaftresistente Tabletten

Rosskastaniensamen-Trockenextrakt
eingestellt auf 21 mg Triterpenglykoside, berechnet als Protoaescigenin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder wenn Veinofytol länger als 8 Wochen benötigt wird.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Veinofytol magensaftresistente Tabletten beachten?
3. Wie ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten und wofür wird es angewendet?

Veinofytol ist ein pflanzliches Arzneimittel, die Rosskastaniensamen-Trockenextrakt enthält.

Veinofytol wird bei Erwachsenen zur Behandlung einer chronischen venösen Unzulänglichkeit verwendet, die sich durch geschwollene Beine, Krampfadern, Schweregefühl, Schmerzen, Ermüdung, Juckreiz, Spannungsgefühle und Wadenkrämpfe äußert.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Veinofytol magensaftresistente Tabletten beachten?

Veinofytol darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Veinofytol einnehmen.

- Bei einer Hautentzündung, einer Venenentzündung, einer subkutanen Verhärtung, stechenden Schmerzen, Ulzera, plötzlichem Anschwellen eines oder beider Beine, einer Herzunzulänglichkeit oder einer renalen Unzulänglichkeit ist ein Arzt hinzuzuziehen.

Wenn sich die Symptome verschlechtern oder Anzeichen von Hautinfektionen während der Anwendung des Arzneimittels auftreten, sollte sie ein Arzt oder Apotheker konsultieren.

Die Einnahme von Veinofytol ersetzt keine anderen präventiven Behandlungsmaßnahmen, wie z.B. kalte Wasserduschen oder das Tragen von Kompressionsstrümpfen, falls von einem Arzt verschrieben.

Sie müssen mit einem Arzt sprechen, wenn Veinofytol für mehr als 8 Wochen zur Behandlung von chronischer Venenkrankheit benötigt wird.

Kinder und Jugendliche

Bei Kindern unter 12 Jahren gibt es keine relevante Indikation.

Die Anwendung bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird nicht empfohlen, da keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vorliegen.

Einnahme von Veinofytol zusammen mit anderen Arzneimitteln

Keine berichtet. Studien über Wechselwirkungen wurden nicht durchgeführt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Veinofytol zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Keine Angabe.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fertilität

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

Da für Veinofytol keine ausreichenden Daten über die Anwendung von Roskastaniensamen-Trockenextrakt in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in diesem Zeitraum nicht empfohlen. Es liegen keine Daten über den Einfluss auf die Fruchtbarkeit vor.

Patienten mit eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion:

Es liegen keine Daten für eine Dosieranleitung im Falle einer beeinträchtigten Leber- und/oder Nierenfunktion vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Veinofytol enthält den Azofarbstoff Allurarot AC (E129)

Dieses Medikament enthält den Azofarbstoff Allurarot AC (E129), der allergische Reaktionen auslösen kann.

Veinofytol enthält NatriumDieses

Medikament enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, das heißt, es ist im Wesentlichen 'natriumfrei'.

3. Wie ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Für Erwachsene

Die empfohlene Dosis für Erwachsene beträgt zweimal täglich 1 Tablette.

Die Tabletten sind unzerkaut mit einem Glas Wasser einzunehmen.

Eine Besserung zeigt sich erst nach einer wenigstens 4-wöchigen Behandlung.
Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 8 Wochen nicht gebessert haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bei einer längeren Anwendung muss in regelmäßigen Abständen ein Arzt konsultiert werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Veinofytol eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Veinofytol haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigifzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von Veinofytol vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind einige Fälle von Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen, Juckreiz und allergischen Reaktionen dokumentiert. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg :

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Veinofytol magensaftresistente Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach « EXP » angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Veinofytol enthält

Der Wirkstoff ist Rosskastaniensamen-Trockenextrakt.

Jede Tablette enthält 192 mg - 258 mg Trockenextrakt aus *Aesculus hippocastanum* L., semen (Rosskastaniensamen), eingestellt auf 21 mg Triterpenglykoside, berechnet als Protoaescigenin .
Auszugsmittel: Ethanol 50% V/V.

Die sonstigen Bestandteile sind:

- Tablettenkern: Maltodextrin, Mikrokristalline Cellulose, Calciumhydrogenphosphat, vorverkleisterte Stärke, Talkum, wasserfreie kolloidale Siliciumdioxid, Magnesiumstearat.
- Tablettenüberzug: Methacrylsäure-Copolymer, Talkum, Triethylcitrat, Titandioxid (E171), Allurarot AC (E129), wasserfreie kolloidale Siliciumdioxid, Natriumhydrogencarbonat, Natriumlaurylsulfat.
- Hilfsstoffen des Extrakts: Maltodextrin, wasserfreie kolloidale Siliciumdioxid.

Wie Veinofytol aussieht und Inhalt der Packung

Veinofytol magensaftresistente Tabletten sind rot, länglich und biconvex von 18 x 8 mm.
Sie sind in Blisterpackungen in Umkartons mit 42 oder 98 Tabletten oder in Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen in Umkartons mit 100 x 1 Tabletten enthalten, erhältlich.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Zulassungsnummer

BE545342 (Belgien)

xxxxxxx (Luxemburg)

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien, Luxemburg, Portugal, Zypern, Griechenland, Malta, Spanien, Kroatien, Deutschland:

Veinofytol

Polen: Veinofytil

Frankreich: Veinodril

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 09/2024.