

Notice : information de l'utilisateur

Testarzon 20 mg/g gel transdermique testostérone

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Testarzon et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Testarzon
3. Comment utiliser Testarzon
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Testarzon
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Testarzon et dans quel cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce que Testarzon ?

Testarzon est un gel transparent contenant de la testostérone, une hormone masculine produite naturellement par le corps.

Testarzon est utilisé pour remplacer la testostérone chez les hommes adultes qui ne produisent pas assez de la testostérone naturelle, ce qui est appelé hypogonadisme. Le médicament vous aide à augmenter votre taux de testostérone en le ramenant à des valeurs normales.

Quelle est la fonction de la testostérone ?

La testostérone est produite naturellement dans le corps par les testicules.

- Elle aide la production de sperme et le développement et le maintien des caractères masculins tels que la voix basse et la pilosité au niveau du corps.
- Elle est nécessaire à un fonctionnement sexuel normal, ainsi qu'à l'excitation sexuelle.
- Elle aide également à maintenir la masse et la puissance musculaires.

Dans quel cas Testarzon est-il utilisé ?

Testarzon est utilisé chez les hommes pour remplacer la testostérone afin de traiter différents problèmes de santé dus au manque de testostérone (hypogonadisme masculin). Ce manque doit être confirmé par deux mesures séparées du taux sanguin de testostérone, ainsi que par la présence de signes et de symptômes cliniques tels que :

- impuissance
- infertilité
- diminution de la libido
- fatigue
- humeur dépressive
- perte osseuse, due aux faibles taux d'hormones

- perte partielle de caractères sexuels secondaires tels que le changement de votre voix ou le changement de la distribution des graisses
- et perte partielle de la pilosité au niveau du visage et du corps.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Testarzon ?

Qui peut utiliser Testarzon ?

- L'utilisation de Testarzon est réservée uniquement aux hommes.
- Testarzon ne doit pas être utilisé par les jeunes hommes de moins de 18 ans.
- Testarzon ne doit pas être utilisé par les femmes, quel que soit leur âge.
- Les femmes (en particulier les femmes enceintes ou allaitantes) ou les enfants doivent éviter tout contact avec le gel Testarzon ou les zones de la peau où Testarzon a été appliqué.

N'utilisez jamais Testarzon :

- si vous êtes allergique à la testostérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous présentez un cancer de la prostate ou une suspicion de cancer de la prostate.
- si vous présentez un cancer du sein (une affection rare chez les hommes) ou une suspicion de cancer du sein.

Avertissements et précautions

Le traitement par testostérone peut accélérer l'évolution d'un cancer de la prostate préexistant. Votre médecin vous fera passer les tests nécessaires avant que vous ne puissiez utiliser Testarzon, et assurera une surveillance de suivi au moyen de tests sanguins et d'examens de la prostate périodiques.

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser Testarzon, si vous présentez ou avez déjà présenté un des cas suivants :

- Vous avez des difficultés à la miction (uriner) suite à une élargissement de la glande prostatique.
- Vous souffrez d'un cancer des os. Votre médecin contrôlera votre taux de calcium.
- Vous avez une pression artérielle augmentée ou vous êtes traité pour une pression artérielle augmentée car Testarzon peut entraîner une augmentation de la pression artérielle.
- Vous souffrez d'une maladie sévère du cœur, du foie ou des reins car le traitement par Testarzon peut entraîner des complications sévères se manifestant par une rétention de liquide dans le corps, parfois accompagnée d'une insuffisance cardiaque (congestive) (surcharge liquidienne au cœur).
- Vous souffrez d'une cardiopathie ischémique (qui affecte l'apport de sang au cœur).
- Des problèmes de coagulation sanguine :
 - ☐ une thrombophilie (une anomalie de la coagulation du sang qui augmente le risque de thrombose (formation de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins)).
 - ☐ des facteurs qui augmentent le risque de formation de caillots sanguins dans une veine : antécédents de caillots sanguins dans une veine, tabagisme, obésité, cancer, immobilisation, si un membre de votre famille proche a eu un caillot sanguin dans une jambe, un poumon ou un autre organe à un âge jeune (par exemple, avant environ 50 ans), ou à mesure que votre âge augmente.
 - ☐ Comment reconnaître un caillot sanguin : gonflement douloureux d'une jambe ou changement soudain de la couleur de la peau qui par exemple devient pâle, rouge ou bleue, essoufflement soudain, toux soudaine et inexplicable pouvant faire cracher du sang ou douleur soudaine dans la poitrine, sensation d'étourdissement importante ou vertige, douleur intense à l'estomac, perte de vision brutale. Consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un de ces symptômes.
- Vous souffrez d'épilepsie.
- Vous souffrez de migraine.

- Vous présentez des troubles respiratoires pendant le sommeil. Il est plus probable que vous en ayez si vous êtes en surpoids ou si vous avez des problèmes pulmonaires prolongés.

Si l'une des situations décrites ci-dessus vous concerne (ou en cas de doute), adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Testarzon. L'utilisation de ce médicament peut aggraver ces affections.

En cas de réaction cutanée au site d'application de Testarzon, consultez votre médecin. Il peut être nécessaire d'arrêter le traitement par Testarzon.

Les contrôles sanguins suivants doivent être effectués par votre médecin avant et/ou pendant le traitement : taux sanguin de testostérone, numération formule sanguine.

Au moment de et juste après l'application quotidienne de Testarzon, n'appliquez pas de produits hydratants ni de produits solaires sur le site d'application du gel.

Comment éviter un transfert de Testarzon à une autre personne ?

Un transfert de Testarzon à d'autres personnes peut se produire par un contact cutané étroit. Cela peut faire augmenter le taux de testostérone dans leur corps, ce qui peut être dangereux. Une telle augmentation peut se produire après un seul contact, mais elle peut aussi être progressive à la suite de contacts courts répétés au fil du temps.

- Cela est particulièrement important pour les femmes et les enfants qui ont en principe un faible taux de testostérone dans leur corps.
- Les femmes enceintes ne doivent pas entrer en contact avec Testarzon. Si votre partenaire est enceinte, soyez vigilant et protégez-la de tout contact avec le médicament et le site d'application.

Pour éviter un transfert du gel de votre peau à une autre personne, vous devez :

- utiliser l'applicateur au lieu des doigts pour appliquer le médicament.
- vous laver les mains à l'eau et au savon immédiatement si Testarzon est entré en contact avec vos mains.
- recouvrir le site d'application du gel avec un vêtement dès que le gel a séché.
- prendre un bain ou une douche, ou porter des vêtements pour recouvrir le site d'application (par exemple, un T-shirt) avant tout contact cutané étroit avec une autre personne.

Afin d'améliorer la sécurité de votre partenaire, il vous est conseillé de laver le site d'application au savon, par exemple en prenant une douche, avant d'avoir des rapports sexuels ou, si cela n'est pas possible, de porter un T-shirt qui recouvre le site d'application au moment du contact.

Si une autre personne a été exposée à Testarzon

Si une autre personne touche le gel ou si sa peau entre en contact avec le site d'application du gel, il/elle doit laver la zone de contact concernée au savon et à l'eau dès que possible. Plus le gel reste sur la peau avant de la laver, plus la personne risque d'absorber la testostérone.

Si un transfert de Testarzon à une autre personne s'est produit, soyez attentif à tout changement dans le corps ou le comportement des personnes qui vous entourent. Si l'une d'entre elles présente l'un des signes suivants, il/elle devrait consulter son médecin :

- acné
- mue de la voix
- augmentation de la pilosité au niveau du visage ou du corps
- modification du cycle menstruel
- puberté précoce, agrandissement génital ou changement du niveau du comportement sexuel des enfants

Autres médicaments et Testarzon

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance ou un médicament à base de plantes. Testarzon est susceptible d'influencer l'action de ces médicaments et vos doses pourront devoir être adaptées.

Informez votre médecin ou pharmacien que vous prenez, notamment :

- médicaments visant à fluidifier le sang (anticoagulants) : l'action de ces médicaments peut être renforcée par Testarzon.
- corticostéroïdes ou autres médicaments susceptibles d'augmenter la production de ces hormones : les corticostéroïdes ainsi que Testarzon peuvent causer une rétention de liquide dans le corps.
- insuline dans le cadre du contrôle du taux sanguin de glucose (en cas de diabète) : votre dose d'insuline pourra devoir être diminuée si vous suivez un traitement par Testarzon.

Si l'une des situations décrites ci-dessus vous concerne (ou en cas de doute), adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Testarzon.

Grossesse, allaitement et fertilité

Testarzon n'est pas destiné à être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes.

Si votre partenaire est enceinte ou tombe enceinte, vous **devez** suivre les conseils mentionnés dans la rubrique "**Comment éviter un transfert de Testarzon à une autre personne ?**".

Les femmes enceintes doivent éviter **tout** contact cutané avec les sites d'application de Testarzon chez des hommes. Ce médicament peut causer des dommages au fœtus. En cas de contact, la zone de contact doit être lavée au savon et à l'eau dès que possible.

Les femmes allaitantes doivent éviter **tout** contact cutané avec les sites d'application de Testarzon chez des hommes.

Testarzon peut supprimer la production de sperme de façon réversible.

Testarzon contient du propylène glycol

Ce médicament contient du propylène glycol, ce qui peut causer une irritation cutanée.

TESTAVAN 20 mg/g, gel transdermique contient de l'éthanol

Ce médicament contient 538.70 mg d'alcool (éthanol), dans chaque dose de 1.15 g, ce qui équivaut à 468.40 mg/g (46.84 % v/v). Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur la peau endommagée.

3. Comment utiliser Testarzon ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Quelle dose utiliser

- La dose initiale recommandée de Testarzon est de 23 mg de testostérone (enfoncer la pompe une fois) appliquée une fois par jour, environ au même moment de la journée, de préférence le matin. Certains patients peuvent avoir besoin d'une plus grande dose.
- La dose maximale recommandée est de 69 mg de testostérone par jour (enfoncer la pompe trois fois).

La dose correcte de Testarzon dont vous avez besoin sera déterminée par votre médecin. Pour ce faire, il/elle mesurera régulièrement deux aspects :

- le taux sanguin de testostérone
- le degré d'efficacité du médicament sur vous.

Informez votre médecin si vous sentez que les effets du médicament sont trop forts ou trop faibles.

Utilisation de Testarzon

Il est important que vous preniez connaissance des instructions pour une utilisation correcte de Testarzon et que vous les appliquiez.

Appliquez Testarzon sur votre peau en utilisant l'applicateur. Il s'agit d'une utilisation transdermique. Le médicament pénètre dans le corps par la peau.

Appliquez le médicament uniquement sur une zone propre, sèche et normalement saine de la peau des épaules et de la partie supérieure des bras.

N'appliquez jamais Testarzon sur :

- le pénis et les testicules
- une peau blessée ou abîmée
- des ulcères ouverts, des lésions ou des irritations cutanées.

Accessoires nécessaires

- Kit de pompe à gel Testarzon. **Voir figure A.**
- Boîte de mouchoirs.




figure A

Remarque : les conditionnements multidoses comprennent un capuchon sur chaque pompe.

Amorçage de la pompe à gel – uniquement à la première utilisation

Avant d'utiliser une **nouvelle** pompe de Testarzon, vous devez la préparer pour son utilisation. Il s'agit de l'amorçage de la pompe.

- Enlevez l'applicateur de la pompe dans le cas où vous utilisez un conditionnement à dose unique ou retirez le capuchon de la pompe dans le cas d'un conditionnement multidoses. **Voir figure B.**




figure B

- Amorcez la pompe en enfonçant complètement la tête de la pompe au-dessus d'un mouchoir. Répétez l'opération jusqu'à ce que du gel apparaisse. **Voir figure C.**

figure C

- **N'utilisez pas le gel de l'amorçage, car il pourrait s'agir d'une mauvaise dose.**
- Jetez soigneusement les mouchoirs utilisés pour éviter un transfert à d'autres personnes, y compris des enfants ou des animaux domestiques.
- Votre pompe de Testarzon est maintenant prête à l'emploi.

Pour le dosage quotidien, suivez les étapes 1 à 4

Étape 1 : Préparation à l'application du gel Testarzon

- Choisissez une zone propre, sèche et normalement saine de la peau de la partie supérieure du bras et de l'épaule qui peut être recouverte par un T-shirt à manches courtes. **Voir figure D.**
- Appliquez le gel Testarzon **uniquement** sur la partie supérieure du bras et sur l'épaule.




figure D

- Enlevez l'applicateur de la pompe. **Voir figure E.**




figure E

- Enlevez le capuchon de l'applicateur. **Voir figure F.**



figure F

Étape 2 : Application du gel Testarzon

- Tenez la pompe de sorte que l'embout soit face à la tête de l'applicateur.
- Enfoncez complètement la tête de la pompe **une seule fois**. Voir figure G.



figure G

- Utilisez l'applicateur pour étaler le gel uniformément sur la partie supérieure d'un seul bras et sur une seule épaule en s'assurant de ne pas mettre de gel sur les mains. Voir figure H.
- Nettoyez tout débordement de gel avec un mouchoir. Jetez soigneusement les mouchoirs utilisés pour éviter un transfert à d'autres personnes, y compris des enfants ou des animaux domestiques.



figure H

Trouvez la dose prescrite par votre médecin dans le tableau ci-dessous.

Dose	Comment appliquer le gel
23 mg (enfoncer la pompe une fois)	Enfoncez la pompe une fois comme expliqué à l'étape 2. Faites-le une seule fois.
46 mg (enfoncer la pompe deux fois)	Enfoncez la pompe une fois comme expliqué à l'étape 2. Répétez l'opération pour appliquer la deuxième dose d'une action sur la pompe et appliquez le gel sur la partie supérieure de l'autre bras et sur l'autre épaule.

69 mg (enfoncer la pompe trois fois)	Enfoncez la pompe une fois comme expliqué à l'étape 2. Répétez l'opération pour appliquer la deuxième dose d'une action sur la pompe et appliquez le gel sur la partie supérieure de l'autre bras et sur l'autre épaule. Répétez l'opération à nouveau pour appliquer la troisième dose d'une action sur la pompe et appliquez le gel sur la partie supérieure du bras initial et sur l'épaule initiale.
---	---

Étape 3 : Nettoyage de l'applicateur de Testarzon

- Après utilisation, nettoyez l'applicateur avec un mouchoir. **Voir figure I.**



figure I

- Jetez soigneusement le mouchoir utilisé pour éviter un transfert à d'autres personnes, y compris des enfants ou des animaux domestiques.
- N'OUBLIEZ PAS** de remettre le capuchon sur l'applicateur et de remettre l'applicateur sur la pompe. **Voir figure J.**

figure J

- Conservez le produit en sécurité et hors de la portée des enfants.

Étape 4 : Après l'application du gel Testarzon

- Lavez-vous immédiatement les mains au savon et à l'eau si elles sont entrées en contact avec du gel.**
- Le gel Testarzon est inflammable jusqu'à ce qu'il soit sec. Laissez le gel Testarzon sécher avant de fumer ou de vous approcher d'une flamme nue.
- Attendez que le site d'application soit complètement sec avant de vous habiller.
- Portez des vêtements qui recouvrent le site d'application à tout moment pour éviter un transfert accidentel à d'autres personnes.
- Attendez au moins 2 heures** avant de vous doucher, de nager ou de vous baigner.
- Lavez le site d'application au savon et à l'eau préalablement à toute situation où un contact cutané du site d'application avec une autre personne est probable.

Si vous avez utilisé plus de Testarzon que vous n'auriez dû

Si vous avez appliqué trop de Testarzon par erreur, lavez le site d'application au savon et à l'eau dès que vous vous en apercevez.

Utilisez uniquement la quantité de médicament que votre médecin vous a prescrite. Si vous vous sentez irrité ou nerveux, si vous prenez du poids ou subissez des érections prolongées ou fréquentes, cela peut être l'indication que vous utilisez trop.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Testarzon, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Testarzon

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

- Si l'application suivante est prévue à moins de 12 heures, ne prenez pas la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose suivante normalement.
- Si elle est prévue à plus de 12 heures, appliquez la dose oubliée. Reprenez ensuite la posologie au rythme habituel le lendemain.

Si vous arrêtez d'utiliser Testarzon

Informez votre médecin avant d'arrêter d'utiliser Testarzon.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- irritation cutanée à l'endroit où le gel a été appliqué (y compris du rash, de la sécheresse et des rougeurs)
- taux élevé de graisses (triglycérides) dans le sang
- pression artérielle augmentée
- antigène spécifique de la prostate (PSA) augmenté. Le PSA est une protéine produite par la prostate qui permet de détecter une maladie de la prostate.
- hémocrite augmenté (pourcentage de globules rouges dans le sang), identifié par les tests de sang réguliers

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- hémoglobine augmentée (la composante des globules rouges qui transporte l'oxygène), identifiée par les tests de sang réguliers
- maux de tête

Autres effets indésirables connus associés à un traitement par testostérone :

acné, séborrhée, calvitie, sécrétion de sueur, augmentation de la pilosité au niveau du corps, chatouillement ou engourdissement de la peau, maux de tête, étourdissements, nausée, bouffées de chaleur, rétention de liquide (par exemple, gonflement des chevilles), prise de poids, apnée du sommeil, essoufflement, réactions d'hypersensibilité, sensation de malaise/d'être malade, changements d'humeur (par exemple, agression, hostilité, nervosité, anxiété, dépression), insomnie, douleurs ou crampes musculaires, développement de la poitrine, nombre de globules rouges augmenté, diminution des globules rouges, caillots sanguins, ictère (troubles hépatiques pouvant parfois être associés à un jaunissement de la peau et des blancs des yeux), tests hépatiques anormaux.

Modifications de la libido, érection accrue, priapisme (érections prolongées et douloureuses), trouble testiculaire, réduction de la quantité de sperme, difficulté d'uriner, modification de la glande prostatique, cancer de la prostate (il n'existe pas de preuves concluantes que la substitution de la testostérone chez les hommes hypogonadiques provoquerait le cancer de la prostate; cependant, le traitement par testostérone doit être évité chez les hommes qui présentent un cancer de la prostate déjà établi ou une suspicion de cancer de la prostate).

Une administration prolongée de testostérone peut modifier le taux de sels (électrolytes) et d'eau dans le corps.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance

Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles, Madou

site internet : www.notifieruneffetindesirable.be – e-mail : adr@afmps.be

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB)

CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois

Rue du Morvan

54 511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87

E-mail : crpv@chru-nancy.fr

ou

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

20, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg-Hamm

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Testarzon

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette de la pompe et l'emballage extérieur après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Testarzon

La substance active est testostérone.

Les autres excipients sont éthanol 96%, propylène glycol (E 1520), diéthylène glycol monoéthyl éther, carbomère 980, trolamine, édétate disodique et eau purifiée.

Un gramme de gel contient 20 mg de testostérone. Une seule action sur la pompe délivre 1,15 g (1,25 ml) de gel, contenant 23 mg de testostérone.

Aspect de Testarzon et contenu de l'emballage extérieur

Testarzon est un gel homogène, translucide à légèrement opalescent.

Les présentations suivantes existent avec ou sans applicateur et capuchon hygiénique:

Boîte contenant 1 pompe doseuse

Boîte contenant 3 pompes doseuses Chaque pompe contient 85,5 g de gel

Testarzon et peut délivrer 56 doses précises. Toutes les présentations peuvent ne

pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin D02 P593, Irlande

Fabricant

Copea Pharma Europe Ltd, Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58, Irlande

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE526613

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Économique Européen et au Royaume-Uni (Irlande du Nord) sous les noms suivants :

Belgique	Testarzon 20 mg/g transdermale gel/gel transdermique/transdermales Gel
Bulgarie	Testavan 20 mg/g трансдермален гел
Chypre	Testarzon 20 mg/g διαδερμική γέλη
Danemark	Testavan 20 mg/g transdermal gel
Allemagne	Testavan 20 mg/g transdermales Gel
Estonie	Testavan
Finlande	Testavan 20 mg/g transdermaaligeeli
France	Testavan 20 mg/g gel transdermique
Grèce	Testarzon 20 mg/g διαδερμική γέλη
Hongrie	Testarzon 20 mg/g transzdermális gél
Irlande	Testarzon 20 mg/g transdermal gel
Islande	Testavan 20 mg/g hlaup til notkunar um húð
Italie	Testavan 20 mg/g gel transdermico
Croatie	Testarzon 20 mg/g transdermalni gel
Lettonie	Testarzon 20 mg/g transdermālais gels
Liechtenstein	Testavan 20 mg/g transdermales Gel

Lituanie	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Luxembourg	Testarzon 20 mg/g gel transdermique/transdermales Gel
Malte	Testavan 20 mg/g transdermal gel
Pays-Bas	Testavan 20 mg/g gel voor transdermaal gebruik
Norvège	Testavan 20 mg/g transdermalgel
Autriche	Testavan 20 mg/g transdermales Gel
Pologne	Testavan
Portugal	Testavan 20 mg/g gel transdémico
Roumanie	Testavan 20 mg/g gel transdermic
Slovénie	Testarzon 23 mg/pritisk transdermalni gel
Slovaquie	Testavan 20 mg/g transdermálny gél
Espagne	Testavan 20 mg/g gel transdémico
République tchèque	Testavan
Royaume-Uni	
(Irlande du Nord)	Testavan 20 mg/g transdermal gel
Suède	Testavan 20 mg/g transdermal gel

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2023