

## Notice : information de l'utilisatrice

### Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés Désogestrel

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Desirett et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Desirett
3. Comment prendre Desirett
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Desirett
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Desirett et dans quels cas est-il utilisé

Desirett est utilisée pour prévenir la grossesse.

Desirett contient une petite quantité d'un type d'hormone sexuelle femelle, le progestatif **désogestrel**. C'est pourquoi, on appelle Desirett aussi une **minipilule** (pilule contenant seulement un progestatif). Contrairement aux pilules combinées, les minipilules ne contiennent pas d'hormone oestrogène en plus du progestatif. La plupart des minipilules agissent principalement en empêchant les spermatozoïdes de pénétrer dans la matrice, mais, n'inhibent pas toujours l'ovulation, ce qui est l'action principale des pilules combinées. Desirett diffère des autres PP parce qu'elle contient une dose qui est, dans la plupart des cas, suffisamment élevée pour inhiber l'ovulation. De ce fait, Desirett offre une haute efficacité contraceptive. Contrairement aux pilules combinées, Desirett peut être utilisée par des femmes qui ne supportent pas les oestrogènes et par des femmes qui allaitent. Un désavantage est que des saignements vaginaux peuvent se produire à intervalles irréguliers pendant l'utilisation de Desirett. Vous pouvez aussi ne pas avoir de saignements du tout.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Desirett

**Comme tous les autres contraceptifs hormonaux, Desirett ne protège pas contre l'infection VIH (SIDA) ni contre d'autres maladies sexuellement transmissibles.**

#### Ne prenez jamais Desirett

- Si vous êtes allergique au désogestrel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une thrombose. La thrombose est la formation d'un caillot de sang dans un vaisseau sanguin (par exemple, de la jambe (thrombose veineuse profonde) ou des poumons (embolie pulmonaire)).
- Si vous avez ou avez eu la jaunisse (jaunissement de la peau) ou une maladie grave du foie et que votre foie ne fonctionne pas encore normalement.
- Si vous avez une tumeur ou une suspicion d'une tumeur qui se développe sous l'influence des hormones sexuelles (par exemple, certain types de cancer du sein).
- Si vous avez des saignements vaginaux inexplicables.
- Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja.

Si l'une de ces situations vous concerne, parlez-en à votre médecin avant de commencer à utiliser Desirett. Il se peut que votre médecin vous conseille d'utiliser une méthode de régulation des naissances non-hormonale.

Si l'une de ces situations survient pour la première fois pendant l'utilisation de Desirett, vous devez immédiatement consulter votre médecin.

## **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Desirett si:

- vous avez eu un cancer du sein
- vous avez un cancer du foie puisqu'un effet possible de Desirett ne peut pas être exclu
- vous avez eu une thrombose
- vous souffrez de diabète
- vous souffrez d'épilepsie (voir aussi rubrique « Autres médicaments et Desirett »)
- vous souffrez de tuberculose (voir aussi rubrique « Autres médicaments et Desirett »)
- vous avez une tension artérielle élevée
- vous avez ou avez eu du chloasma (taches de pigmentation jaune-brun sur la peau surtout sur le visage); si tel est le cas, évitez l'exposition excessive au soleil ou aux rayonnements ultra-violets.

Si Desirett est utilisé en présence d'une de ces affections, il se peut que vous deviez être tenu sous surveillance étroite. Votre médecin peut expliquer ce que vous devez faire.

## **Cancer du sein**

Il est important d'examiner régulièrement vos seins et vous devez contacter votre médecin dès que possible si vous sentez une grosseur dans votre sein. On a diagnostiqué un peu plus souvent un cancer du sein chez les femmes prenant la pilule que chez les femmes du même âge qui ne la prennent pas. Si les femmes arrêtent de prendre la pilule, le risque diminue progressivement, de sorte que, 10 ans après l'arrêt, le risque est le même que pour les femmes qui n'ont jamais pris la pilule. Le cancer du sein est rare en dessous de 40 ans, mais le risque augmente lorsque la femme vieillit. Par conséquent, le nombre supplémentaire de cancers du sein diagnostiqués est plus élevé lorsque les femmes continuent de prendre la pilule lorsqu'elles sont plus âgées. Combien de temps on prend la pilule est moins important. Par 10000 femmes qui ont pris la pilule pendant 5 ans ou moins et ont arrêté de la prendre avant leur vingtième année, il y aurait, dans la période de 10 ans suivant l'arrêt, moins de 1 cas supplémentaire de cancer du sein diagnostiqué, en plus des 4 cas normalement diagnostiqués dans ce groupe d'âge. De même, par 10000 femmes qui ont pris la pilule pendant 5 ans ou moins et ont arrêté de la prendre avant leur trentième année, il y aurait 5 cas supplémentaires en plus des 44 cas normalement diagnostiqués. Par 10000 femmes qui ont utilisé la pilule pendant 5 ans ou moins et ont arrêté de la prendre avant leur quarantième année, il y aurait 20 cas supplémentaires en plus des 160 cas normalement diagnostiqués.

On croit que le risque de cancer du sein chez les utilisatrices de pilules qui ne contiennent qu'un progestatif, comme Desirett, est semblable au risque chez les femmes qui utilisent la pilule, mais l'évidence est moins concluante.

Les cancers du sein trouvés chez les femmes qui prennent la pilule sont plus souvent à un stade moins avancé que les cancers trouvés chez les femmes qui ne prennent pas la pilule. On ignore si la pilule entraîne un risque accru de cancer du sein. Il est possible que les femmes étaient examinées plus souvent de sorte que le cancer du sein a été détecté plus tôt.

## **Thrombose**

Vous devez immédiatement contacter votre médecin si vous remarquez des signes possibles d'une thrombose (voir aussi « Contrôles réguliers »). Une thrombose est la formation d'un caillot de sang pouvant bloquer un vaisseau sanguin. Une thrombose survient parfois dans les veines profondes des jambes (thrombose veineuse profonde). Si ce caillot sanguin se détache des veines ou il est formé, il peut atteindre et boucher les artères des poumons, provoquant une embolie pulmonaire. Ceci peut parfois aboutir à une issue fatale. La thrombose veineuse profonde est un incident rare. Elle peut survenir que vous preniez ou non la pilule. Elle peut aussi survenir si vous êtes enceinte. Le risque est plus élevé chez les utilisatrices de la pilule que chez les non-utilisatrices. On croit que le risque associé aux pilules comme Desirett ne contenant qu'un progestatif est plus faible que le risque associé aux pilules qui contiennent aussi des oestrogènes (pilules combinées).

## **Troubles psychiatriques**

Certaines femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux dont Desirett ont fait état d'une dépression ou d'un état dépressif. La dépression peut être grave et peut parfois donner lieu à des idées suicidaires. Si vous présentez des changements d'humeur et des symptômes dépressifs, sollicitez les conseils de votre médecin dès que possible.

## **Enfants et adolescents**

Il n'existe aucune donnée clinique sur l'efficacité et la sécurité chez les adolescentes de moins de 18 ans.

## Autres médicaments et Desirett

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament ou des produits à base de plantes, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin. Aussi, veuillez prévenir tout autre médecin ou dentiste qui vous prescrit un autre médicament (ou votre pharmacien), que vous prenez Desirett. Ils pourront vous dire si vous devez prendre des précautions contraceptives supplémentaires (par exemple, des préservatifs) et, au besoin, pendant combien de temps ou si l'utilisation d'un autre médicament dont vous avez besoin doit être modifiée.

Certains médicaments :

- peuvent avoir une influence sur les taux sanguins de Desirett
- peuvent diminuer son efficacité contraceptive
- peuvent entraîner des saignements inattendus.

Parmi ceux-ci, on compte les médicaments utilisés dans le traitement :

- de l'épilepsie (par ex. la primidone, la phénytoïne, la carbamazépine, l'oxcarbazépine, le felbamate, le topiramate et le phénobarbital)
- de la tuberculose (par ex. la rifampicine, la rifabutine)
- des infections par le VIH (par ex. le ritonavir, le nelfinavir, la névirapine et l'éfavirenz)
- de l'infection par le virus de l'hépatite C (par ex. le bocéprévir, le télaprévir)
- ou d'autres maladies infectieuses (par ex. la griséofulvine)
- de l'hypertension artérielle pulmonaire (le bosentan)
- de l'humeur dépressive (médicament à base d'une plante, le millepertuis)
- de certaines infections bactériennes (par ex. la clarithromycine, l'érythromycine)
- des infections fongiques (par ex. le kétoconazole, l'itraconazole, le fluconazole);
- une pression artérielle élevée (hypertension), un angor ou certains troubles du rythme cardiaque (par ex. le diltiazem).

Si vous prenez des médicaments ou des produits à base de plantes qui peuvent rendre Desirett moins efficace, une méthode contraceptive barrière doit également être utilisée. Comme l'effet d'un autre médicament sur Desirett peut durer jusqu'à 28 jours après l'arrêt du médicament, il est nécessaire d'utiliser une méthode contraceptive barrière supplémentaire pendant toute cette durée.

Votre médecin peut vous dire si vous devez prendre des précautions contraceptives supplémentaires et si c'est le cas, combien de temps vous devez les prendre.

Desirett peut également interférer avec le fonctionnement d'autres médicaments en provoquant soit une augmentation de l'effet (par exemple, médicaments qui contiennent de la cyclosporine) soit une diminution de l'effet (par exemple, lamotrigine).

*Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser tout médicament.*

## Grossesse et allaitement

### Grossesse

Vous ne pouvez pas utiliser Desirett si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.

### Allaitement

Desirett peut être utilisé pendant que vous allaitez. Il semble que Desirett n'influence pas la production ou la qualité du lait maternel. Cependant, il y a eu peu de rapports faisant état d'une diminution de la production de lait maternel pendant l'utilisation de Desirett. De petites quantités de la substance active de Desirett passent dans le lait maternel. La santé d'enfants nourris au sein pendant 7 mois dont les mères utilisaient Desirett a été étudiée jusqu'à l'âge de 2,5 ans. On n'a pas observé d'effets sur la croissance et le développement des enfants.

Si vous allaitez et vous voulez utiliser Desirett, contactez votre médecin.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données suggérant que l'utilisation de Desirett influence la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser une machine.

### Desirett contient du lactose et de l'huile de soja

Si votre médecin vous a informé que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes allergique à la cacahuète ou au soja, n'utilisez pas ce médicament.

### Contrôles réguliers

Quand vous utilisez Desirett, votre médecin vous demandera de revenir pour des examens médicaux périodiques. En général, la fréquence et la nature de ces examens médicaux périodiques dépendra de votre situation personnelle.

- **Contactez votre médecin dès que possible si:** vous avez une douleur sévère ou un gonflement dans l'une de vos jambes, de douleurs inexplicables dans la poitrine, d'essoufflement, une toux inhabituelle, spécialement quand elle est accompagnée d'expectorations sanguines (indiquant la possibilité d'une thrombose)
- vous avez mal de ventre soudain ou de jaunisse (indiquant la possibilité de problèmes hépatiques)
- vous avez une grosseur dans votre sein (indiquant la possibilité d'un cancer du sein)
- vous avez une douleur soudaine ou aigue dans le bas du ventre ou dans la région de l'estomac (indiquant la possibilité d'une grossesse ectopique, c'est une grossesse à l'extérieur de la matrice)
- vous devez rester immobilisée quelques temps ou vous devez subir une opération (consultez votre médecin au moins quatre semaines à l'avance)
- vous avez de saignements vaginaux inhabituels abondants
- vous pensez que vous pourriez être enceinte.

### 3. Comment prendre Desirett

#### Quand et comment prendre les comprimés?

La plaquette de Desirett contient 28 comprimés. Les jours de la semaine sont imprimés sur la plaquette et également des flèches sont imprimées indiquant l'ordre pour prendre les pilules. Chaque jour correspond à un comprimé. Chaque fois que vous commencez une nouvelle plaquette de Desirett, prenez un comprimé de la rangée supérieure. Ne commencez pas avec n'importe quel comprimé. Par exemple, si vous commencez un mercredi, vous devez prendre le comprimé de la rangée supérieure indiquée par ME (mercredi). Vous continuez à prendre un comprimé par jour jusqu'à ce que la plaquette soit vide, en suivant toujours le sens indiqué par les flèches. En regardant la plaquette, vous pouvez facilement contrôler si vous avez déjà pris votre comprimé du jour. Prenez votre comprimé environ au même moment chaque jour. Avalez le comprimé en entier, avec de l'eau. Pendant l'utilisation de Desirett, il est possible que vous ayez des saignements, mais vous devez continuer à prendre vos comprimés normalement. Quand une plaquette est vide, vous devez commencer une nouvelle plaquette de Desirett immédiatement le jour suivant - donc sans interruption et sans attendre une hémorragie.

#### Quand débiter la première plaquette de Desirett

*Vous n'utilisez pas de contraceptif hormonal le mois précédent*

Attendez vos règles pour commencer. Prenez le premier comprimé de Desirett le premier jour de vos règles. Vous ne devez pas prendre de précautions contraceptives supplémentaires. Vous pouvez aussi commencer du 2ème au 5ème jour de votre cycle, mais dans ce cas, vous devez veiller à utiliser, une méthode contraceptive supplémentaire (méthode barrière) pendant les 7 premiers jours que vous prenez des comprimés.

*Vous passez d'une pilule combinée, un anneau vaginal, ou patch transdermique*

Vous pouvez commencer à prendre Desirett le jour qui suit la prise du dernier comprimé de votre plaquette de pilules actuelle, ou le jour du retrait de votre anneau vaginal ou patch (ceci signifie qu'il n'y a pas d'intervalle sans pilule, sans anneau ou sans patch). Si votre plaquette de pilules actuelle contient aussi des comprimés inactifs, vous pouvez commencer à prendre Desirett le jour qui suit la prise du dernier comprimé actif (si vous ne savez pas quel est ce comprimé, demandez-le à votre médecin ou pharmacien). Si vous respectez ces instructions, vous ne devez pas prendre de précautions contraceptives supplémentaires.

Vous pouvez aussi commencer au plus tard, le jour suivant l'intervalle sans comprimés, sans patch, sans anneau ou l'intervalle de comprimés placebo de votre contraceptif actuel. Si vous respectez ces instructions, assurez-vous d'utiliser une méthode contraceptive supplémentaire (méthode barrière) pendant les 7 premiers jours de prise de comprimés.

*Vous passez d'un autre progestatif seul (minipilule)*

Vous pouvez commencer à prendre Desirett du jour au lendemain. Vous ne devez pas prendre de précautions contraceptives supplémentaires.

*Vous passez d'une préparation injectable, d'un implant, ou d'un stérilet libérant un progestatif*

Commencez à prendre Desirett le jour prévu pour l'injection suivante ou le jour du retrait de votre implant ou de votre stérilet. Vous ne devez pas utiliser de méthode contraceptive supplémentaire.

*Après un accouchement*

Vous pouvez commencer à prendre Desirett du 21<sup>ème</sup> au 28<sup>ème</sup> jour après la naissance de votre enfant. Si vous commencez plus tard, assurez-vous d'utiliser au cours du premier cycle, une méthode contraceptive supplémentaire (méthode barrière) pendant les 7 premiers jours de prise de comprimés. Cependant si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, il faut exclure une grossesse avant de commencer à utiliser Desirett.

Des informations supplémentaires pour les femmes qui allaitent peuvent être trouvées dans « Grossesse et allaitement » dans la rubrique 2. Votre médecin peut aussi vous conseiller.

*Après une fausse couche ou un avortement*

Suivez les conseils de votre médecin.

### **Si vous oubliez de prendre Desirett**

Si vous avez **moins de 12 heures de retard** dans la prise d'un comprimé, la protection contre une grossesse par Desirett n'est pas réduite. Prenez alors le comprimé dès que vous vous en souvenez et ensuite prenez les comprimés suivants à nouveau à l'heure habituelle.

Si vous avez **plus de 12 heures de retard** dans la prise d'un comprimé, la protection contre une grossesse par Desirett peut être réduite. Plus le nombre de comprimés que vous avez oubliés est élevé, plus le risque est élevé que la protection contre une grossesse soit réduite. Prenez alors le dernier comprimé oublié dès que vous vous en souvenez et ensuite prenez les comprimés suivants à nouveau à l'heure habituelle. Utilisez aussi une méthode contraceptive supplémentaire (méthode barrière) pendant les 7 jours suivants de la prise des comprimés. Si vous avez oublié un ou plusieurs comprimés au cours de la première semaine de la prise des comprimés et si vous avez eu des rapports sexuels dans la semaine précédant l'oubli, il est possible que vous soyez enceinte. Demandez l'avis de votre médecin.

### **Si vous souffrez de troubles gastro-intestinaux (par exemple, vomissements, diarrhée sévère)**

Suivez les conseils donnés en cas d'oubli de comprimés à la rubrique précédente. Si vous vomissez dans les 3 à 4 heures suivant la prise de votre comprimé de Desirett ou si vous avez une diarrhée sévère, il y a un risque que la substance active n'ait pas été totalement absorbé par votre organisme.

### **Si vous avez pris plus de Desirett que vous n'auriez dû**

Il n'y a pas eu de rapports d'effets néfastes sérieux suite à la prise d'un trop grand nombre de comprimés de Desirett en une fois. Les symptômes qui peuvent apparaître sont des nausées, des vomissements et, chez les jeunes filles, des saignements vaginaux légers. Demandez l'avis de votre médecin.

Si vous avez pris trop de Desirett, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

### **Si vous arrêtez de prendre Desirett**

Vous pouvez arrêter de prendre Desirett quand vous voulez. A partir du jour ou vous arrêtez, vous n'êtes plus protégée contre une grossesse.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables sérieux associés à l'utilisation de Desirett sont décrits dans les paragraphes « Cancer du sein » et « Thrombose » dans la rubrique 2 « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Desirett ». Pour plus d'informations veuillez lire cette rubrique et, si nécessaire, consultez immédiatement votre médecin.

Vous devez consulter votre médecin immédiatement si vous présentez des réactions allergiques (hypersensibilité), y compris un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge entraînant des difficultés à respirer ou à avaler (angioœdème et/ou anaphylaxie).

Des saignements vaginaux peuvent se produire à intervalles irréguliers pendant l'utilisation de Desirett. Cela peut se limiter à de faibles taches qui ne nécessitent même pas une protection hygiénique ou il peut s'agir de saignements plus abondants, qui ressemblent plutôt à des règles peu abondantes et nécessitent une protection hygiénique. Vous pouvez aussi ne pas avoir de saignements du tout. Les saignements irréguliers ne sont pas un signe que la protection contraceptive de Desirett est diminuée. En général, vous ne devez pas prendre d'action : vous devez juste continuer à prendre Desirett. Si, toutefois, les saignements sont importants ou prolongés, consultez votre médecin.

Les utilisatrices de Desirett ont rapporté les effets indésirables suivants:

- Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 femme sur 10:  
changement de l'humeur, état dépressif, diminution de la libido, maux de tête, nausées, acné, douleurs mammaires, règles irrégulières ou absence de règles, augmentation de poids.
- Peu fréquent : peut affecter jusqu'à 1 femme sur 100:  
infections du vagin, irritation des yeux en cas d'utilisation de verres de contact, vomissements, chute de cheveux, règles douloureuses, kystes ovariens, fatigue
- Rare : peut affecter jusqu'à 1 femme sur 1000:  
éruption cutanée, urticaire, tuméfaction douloureuse de couleur rouge-bleu de la peau (érythème noueux). Ce sont des affections de la peau.
- Indéterminé : (ne peut être estimé sur la base des données disponibles) :  
réaction allergique

En plus de ces effets indésirables, une sécrétion mammaire peut se produire.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement:

*Belgique :*

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ; Division Vigilance ; Avenue Galilée 5/03, 1210

BRUXELLES Site internet: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

*Luxembourg :*

Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la Santé à Luxembourg :

pharmacovigilance@ms.etat.lu; Tél. : (+352)247-85592 ;

ou

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy : [crpv@chru-nancy.fr](mailto:crpv@chru-nancy.fr); Tél. : (+33)383656085/87 ;

Lien pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. Comment conserver Desirett**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

La substance active montre un risque environnemental pour le poisson.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Desirett

La substance active est le désogestrel (75 microgrammes).

Les autres composants sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone, d- $\alpha$ -tocophérol, huile de soja, silice colloïdale anhydre, silice colloïdale hydratée, acide stéarique, hypromellose, macrogol, dioxyde de titane (E171). (Voir aussi « Desirett contient du lactose et de l'huile de soja » dans la rubrique 2).

### Comment se présente Desirett et contenu de l'emballage extérieur

Une plaquette de Desirett contient 28 comprimés pelliculés, ronds et blancs. Chaque boîte en carton contient respectivement 1, 3, 6 ou 13 plaquettes. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Exeltis Germany GmbH  
Adalperostraße 84  
85737 Ismaning  
Allemagne

### Fabricant

Laboratorios León Farma, S.A.  
Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N  
24008 Navatejera (Leon)  
Espagne

### Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms :

BE Desirett 75 microgram filmomhulde tabletten, 75 microgrammes comprimés pelliculés, 75 Mikrogramm Filmtabletten

DE Desirett 75 mcg  
DK Desirett 75 mcg  
EE Desirett 75 mcg  
FI Desirett  
HU Desirett 75 mcg  
IS Desirett 75 mcg  
IT Desirett  
LT Desirett 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės  
LV Desirett 75 mikrogrami apvalkotās tabletes  
LU Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés  
NO Desirett

SE Velavel

SK Desirett 75 microgramov

UK Desogestrel 75 microgram film-coated tablets

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché :** BE536462

**Mode de délivrance :** sur prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est** 05/2022.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est** 02/2023.