

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker****Desirett 75 microgram filmomhulde tabletten  
Desogestrel**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Desirett en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Desirett en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Desirett wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.

Desirett bevat een kleine hoeveelheid van een type vrouwelijk geslachtshormoon, het progestageen **desogestrel**. Daarom wordt Desirett ook wel een “pil met alleen progestageen” of een **minipil** genoemd. Minipillen bevatten - in tegenstelling tot combinatiepillen - naast het progestageen geen oestrogeen hormoon. De werking van de meeste minipillen berust vooral op het feit dat ze het binnendringen van de zaadcellen in de baarmoeder voorkomen. De rijping van een eikel wordt niet altijd tegengegaan. Dit laatste is de belangrijkste werking van de combinatiepil. Desirett verschilt van de meeste pillen met alleen progestageen doordat de dosis hoog genoeg is om in de meeste gevallen wel de rijping van een eikel te voorkomen. Daardoor biedt Desirett een hoge contraceptieve werkzaamheid. In tegenstelling tot combinatiepillen kan Desirett gebruikt worden door vrouwen die geen oestrogenen verdragen en door vrouwen die borstvoeding geven. Een nadeel is dat vaginale bloedingen met onregelmatige tussenpozen kunnen optreden tijdens het gebruik van Desirett. Er is ook een kans dat deze bloedingen helemaal uitblijven.

**2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

**Desirett biedt net als andere hormonale voorbehoedmiddelen geen bescherming tegen infectie met het HIV virus (AIDS) en ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor desogestrel of voor één van de stoffen van dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U heeft een trombose. Trombose is de vorming van een bloedstolsel in een bloedvat (bijvoorbeeld in een been (diepe veneuze trombose) of in de longen (longembolie)).
- U heeft geelzucht (geel worden van de huid) of een ernstige leveraandoening of u heeft dit gehad en uw leverfunctie is nog steeds niet normaal.
- U heeft een kanker of er wordt vermoed dat u een kanker heeft die gevoelig is voor geslachtshormonen, zoals bepaalde vormen van borstkanker.
- U heeft onverklaarbare vaginale bloedingen.
- Als u allergisch bent voor pinda of soja.

Vertel het aan uw arts als een van deze situaties op u van toepassing is voordat u Desirett begint in te nemen. Uw arts raadt u dan misschien een niet-hormonale methode van geboorteregeling aan.

Als een van deze situaties voor de eerste keer optreedt terwijl u Desirett gebruikt, raadpleeg uw arts dan onmiddellijk.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts voordat u start met het gebruik van dit middel als

- u ooit borstkanker heeft gehad
- u leverkanker heeft, aangezien een mogelijk effect van Desirett niet kan uitgesloten worden
- u ooit trombose gehad heeft
- u suikerziekte heeft
- u epilepsie heeft (zie ook rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen”)
- u tuberculose heeft (zie ook rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen”)
- u hoge bloeddruk heeft
- u chloasma heeft, of dit ooit gehad heeft (geel-bruine pigmentvlekken, vooral in het gezicht); als dit het geval is, vermijd te veel blootstelling aan zonlicht of ultraviolette straling.

Wanneer Desirett in aanwezigheid van één van deze aandoeningen gebruikt wordt, is het mogelijk dat u onder zorgvuldige controle moet gehouden worden. Uw arts kan u uitleggen wat u moet doen.

### **Borstkanker**

Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren en u moet zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts als u knobbeltjes in uw borsten voelt. Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Als vrouwen met de pil stoppen dan vermindert dit risico weer langzaam, zodat 10 jaar na het stoppen het risico hetzelfde is als voor vrouwen die de pil nooit gebruikt hebben. Borstkanker komt zelden voor beneden de 40 jaar, maar het risico wordt groter naarmate de leeftijd toeneemt. Daarom is het extra aantal borstkankers dat gediagnosticeerd wordt hoger als de vrouw de pil blijft nemen wanneer ze ouder is. Hoe lang de pil gebruikt wordt is minder belangrijk. Voor elke 10.000 vrouwen die de pil 5 jaar of minder gebruikt hebben, maar gestopt zijn voor hun 20ste zou er in de periode tot 10 jaar na het stoppen minder dan 1 extra geval van borstkanker worden gevonden, bovenop de 4 gevallen die normaal in deze leeftijdsgroep voorkomen. Op dezelfde manier zou er bij elke 10.000 vrouwen die de pil 5 jaar of minder gebruikt hebben en stoppen voor hun 30ste 5 extra gevallen zijn, bovenop de 44 die normaal gevonden worden. Voor 10.000 vrouwen die de pil 5 jaar of minder gebruikt hebben en gestopt zijn voor hun 40ste zijn er 20 extra gevallen, bovenop de 160 die normaal gevonden worden.

Men vermoedt dat het risico op borstkanker bij de gebruiksters van pillen die alleen progestageen bevatten, zoals Desirett, hetzelfde is als het risico bij vrouwen die de pil gebruiken, het bewijs is echter minder overtuigend.

De gevallen van borstkanker die in pilgebruiksters gevonden worden zijn vaker in een minder vergevorderd stadium dan die in niet-pilgebruiksters. Het is niet zeker of de pil het verhoogde risico op borstkanker veroorzaakt. Het kan ook zijn dat pilgebruiksters vaker worden onderzocht zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt.

### **Trombose**

U moet onmiddellijk contact met uw arts opnemen als u last krijgt van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie ook “Regelmatige controles”). Trombose is de vorming van een bloedstolsel waardoor een bloedvat kan worden afgesloten. Trombose treedt soms op in één van de diepgelegen aderen van het onderbeen (diepe veneuze trombose). Als het stolsel loskomt van het bloedvat waar het gevormd is, kan het terecht komen in de slagaderen van de longen en daar een bloedvat afsluiten (longembolie). Dit kan soms fataal aflopen. Diepe veneuze trombose komt zelden voor. Het kan bij pilgebruiksters en bij niet-pilgebruiksters voorkomen en ook als u zwanger bent. Het risico op trombose is bij pilgebruiksters groter dan bij niet-pilgebruiksters. Van pillen zoals Desirett, die alleen progestageen hormoon bevatten wordt aangenomen dat het risico lager is dan bij pillen die ook oestrogeen hormoon bevatten (combinatiepillen).

### **Psychische stoornissen**

Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Desirett gebruiken, hebben melding gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot zelfmoordgedachten leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts voor verder medisch advies.

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid bij jongeren onder de 18 jaar.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Neemt u naast Desirett nog andere geneesmiddelen of kruidenmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Dat geldt ook voor

geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vertel dat dan uw arts., Vertel ook aan elke andere arts of tandarts die u een ander geneesmiddel voorschrijft (of aan uw apotheker) dat u Desirett neemt. Ze kunnen u zeggen of u aanvullende anticonceptiemiddelen moet gebruiken (bijvoorbeeld condoms), en indien dit het geval is, voor hoelang en of het gebruik van een ander geneesmiddel dat u nodig hebt, moet worden gewijzigd.

Sommige geneesmiddelen:

- kunnen invloed hebben op de bloedspiegels van Desirett
- kunnen Desirett minder effectief maken om zwangerschap te voorkomen
- kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken.

Dit zijn onder andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van:

- epilepsie (bijv. primidon, fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine, felbamaat, topiramaat en fenobarbital)
- tuberculose (bijv. rifampicine, rifabutine)
- hiv-infecties (bijv. ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
- infectie met het hepatitis-C-virus (bv. boceprevir, telaprevir)
- of andere besmettelijke ziekten (bv. griseofulvine)
- hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan)
- depressieve stemmingen (het kruidenmiddel sint-janskruid)
- bepaalde bacteriële infecties (bv. claritromycine, erythromycine)
- schimmelinfecties (bv. ketoconazol, itraconazol, fluconazol)
- hoge bloeddruk (hypertensie), angina pectoris of bepaalde hartritme stoornissen (bv. diltiazem).

Als u geneesmiddelen of kruidenmiddelen inneemt die Desirett minder effectief kunnen maken, moet u ook een barrière-anticonceptieve methode gebruiken. Aangezien het effect van een ander geneesmiddel op Desirett tot 28 dagen na het stoppen van dat geneesmiddel kan voortduren, moet u die extra barrière-anticonceptieve methode gedurende die tijd blijven gebruiken.

Uw arts kan u vertellen of u een extra voorbehoedmiddel moet gebruiken en indien ja, hoelang u dat moet gebruiken. Desirett kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en kan een verhoging van het effect (bijvoorbeeld geneesmiddelen die ciclosporine bevatten) of een verlaging van het effect veroorzaken (lamotrigine).

*Vraag uw arts of apotheker voor advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

## **Zwangerschap, borstvoeding**

### **Zwangerschap**

Gebruik Desirett niet als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn.

### **Borstvoeding**

Desirett mag gebruikt worden wanneer u borstvoeding geeft. Desirett blijkt geen invloed te hebben op de productie en kwaliteit van de moedermelk. Er zijn echter zelden meldingen geweest van een afname van de productie van moedermelk tijdens het gebruik van Desirett. Een kleine hoeveelheid van het werkzame bestanddeel van Desirett komt in de moedermelk terecht. De gezondheid van kinderen die 7 maanden lang borstvoeding kregen terwijl de moeders Desirett gebruikten, werd tot op de leeftijd van 2,5 jaar bestudeerd. Er werden geen afwijkingen in de groei en de ontwikkeling van de kinderen gezien. Als u borstvoeding geeft en u wilt Desirett gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er is geen informatie die erop wijst dat het gebruik van Desirett invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

### **Desirett bevat lactose (melksuiker) en sojaboonolie**

Neem contact op met uw arts voordat u Desirett inneemt als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent aan pindanoten of soja.

### **Regelmatige controles**

Uw arts kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een medische controle als u Desirett gebruikt. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.

**Neem zo snel mogelijk contact op met de arts, als :**

- u hevige pijn of zwellingen in één van uw benen heeft, onverklaarbare pijn op de borst, ademnood, een ongewone hoest, vooral wanneer u bloed ophoest (verschijnselen die op trombose kunnen wijzen)
- u heeft een plotse, ernstige buikpijn of geelzucht (dit kan op leverproblemen wijzen)
- u een knobbeltje in uw borst voelt (dit kan op borstkanker wijzen)
- u een plotselinge of hevige pijn heeft laag in de buik of in de maagstreek (dit kan op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wijzen, dit is een zwangerschap buiten de baarmoeder)
- u geïmmobiliseerd dient te worden of een operatie moet ondergaan (raadpleeg uw arts minstens vier weken vooraf)
- u ongewoon, hevig vaginaal bloedverlies heeft
- u vermoedt dat u zwanger zou kunnen zijn.

**3. Hoe neemt u dit middel in?****Wanneer en hoe neemt u de tabletten in?**

De Desirett blisterverpakking bevat 28 tabletten. De dagen van de week zijn gedrukt op de blister en er zijn ook pijlen gedrukt die aangeven in welke volgorde de tabletten moeten ingenomen worden. Bij elke dag hoort een tablet. Elke keer u met een nieuwe verpakking van Desirett begint, neem een tablet uit de bovenste rij. Zorg dat u met de juiste tablet begint. Bijvoorbeeld, als u op woensdag begint, neemt u de tablet uit de bovenste rij waar WO (woensdag) bij staat. Volg de richting van de pijlen en neem iedere dag een tablet totdat de blisterverpakking leeg is. Door te kijken naar de pilblisterverpakking, kunt u gemakkelijk controleren of u uw tablet op een bepaalde dag al heeft ingenomen. Neem uw tablet elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip in. Slik de tablet in zijn geheel in, met water. Tijdens het gebruik van Desirett kan u wat last krijgen van bloedingen, maar u moet uw tabletten gewoon blijven innemen. Als de blisterverpakking leeg is, begint u meteen de volgende dag met een nieuwe Desirett blisterverpakking - dus zonder onderbreking, en zonder op een bloeding te wachten.

**Starten met de eerste blisterverpakking?**

*U heeft de afgelopen maand geen hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt*

Wacht tot uw menstruatie begint. Begin met Desirett op de eerste dag van de cyclus. U hoeft dan geen extra voorbehoedmiddel te gebruiken. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen dat u de tabletten inneemt wel een aanvullende contraceptieve methode (een barrièremethode) gebruiken.

*Overschakeling van een combinatiepil, vaginale ring of transdermale pleister*

U kan met het innemen van Desirett beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw huidige pilblisterverpakking heeft genomen, of op de dag van de verwijdering van uw vaginale ring of pleister (dus zonder tabletvrije-, ringvrije- of pleistervrije periode). Als uw huidige pilblisterverpakking ook placebotabletten bevat, moet u met Desirett beginnen op de dag nadat u de laatste actieve tablet heeft genomen (als u niet zeker weet welke dit is, vraag dan uw arts of apotheker om advies). Indien u deze instructies volgt hoeft u geen extra voorbehoedmiddel te gebruiken.

U mag ook uiterlijk op de dag beginnen die volgt op de gebruikelijke tabletvrije-, ringvrije-, pleistervrije periode of de laatste placebotablet van uw huidig anticonceptivum. Indien u deze instructies volgt, moet u ervoor zorgen dat u een aanvullende contraceptieve methode (een barrièremethode) gebruikt tijdens de eerste 7 dagen dat tabletten worden ingenomen.

*U schakelt over van een ander middel met uitsluitend progestageen (minipil)*

U kunt op elk moment overschakelen naar Desirett en er moet geen extra voorbehoedmiddel gebruikt worden.

*U schakelt over van een injectiepreparaat, implant of een progestageen-afgevend spiraaltje*

Begin met de inname van Desirett op de dag die voorzien was voor uw volgende injectie of op de dag dat uw implantaat of hormoon-afgevend spiraaltje wordt verwijderd. U hoeft geen extra voorbehoedmiddel te gebruiken.

*Na een bevalling*

U mag Desirett starten 21 tot 28 dagen na de bevalling. Als u later start, moet u een aanvullende contraceptieve methode (een barrièremethode) gebruiken tijdens de eerste zeven dagen dat u de tabletten inneemt. Als u echter reeds geslachtsgemeenschap heeft gehad, dan moet eerst een eventuele zwangerschap worden uitgesloten voordat u met Desirett begint.

Aanvullende informatie voor vrouwen die borstvoeding geven, kan gevonden worden in “Zwangerschap en Borstvoeding” in rubriek 2. Uw arts kan u ook advies geven.

*Na een miskraam of abortus*

Uw arts zal u advies geven.

### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Als u **minder dan 12 uur** te laat bent met het innemen van een tablet, vermindert de bescherming tegen zwangerschap door Desirett niet. Neem de tablet in zodra u het zich herinnert, en neem dan de volgende tabletten weer op het gebruikelijke uur in.

Als u **meer dan 12 uur** te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap door Desirett verminderd zijn. Hoe meer tabletten u na elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking verminderd is. Neem de laatste vergeten tablet in zodra u het zich herinnert en neem dan de volgende tabletten weer op het gebruikelijke uur in. Gebruik gedurende de eerstvolgende 7 dagen van tabletinname een aanvullende contraceptieve methode (een barrièremethode). Als u een of meerdere tabletten bent vergeten in de eerste week van tabletinname en u in de week voorafgaand aan het vergeten geslachtsgemeenschap heeft gehad, dan moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Vraag uw arts om advies.

### **Als u maagdarfstoornissen heeft (bijvoorbeeld braken, ernstige diarree)**

Volg het advies voor het vergeten van tabletten zoals in de rubriek hierboven is beschreven. Als u binnen 3 tot 4 uur na het innemen van een tablet braakt, of als u ernstige diarree hebt, is er een kans dat de werkzame stof niet volledig in het lichaam wordt opgenomen.

### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen na het innemen van te veel Desirett tabletten tegelijk. U kunt mogelijk last krijgen van misselijkheid en braken. Bij jonge meisjes kan gering bloedverlies uit de vagina voorkomen. Voor meer informatie, vraag uw arts om advies.

Wanneer u teveel Desirett heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

### **Als u stopt met het innemen van dit middel**

U kunt met Desirett stoppen wanneer u wilt. Vanaf de dag dat u stopt, bent u niet langer beschermd tegen zwangerschap.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Ernstige bijwerkingen die worden toegeschreven aan het gebruik van Desirett worden beschreven in de paragrafen "Borstkanker" en "Trombose" in rubriek 2 "Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?". Lees deze rubriek voor meer informatie en raadpleeg uw arts indien nodig.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u allergische reacties (overgevoeligheid) ervaart, waaronder zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel, waardoor u moeilijk kunt ademen of slikken (angio-oedeem en/of anafylaxie).

Tijdens het gebruik van Desirett kan er mogelijk met onregelmatige tussenpozen vaginaal bloedverlies optreden. Dit kan zich beperken tot wat druppeltjes waarvoor u geen maandverband nodig heeft of er kan sprake zijn van meer bloedverlies, zoals bij een lichte maandelijks bloeding, waarvoor u maandverband nodig heeft. U kan ook helemaal geen bloeding hebben. De onregelmatige bloedingen betekenen niet dat de bescherming tegen zwangerschap door Desirett verminderd is. In het algemeen hoeft u niets te doen en kunt u gewoon doorgaan met het innemen van Desirett. Als het bloedverlies echter ernstig of langdurig is, moet u de arts raadplegen.

Gebruikers van Desirett hebben de volgende bijwerkingen gemeld:

- Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 vrouwen:  
stemmingsveranderingen, depressieve stemming, minder zin om te vrijen (libido), hoofdpijn, misselijkheid, acne, pijnlijke borsten, onregelmatige of geen menstruatie, gewichtstoename.
- Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 vrouwen:

infecties in de vagina, problemen met het dragen van contactlenzen, braken, haaruitval, pijnlijke menstruatie, ovariumcysten, vermoedheid.

- Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 vrouwen: huiduitslag, urticaria, pijnlijke rood-blauwe zwellingen (erythema nodosum). Dit zijn huidaandoeningen.
- Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald: allergische reacties.

Naast deze bijwerkingen kan ook afscheiding uit de borsten optreden.

### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten; Afdeling Vigilantie; Galileelaan 5/03, 1210

BRUSSEL Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### 5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na "EXP". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De werkzame stof vormt in het milieu een risico voor vissen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

### 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is desogestrel (75 microgram).

De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, maiszetmeel, povidon, d- $\alpha$ -tocoferol, sojaboonolie, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur, hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171) (Zie ook "Desirett bevat lactose en sojaboonolie" in rubriek 2).

#### Hoe ziet Desirett eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een blisterverpakking van Desirett bevat 28 witte, ronde filmomhulde tabletten. Elk kartonnen doosje bevat 1, 3, 6 of 13 blisterverpakkingen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Exeltis Germany GmbH

Adalperostraße 84

85737 Ismaning

Duitsland

#### Fabrikant

Laboratorios León Farma, S.A.

Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N

24008 Navatejera (Leon)

Spanje

#### Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BE Desirett 75 microgram filmomhulde tabletten, 75 microgrammes comprimés pelliculés, 75 Mikrogramm

## Filmtabletten

DE	Desirett 75 mcg
DK	Desirett 75 mcg
EE	Desirett 75 mcg
FI	Desirett
HU	Desirett 75 mcg
IS	Desirett 75 mcg
IT	Desirett
LT	Desirett 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės
LV	Desirett 75 mikrogrami apvalkotās tabletes
LU	Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés
NO	Desirett

SE Velavel

SK Desirett 75 microgramov

UK Desogestrel 75 microgram film-coated tablets

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE536462**

**Afleveringswijze:** op medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 05/2022.**

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2023.**