

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **AtrosanMed Filmdabletten**

Harpagophytum procumbens D.C. und/oder H. zeyheri L. Decne

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist AtrosanMed Filmdabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von AtrosanMed Filmdabletten beachten?
3. Wie ist AtrosanMed Filmdabletten anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist AtrosanMed Filmdabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist AtrosanMed Filmdabletten und wofür wird es angewendet?**

AtrosanMed ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das angewendet wird zur Linderung von:

- rheumatischen bzw. Muskelschmerzen,
- allgemeinen Bewegungsschmerzen und Beschwerden in Muskeln und Gelenken,
- Rückenschmerzen.

Die Anwendung beruht ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung.

Wenn Sie sich nach 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn die Symptome bei Anwendung des Arzneimittels weiterbestehen oder andere als die in der Packungsbeilage erwähnte Nebenwirkungen auftreten.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von AtrosanMed Filmdabletten beachten?**

##### **AtrosanMed Filmdabletten darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie allergisch gegen das Extrakt der Wurzeln des Harpagophytum procumbens (Teufelskrallen) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie unter Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren leiden.
- wenn Sie unter 18 Jahre alt sind.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie AtrosanMed anwenden.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt:

- wenn sich die Beschwerden verschlimmern.

- wenn Sie nach 8 Wochen ununterbrochener Einnahme von AtrosanMed keine Verbesserung Ihrer Beschwerden bemerken oder wenn die Beschwerden erneut auftreten.
- wenn die Gelenkschmerzen mit einer Anschwellung oder Rötung des Gelenkes oder mit Fieber verbunden sind.
- wenn Sie unter Herzbeschwerden leiden und AtrosanMed einnehmen möchten.
- wenn Sie Gallensteine haben und AtrosanMed einnehmen möchten.

### **Kinder**

AtrosanMed ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre geeignet.

### **Anwendung von AtrosanMed Filmdoublets zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Sie können AtrosanMed zusammen mit anderen Arzneimitteln anwenden.

### **Anwendung von AtrosanMed Filmdoublets zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

AtrosanMed wird vorzugsweise direkt im Anschluss an eine Mahlzeit eingenommen.

Während der Anwendung von AtrosanMed kann normal gegessen und getrunken werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung von Teufelskralle bei schwangeren Frauen liegen keine Angaben vor. Vorsichtshalber sollte jedoch die Anwendung von AtrosanMed während der Schwangerschaft vermieden werden.

Es ist nicht bekannt, ob Teufelskralle in die Muttermilch übergeht. AtrosanMed darf während der Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

In seltenen Fällen kann AtrosanMed Schwindel und Schläfrigkeit verursachen. Sollte dies auftreten, darf kein Fahrzeug gelenkt bzw. keine Maschine bedient werden.

### **AtrosanMed Filmdoublets enthält Lactose.**

Bitte nehmen Sie AtrosanMed erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. Wie ist AtrosanMed Filmdoublets anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Ältere: Nehmen Sie zweimal pro Tag je 1 Tablette unmittelbar nach der Mahlzeit ein.

Die Dosis kann auf 2 Tabletten zweimal pro Tag erhöht werden, wenn nach 3 bis 5 Tagen keine Besserung eintritt.

Nur zur oralen Einnahme.

Nicht mehr als die verschriebene Dosis anwenden.

## **Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre**

Nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre.

### **Wenn Sie eine größere Menge von AtrosanMed Filmdoublets angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie zu viel AtrosanMed Filmdoublets verwendet haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum **(070/245.245)** in Verbindung.

Im Allgemeinen sind keine Nebenwirkungen zu erwarten, wenn Sie mehr als die verschriebene Dosis von AtrosanMed eingenommen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von AtrosanMed Filmdoublets vergessen haben**

Wenn Sie die Einnahme der Doublets vergessen haben, nehmen Sie keine zusätzlichen Doublets, sondern nehmen Sie die nächstfolgende Dosis zum üblichen Zeitpunkt ein.

### **Wenn Sie die Anwendung von AtrosanMed Filmdoublets abbrechen**

Nach dem Abbrechen der Anwendung ist nicht mit Auswirkungen zu rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende leichte Nebenwirkungen können bei der Anwendung dieses Arzneimittels auftreten:

Magen-Darm-Beschwerden:

- Magenbeschwerden,
- Krankheitsgefühl,
- Verdauungsprobleme wie Übelkeit oder Durchfall.

Andere Nebenwirkungen:

- Hautausschlag ,
- Juckreiz,
- Kopfschmerzen,
- Schwindel.

Brechen Sie die Einnahme ab, wenn diese Symptome Ihnen Beschwerden bereiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

B-1000 Brussel Madou

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist AtrosanMed Filmtabletten aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was AtrosanMed Filmtabletten enthält**

- Der Wirkstoff ist das Extrakt der Wurzeln des Harpagophytum procumbens (Teufelskralle). Eine Filmtablette enthält 480 mg Extrakt (als ethanolisches Trockenextrakt) der Wurzeln der Teufelskralle (Harpagophytum procumbens D.C. und/oder H. zeyheri L. Decne) (1,5-3,0:1). Auszugsmittel: Ethanol 60%V/V.
- Die sonstige Bestandteile sind: Laktose, Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, gereinigtes Wasser, Silicium, kolloidales Silicium und Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs). Der Überzug der Tablette besteht aus Talk, Titandioxid, Macrogol und Hypromellose.

### **Wie AtrosanMed Filmtabletten aussieht und Inhalt der Packung**

AtrosanMed sind ovale, weiß überzogene Filmtabletten.

Die Tabletten sind verpackt in Glasfläschchen zu 30, 60 oder 120 Tabletten.

Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen auf den Markt gebracht.

### **Registrierungsinhaber und Hersteller**

#### Registrierungsinhaber

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54 bus 7  
B-3560 Lummen

#### Hersteller

A.Vogel B.V.  
P.O. Box 33  
NL 8080 AA Elburg  
Die Niederlande

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung:

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54 bus 7  
B-3560 Lummen  
Tel: 013 35 89 40  
E-Mail: [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be)

### **Art der Abgabe**

Apothekenpflichtig.

**Zulassungsnummer**

BE-TU488000

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im Mai 2021.**