

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Mobilat 20 mg/g + 2 mg/g Creme Mobilat 20 mg/g + 2 mg/g Gel

Salicylsäure
Mucopolysaccharidpolysulfat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Mobilat Creme / Mobilat Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Mobilat Creme / Mobilat Gel beachten?
3. Wie ist Mobilat Creme / Mobilat Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Mobilat Creme / Mobilat Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Mobilat Creme / Mobilat Gel und wofür wird es angewendet?

Mobilat Creme / Mobilat Gel ist eine Kombination zweier Wirkstoffe: Salicylsäure und Mucopolysaccharidpolysulfat. Es ist zum Auftragen auf die Haut bestimmt.

Mobilat Creme / Mobilat Gel wird zur Behandlung der Schmerzsymptome bei Verletzungen der Muskeln und Gelenke (Verstauchung und Zerrung) empfohlen.

Die entsprechende medizinische Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung (Verstauchung und Zerrung) muss jedoch gesichert sein.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Mobilat Creme / Mobilat Gel beachten?

Mobilat Creme / Mobilat Gel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Salicylsäure, gegen Mucopolysaccharidpolysulfat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie bereits Atemprobleme hatten, nachdem Sie entzündungshemmende Arzneimittel eingenommen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie Mobilat Creme / Mobilat Gel anwenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Mobilat Creme / Mobilat Gel anwenden.

- Sie dürfen Mobilat Creme / Mobilat Gel nicht auf verletzter oder gereizter Haut oder auf der Schleimhaut anwenden (Risiko verstärkter Aufnahme der Wirkstoffe ins Blut und Reizung aufgrund der Anwesenheit von Alkohol).
- Bei Kontakt mit verletzter oder gereizter Haut oder mit Schleimhaut oder bei Schmerzgefühl nach der Anwendung: spülen Sie reichlich mit Wasser und, wenn die Symptome nicht abklingen, wenden Sie sich an einen Arzt.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn einer der obengenannten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit auf Sie zugefallen hat.

Kinder und Jugendliche

Mobilat Creme / Mobilat Gel darf bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden, da zur Sicherung und zur Wirkung in dieser Altersgruppe keine Angaben vorliegen.

Anwendung von Mobilat Creme / Mobilat Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

- Wenn eine Erhaltungsbehandlung mit Antirheumatika oder Analgetika absolviert wird, müssen Sie den Arzt stets daran erinnern.
- Sie dürfen niemals mehrere ähnliche Arzneimittel zugleich anwenden, ohne mit dem Arzt zu sprechen.

Einfluss von Mobilat Creme / Mobilat Gel auf andere Arzneimittel

Nach der Anwendung bewirkt die Salicylsäure in Mobilat Creme / Mobilat Gel, dass andere Arzneimittel, die an der gleichen Stelle angewendet werden, stärker durch die Haut aufgenommen werden. Bei Anwendung über längere Zeit oder auf großen Hautflächen können die Nebenwirkungen von Methotrexat (Arzneimittel zur Anwendung nach Anweisung des Arztes) und die Wirkung bestimmter Arzneimittel zur Behandlung von Diabetes (Sulfonylharnstoffe zur Senkung des Blutzuckerspiegels) verstärkt werden.

Anwendung von Mobilat Creme / Mobilat Gel zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht zutreffend

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie dürfen Mobilat Creme / Mobilat Gel während des ersten Trimenons der Schwangerschaft und am Ende der Schwangerschaft nicht anwenden. Während des zweiten Trimenons der Schwangerschaft darf Mobilat Creme / Mobilat Gel nicht auf großen Hautflächen angewendet werden. Wenden Sie sich vor der Anwendung stets an Ihren Arzt.

Sie dürfen Mobilat Creme / Mobilat Gel während der Stillzeit nicht anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend

Mobilat Creme enthält Cetylstearylalkohol und Wollwachs

Cetylstearylalkohol und Wollwachs können örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist Mobilat Creme / Mobilat Gel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Wenn nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich erneut an Ihren Arzt.

Wie wird Mobilat Creme / Mobilat Gel angewendet?

Tragen Sie Mobilat Creme oder Gel auf die betroffenen Zonen auf und lassen Sie die Creme (nicht das Gel) durch eine sanfte Massage in die Haut eindringen.

In welcher Menge und wie oft wird Mobilat Creme / Mobilat Gel aufgetragen?

Ein- bis zweimal täglich anwenden. Je nach dem Umfang der betroffenen Zone tragen Sie einen 5 bis 15 cm langen Strang von Creme oder Gel auf.

Zur Anwendung unter einem Verband ist nur die Creme geeignet. Das Gel kann nicht unter einem Verband angewendet werden.

Patienten mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen:

Sie dürfen Mobilat Creme / Mobilat Gel ohne Rücksprache mit einem Arzt nicht auf großen Flächen und nicht länger als eine Woche anwenden.

Ältere Personen:

Die Dosis muss nicht geändert werden.

Wie lange muss Mobilat Creme / Mobilat Gel angewendet werden?

Sie dürfen Mobilat Creme / Mobilat Gel ohne Rücksprache mit einem Arzt nicht länger als 1 Woche anwenden. Wenn die Symptome anhalten, dürfen Sie die Behandlung erst nach einer ärztlichen Untersuchung und mit Zustimmung des Arztes fortsetzen. Die Gesamtdauer der Behandlung darf 2 Wochen nicht überschreiten.

Wenn Sie eine größere Menge von Mobilat Creme / Mobilat Gel angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Mobilat Creme / Mobilat Gel angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Die langfristige Anwendung von Mobilat Creme / Mobilat Gel in zu großen Mengen oder auf einer zu großen Fläche kann die Aufnahme der Wirkstoffe ins Blut verstärken und könnte zu allgemeinen unerwünschten Wirkungen sowie zu allergischen Symptomen wie Reizung, Rötung und Ekzem führen.

In diesem Fall unterbrechen Sie die Behandlung, spülen die behandelte Fläche reichlich mit Wasser und fragen Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie die Anwendung von Mobilat Creme / Mobilat Gel vergessen haben

Setzen Sie die Anwendung bei Bedarf normal fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In diesem Abschnitt sind die Häufigkeiten der Nebenwirkungen wie folgt definiert: sehr häufig ($\geq 1/10$); häufig ($\geq 1/100$, $< 1/10$); gelegentlich ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$); selten ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$); sehr selten ($< 1/10.000$); nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Gelegentlich:

- lokale Reizungen der Haut

Sehr selten:

- Kontaktallergien

In diesem Fall brechen Sie die Behandlung ab, spülen Sie die behandelte Fläche reichlich mit Wasser und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über: **Belgien:** Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – Abteilung Vigilanz – Postfach 97 – B-1000 Brüssel Madou – oder über die Website: www.fagg-afmps.be. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Mobilat Creme / Mobilat Gel aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Mobilat Creme: Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Mobilat Gel: Nicht über 30 °C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Mobilat Creme / Mobilat Gel enthält

Mobilat Creme:

- Die Wirkstoffe sind: Salicylsäure (20 mg pro Gramm Creme) und Mucopolysaccharidpolysulfat (2 mg pro Gramm Creme).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Glycerin (85 %), Stearinsäure, Wollwachsalkoholsalbe, Myristylalkohol, Cetylstearylalkohol, emulgierend (Typ A), Ethanolamin, Isopropylalkohol, Thymol, gereinigtes Wasser.

Mobilat Gel:

- Die Wirkstoffe sind: Salicylsäure (20 mg pro Gramm Gel) und Mucopolysaccharidpolysulfat (2 mg pro Gramm Gel).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Dinatriumedetat, Rosmarinöl, Ethanolamin, Carbomer, Macrogol-20-Glycerin-Monooleat, Isopropylalkohol, gereinigtes Wasser.

Siehe Abschnitt 2 ‘Mobilat Creme enthält Cetylstearylalkohol und Wollwachs’ für weitere Informationen.

Wie Mobilat Creme / Mobilat Gel aussieht und Inhalt der Packung

Mobilat Creme: Weiße, glänzende und homogene Creme mit charakteristischem Geruch.

Mobilat Gel: Durchsichtiges, farbloses oder leicht braunes und homogenes Gel mit charakteristischem Geruch.

Tuben von 50 g und 100 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

EG (Eurogenerics) NV - Heizel Esplanade b22 – 1020 Brüssel

Hersteller

Mobilat Produktions GmbH – Luitpoldstraße 1 – 85276 Pfaffenhofen – Deutschland

Stada Arzneimittel AG – Stadastraße 2-18 – 61118 Bad Vilbel – Deutschland

Zulassungsnummern:

Mobilat Creme: BE483093

Mobilat Gel: BE483102

Abgabeform: freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt/überarbeitet im 07/2020.