

Bijsluiter: informatie voor de patiënt
2LHERP globuli in capsules om te openen

Ribonucleïnezuur: 8-10CH; Desoxyribonucleïnezuur: 8-10CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-HER1: 10-18CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-HER2: 10-18CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAI: 10-18CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAI: 10-18CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is 2LHERP en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is 2LHERP en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?

2LHERP is een homeopathisch geneesmiddel dat ingrediënten bevat die traditioneel in de micro-immunotherapie worden gebruikt, als adjuvans voor de immuunrespons bij de behandeling van herpesinfecties.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast 2LHERP nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Er is tot op heden geen interactie met andere geneesmiddelen bekend.

Vermijd elk geneesmiddel op basis van munt in het uur vóór de inname van dit middel.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is raadzaam om de inname van munt evenals opwekkende producten (koffie, chocolade) te vermijden in het uur vóór de sublinguale inname.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

2LHERP heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen.

2LHERP bevat sacharose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.


3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Afhankelijk van het medisch voorschrift is de aanbevolen dosering één capsule per dag, waarbij de nummering van de capsules altijd gevolgd moet worden. De behandelingsduur is 4 tot 6 maanden.

De globuli moeten nuchter worden ingenomen, 15 tot 30 minuten voor de maaltijd. Bij het vergeten van een dosering of bij herhaalde toediening de inhoud van de capsule een uur na de maaltijd innemen.


Slik de capsule niet in zijn geheel in. Lees aandachtig de instructies:




1. Neem een van de drie blisterverpakkingen uit de doos



2. Neem een capsule volgens de nummering



3. Open de capsule voorzichtig door de top op te heffen (*)



4. Giet de inhoud van de capsule onder de tong en laat smelten

Bij de volgende inname volgt u de numerieke volgorde van de capsules op de blisterverpakking (2, 3,...). Op het einde van de eerste blisterverpakking gaat u voort met capsule 1 van de volgende blisterverpakking, en zo gaat u door tot de doos leeg is.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Volgens de principes van homeopathie is het effect verbonden met de verdunning en niet met de dosering. Als u meer 2LHERP heeft ingenomen dan de aanbevolen dosis het effect mag niet sterker zijn.

Wanneer u teveel van 2LHERP heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u zich vergist in de volgorde van inname van de capsules, of als u een capsule bent vergeten, ga dan voort vanaf de laatste capsule die u hebt ingenomen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

In uitzonderlijke gevallen kan dyspepsie (problemen met de spijsvertering) voorkomen bij inname

op een nuchtere maag. Neem in dat geval de globuli 1 uur na de maaltijd.

Bij inname na 16 u. kunnen slaapproblemen optreden. Zoals bij alle homeopathische behandelingen kunt u de indruk hebben dat de symptomen verergeren. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen. Als dit gevoel blijft aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

Prat met uw apotheker of arts als u nog andere reacties ervaart.

Stop de behandeling niet zonder uw arts te raadplegen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C, ter bescherming tegen licht en vocht.

Houdbaarheid: 3 jaar

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn

Elke opeenvolging van 5 capsules bevat:

Ribonucleïnezuur (RNA):	8-10CH
Desoxyribonucleïnezuur (DNA):	8-10CH
Specifiek nucleïnezuur SNA-HER1:	10-18CH
Specifiek nucleïnezuur SNA-HER2:	10-18CH
Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAI:	10-18CH
Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAI:	10-18CH

- De andere stoffen in dit medicijn zijn:

Globuli: sacharose

Capsules: gelatine, blauwe kleurstof (volgens capsule): E151 Brilljantzwart BN, E172 zwart ijzeroxide, E132 indigokarmijn, contrastmiddel: E171 titaandioxide.

Hoe ziet 2LHERP eruit en wat zit er in een verpakking?

2LHERP wordt aangeboden in de vorm van geïmpregneerde globuli

Wijze van toediening: sublinguaal gebruik

Doos met 30 capsules

Het globuli wordt verpakt in gelatine capsules zoals vermeld in punt 3.

Deze capsules mogen niet worden ingeslikt.

De capsules worden verpakt in Al/PVC-blisterverpakkingen van 10 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

LABO'LIFE BELGIUM, BV. Aut 1507 H

Av. d'Ecolys 2 bte 36

5020 Namur, BELGIË

Tel (32) (0)81 40 87 81 - Fax (32) (0)81 40 87 89

Fabrikant:

LABO'LIFE ESPAÑA, S.A. No Reg.3.279 E

Av. des Raiguer 7

07330 Consell, SPANJE

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

België: HO-BE520542

Groothertogdom Luxemburg: 2018060135

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2024.