
Notice : information de l'utilisateur

Urocystil comprimés pelliculés

Extrait de busserole

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 4 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Urocystil comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Urocystil comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre Urocystil comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Urocystil comprimés pelliculés ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Urocystil comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?

Urocystil est un médicament traditionnel à base de plantes contenant de l'extrait de busserole.

Urocystil est utilisé chez les femmes adultes pour soulager les symptômes d'infection urinaire légère, tels que la sensation de brûlure en urinant, ainsi que le besoin pressant et répété d'uriner après qu'un médecin ait exclu toute pathologie grave. Son utilisation est réservée aux indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Urocystil comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais Urocystil :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous souffrez d'une maladie des reins.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Urocystil.
 - Urocystil n'est pas recommandé chez les hommes, sauf avis médical.
 - Si les symptômes s'aggravent ou en cas d'apparition de symptômes tels que de la fièvre, de la difficulté à uriner, des spasmes douloureux ou la présence de sang dans les urines, consultez immédiatement votre médecin traitant ou votre pharmacien.
-

-
- Lors de l'utilisation de Urocystil, vous pourriez constater une coloration brun-vert de vos urines. Il s'agit d'un phénomène normal, dû à l'un des composants contenus dans Urocystil.

Enfants et adolescents

Urocystil n'est pas recommandé chez les enfants et les jeunes gens de moins de 18 ans, en raison d'un manque de données sur la sécurité et l'efficacité.

Autres médicaments et Urocystil

Aucun signalé. Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Urocystil avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Pas de données disponibles.

La sécurité d'emploi pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.

En l'absence de données suffisantes, l'emploi de ce médicament est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Pas de données disponibles.

3. Comment prendre Urocystil comprimés pelliculés ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée chez les femmes adultes est de 2 comprimés 3 fois par jour.
Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine, sauf avis médical.

En cas de persistance des symptômes après 4 jours de traitement durant l'utilisation de Urocystil, informez votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Urocystil que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Urocystil, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Il n'y a pas eu de cas de surdosage décrit.

Si vous oubliez de prendre Urocystil

Prenez les comprimés dès que vous vous apercevez de l'omission, sauf s'il est presque l'heure de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Urocystil

Si vous arrêtez le traitement par Urocystil plus tôt que prévu, cela ne devrait pas provoquer l'apparition d'effets indésirables. Toutefois, les symptômes qui vous ont conduit à prendre Urocystil pourraient réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Urocystil peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des cas de nausées, vomissements et douleurs gastriques ont été signalés. La fréquence est indéterminée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé • www.afmmps.be

Division Vigilance :

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be • e-mail: adr@fagg-afmmps.be

Luxembourg :

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Urocystil comprimés pelliculés ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage extérieur après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver dans l'emballage d'origine.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Urocystil

La substance active est l'extrait sec de feuille de busserole. Chaque comprimé contient 400 mg d'extrait sec de *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., folium (feuille de busserole) (3,5-5,5:1), équivalent à 64-96 mg d'arbutine.

Solvant d'extraction : Ethanol 60 % V/V.

Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, talc, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage du comprimé : alcool polyvinylique, talc, macrogol, dioxyde de titane (E171).

Aspect de Urocystil et contenu de l'emballage extérieur

Urocystil se présente sous forme de comprimés pelliculés de teinte blanche, de forme oblongue et biconvexe.

Urocystil est disponible en emballages de 42 comprimés.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Tilman, Zone d'Activités Sud 15, 5377 Somme-Leuze, Belgique

Numéros de l'enregistrement

BE : BE-TU483111

LU : 2016040107

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 03/2026
