

---

## **Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker**

### **Urocystil filmomhulde tabletten**

Berendruifblad extract

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Urocystil filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Urocystil filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Urocystil is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat berendruif-extract bevat.

Urocystil wordt bij volwassen vrouwen gebruikt om de symptomen van een milde urineweginfectie te verlichten, zoals een branderig gevoel bij het urineren en de herhaalde aandrang om te urineren nadat een arts ernstige pathologie heeft uitgesloten. Het gebruik ervan is beperkt tot de gespecificeerde indicaties op basis van langdurig gebruik.

#### **2. Wanneer mag u Urocystil filmomhulde tabletten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u Urocystil niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u een nierziekte heeft.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Urocystil?**

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
  - Urocystil wordt niet aanbevolen voor mannen, tenzij op medisch advies.
  - Als de symptomen verergeren of als u symptomen ontwikkelt zoals koorts, moeite met urineren, pijnlijke krampen of bloed in de urine, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.
  - Bij het gebruik van Urocystil kan uw urine een groenbruine kleur krijgen. Dit is een normaal verschijnsel dat door één van de ingrediënten van Urocystil veroorzaakt wordt.
-

---

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Urocystil wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, vanwege een gebrek aan gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Geen gemeld. Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd.

Neemt u naast Urocystil nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Niet van toepassing.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Geen gegevens beschikbaar.

De veiligheid voor gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet vastgesteld.

Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden tijdens zwangerschap en borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Geen gegevens beschikbaar.

## **3. Hoe neemt u Urocystil filmomhulde tabletten in?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis voor volwassen vrouwen is 2 tabletten 3 maal per dag.

De tabletten dienen met een groot glas water te worden ingenomen.

De duur van de behandeling mag niet meer zijn dan één week, tenzij medisch advies.

Als de symptomen aanhouden na 4 dagen behandeling tijdens het gebruik van Urocystil, informeer dan uw arts of apotheker.

### **Heeft u te veel van Urocystil gebruikt?**

Wanneer u teveel van Urocystil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Er zijn geen gevallen van overdosering beschreven.

### **Bent u vergeten Urocystil in te nemen?**

Neem de tabletten in zodra u het verzuim merkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van Urocystil**

Als u voortijdig stopt met Urocystil, zou dit geen bijwerkingen moeten veroorzaken. Echter, de symptomen waarvoor u Urocystil nam kunnen evenwel terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

---

---

Er zijn gevallen van misselijkheid, braken en buikpijn gemeld.  
De frequentie is onbekend.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten • [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie :

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be) • e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u Urocystil filmomhulde tabletten?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na « EXP ». Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in Urocystil?**

De werkzame stof in dit middel is berendruifblad droogextract. Iedere tablet bevat 400 mg droogextract van *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., folium (berendruifblad) (3,5-5,5:1), overeenkomend met 64-96 mg arbutine.

Extractiemiddel: ethanol 60 % V/V.

De andere stoffen in dit middel zijn:

*Kern van de tablet:* microkristallijne cellulose, gepregelatineerd zetmeel, talk, colloïdaal anhydrisch silicium, magnesiumstearaat.

*Filmomhulling:* polyvinylalcohol, talk, macrogol, titanium dioxide (E171).

### **Hoe ziet Urocystil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Witte, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten.

Urocystil is beschikbaar in dozen van 42 tabletten.

### **Houder van de registratie en fabrikant**

Tilman, Zone d'Activités Sud 15, 5377 Somme-Leuze, België

### **Nummers van de registratie**

---

---

BE : BE-TU483111  
LU : 2016040107

**Afleveringswijze**

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in : 03/2026**