

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Nicorette® Fruit 2 mg Lutschtabletten, gepresst
Nicorette® Fruit 4 mg Lutschtabletten, gepresst

Nikotin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie nach 9 Monaten immer noch Schwierigkeiten haben, ohne die Hilfe von Nicorette Fruit nicht zu rauchen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Nicorette Fruit und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nicorette Fruit beachten?
3. Wie ist Nicorette Fruit anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nicorette Fruit aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Nicorette Fruit und wofür wird es angewendet?

Dieses Arzneimittel wird angewendet, um Entzugserscheinungen zu lindern und das Verlangen nach Nikotin zu reduzieren, unter dem Sie leiden, wenn Sie versuchen mit dem Rauchen aufzuhören oder wenn Sie die Anzahl der Zigaretten reduzieren, während Sie versuchen mit dem Rauchen aufzuhören. Diese Behandlung ist erwachsenen Rauchern ab 18 Jahren und älter vorbehalten.

Nicorette Fruit 2 mg Lutschtabletten eignen sich für Raucher mit geringer Nikotinabhängigkeit, z.B. solche die ihre erste Zigarette des Tages mehr als 30 Minuten nach dem Wachwerden oder 20 Zigaretten oder weniger täglich rauchen.

Nicorette Fruit 4 mg Lutschtabletten eignen sich für Raucher mit hoher Nikotinabhängigkeit, z.B. solche die ihre erste Zigarette des Tages innerhalb von 30 Minuten nach dem Wachwerden oder mehr als 20 Zigaretten täglich rauchen.

Dieses Arzneimittel kann Ihnen helfen, sofort mit dem Rauchen aufzuhören oder das Rauchen zu verringern, bevor Sie vollständig damit aufhören. Wenn Sie denken, dass Sie sofort mit dem Rauchen aufhören können, dann tun Sie es. Wenn Sie jedoch denken, dass dies ein zu großer Schritt ist, möchten Sie vielleicht als ersten Schritt die Anzahl der Zigaretten, die Sie rauchen, reduzieren, bevor Sie komplett damit aufhören. Siehe Abschnitt 3 'Wie ist Nicorette Fruit anzuwenden?' für weitere Einzelheiten.

Nicorette Fruit lindert die Nikotinentzugserscheinungen, einschließlich dem Verlangen nach Nikotin, unter denen Sie leiden, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Wenn Ihr Körper plötzlich kein Nikotin aus dem Tabak mehr erhält, leiden Sie an unangenehmen Gefühlen, die Entzugserscheinungen genannt werden, wie Reizbarkeit, einem Gefühl von Ärger oder Niedergeschlagenheit, Angst, Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitsteigerung oder Gewichtszunahme, Verlangen nach Rauchen, Wachwerden während der Nacht oder Schlafstörungen. Durch die Anwendung von Nikotin in Nicorette Fruit können Sie diesen unangenehmen Beschwerden vorbeugen bzw. sie lindern ebenso das Verlangen nach Nikotin.

Suchen Sie immer Rat und Unterstützung, damit Ihnen beim Absetzen vom Rauchen geholfen werden kann.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nicorette Fruit beachten?

Nicorette Fruit darf nicht angewendet werden

- Wenn Sie **allergisch** gegen Nikotin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Wenn Sie jünger als 12 Jahre sind.
- Wenn Sie niemals geraucht haben.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Nicorette Fruit anwenden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie an folgenden Erkrankungen leiden. Sie können Nicorette Fruit Lutschtabletten vielleicht anwenden, aber Sie müssen dies zuerst mit Ihrem Arzt besprechen, wenn Sie:

- vor kurzem einen **Herzanfall** oder **Schlaganfall** hatten
- an **Schmerzen in der Brust** (instabiler Angina pectoris) oder an einer ruhenden Angina pectoris leiden
- an einer **Herzerkrankung** leiden, die Herzfrequenz oder Herzrhythmus (Herzrhythmusstörung) beeinträchtigt
- an **Bluthochdruck** leiden, der nicht medikamentös kontrolliert wird
- jemals **allergische Reaktionen** hatten, einschließlich einer Schwellung von Lippen, Gesicht und Rachen (Angioödem) oder juckendem Hautausschlag (Nesselsucht). Die Anwendung einer Nikotin-Substitutionstherapie (NRT) kann manchmal diese Art von Reaktionen auslösen.
- an einer schweren oder moderaten **Lebererkrankung** leiden
- an einer schweren **Nierenerkrankung** leiden
- **Diabetes** haben
- eine hyperaktive **Schilddrüse** haben
- einen Tumor der **Nebennierendrüse** (Phäochromozytom) haben
- einen **Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür** haben
- an **Ösophagitis** leiden.
- **Epilepsie** oder **Krampfanfälle** in der Vorgeschichte haben

Dieses Arzneimittel darf von Nichtrauchern nicht angewendet werden.

Lutschtabletten können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bitte vorsichtig verwenden, wenn Sie Schwierigkeiten beim Schlucken von festen oder flüssigen Nahrungsmitteln haben oder wenn Sie während oder nach dem Schlucken häufig husten.

Kinder

Die korrekte Dosis für Erwachsene könnte für Kinder stark giftig oder sogar tödlich sein. Daher ist es unerlässlich, Nicorette Fruit Lutschtabletten für Kinder stets unerreichbar aufzubewahren.

Anwendung von Nicorette Fruit zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Folgendes enthalten:

- **Theophyllin** zur Behandlung von Asthma
- **Tacrin** bei Alzheimer-Krankheit
- **Clozapin** bei Schizophrenie
- **Ropinirol** zur Behandlung der Parkinson-Krankheit

Anwendung von Nicorette Fruit zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bei der Anwendung der Lutschtabletten dürfen Sie weder essen noch trinken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es ist sehr wichtig, während der Schwangerschaft mit dem Rauchen aufzuhören, denn durch das Rauchen kann Ihr Baby weniger gut wachsen. Rauchen kann auch zu Frühgeburten oder Totgeburten führen. Es ist am besten, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören können, ohne auf nikotinhaltige Arzneimittel zurückgreifen zu müssen. Wenn Sie das nicht schaffen, sollten Sie Nicorette Fruit erst anwenden, nachdem Sie mit dem Angehörigen der Gesundheitsberufe, der Ihre Schwangerschaft betreut, Ihrem Hausarzt oder einem Arzt in einem Zentrum gesprochen haben, das darauf spezialisiert ist, Menschen dabei zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören..

Nicorette Fruit sollte in der Stillzeit vermieden werden, da Nikotin in die Muttermilch übergeht und Ihrem Kind schaden kann. Wenn Ihnen Ihr Arzt Nicorette Fruit empfohlen hat, sollten Sie die Lutschtablette unmittelbar nach dem Stillen und nicht während der 2 Stunden vor dem Stillen anwenden.

Rauchen erhöht das Risiko auf Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern. Die Wirkungen von Nikotin auf die Fruchtbarkeit sind nicht bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beobachtet.

Nicorette Fruit enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Lutschtablette, d.h. es ist nahezu ‚natriumfrei‘. Das Aroma in diesem Arzneimittel enthält auch eine geringe Menge Sulfite, das in seltenen Fällen schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und Bronchialkrämpfe (Bronchospasmen) kann hervorrufen. Nicorette Fruit enthält Polysorbat das allergische Reaktionen kann hervorrufen.

3. Wie ist Nicorette Fruit anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die Anweisungen zur Anwendung von Nicorette Fruit hängen davon ab, ob Sie:

- (a) sofort mit dem Rauchen aufhören
- (b) schrittweise mit dem Rauchen aufhören

Erwachsene (18 Jahre und mehr)

(a) Sofortiges Aufhören mit dem Rauchen

Die Idee ist, sofort mit dem Rauchen aufzuhören und die Lutschtabletten anzuwenden, um das Verlangen nach dem Rauchen zu stoppen.

- Beginnen Sie mit der Anwendung von 8 bis 12 Lutschtabletten täglich. Sobald Sie ein Rauchverlangen verspüren, legen Sie eine Lutschtablette im Mund und lassen Sie sie schmelzen.
- Wenden Sie die Lutschtabletten wie oben erklärt bis zu 6 Wochen an, dann reduzieren Sie schrittweise die Anzahl der Lutschtabletten, die Sie täglich anwenden.
- Sobald Sie nur noch 1 bis 2 Lutschtabletten täglich anwenden, hören Sie mit der Anwendung komplett auf. Auch nachdem Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, kann es vorkommen, dass Sie plötzlich Verlangen nach einer Zigarette haben. Sie können erneut eine Lutschtablette anwenden, wenn dies auftritt.

(b) Schrittweises Aufhören mit dem Rauchen

Die Idee ist, einige Ihrer Zigaretten schrittweise durch die Lutschtabletten zu ersetzen. Wenn Sie das geschafft haben, geben Sie die Zigaretten vollständig auf, indem Sie dafür die Lutschtabletten anwenden. Schließlich hören Sie auch mit der Anwendung der Lutschtabletten auf.

Wenn Sie ein starkes Rauchverlangen verspüren, nehmen Sie eine Lutschtablette Nicorette Fruit statt einer Zigarette, um dieses Verlangen zu befriedigen. Reduzieren Sie die Anzahl der täglichen Zigaretten so weit wie möglich. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie nach 6 Wochen nicht geschafft haben, die Anzahl der Zigaretten, die Sie täglich rauchen, zu reduzieren. Sie sollten die Zigaretten komplett aufgeben, sobald Sie es können. Befolgen Sie die o.g. Anweisungen zum sofortigen Aufhören mit dem Rauchen. Machen Sie das so früh wie möglich. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Ihr Versuch, komplett mit dem Rauchen aufzuhören, 6 Monate nachdem Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittel angefangen haben, nicht erfolgreich war.

Vorgeschriebene Dosis nicht überschreiten. Anweisungen sorgfältig befolgen und **nicht mehr als 15 Lutschtabletten** täglich (24 Stunden) **anwenden**.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Anwendung dieses Arzneimittel länger als insgesamt 9 Monate brauchen.

Kinder und Jugendliche

Jugendliche von 12 bis 17 Jahren


Nicorette Fruit darf nur nach Empfehlung durch medizinisches Fachpersonal angewendet werden.

Kinder unter 12 Jahren

Dieses Arzneimittel darf durch Kinder unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Gebrauchsanweisung

[In case of the plastic bottle]



[In case of the cardboard box]



Zum öffnen:

1. Drücken Sie vorsichtig die Lasche oben auf der "Drücken Sie hier" steht
2. Ziehen Sie gleichzeitig den Deckel der Kartonschachtel kräftig nach oben

Zum schließen: Drücken Sie den Deckel der Verpackung ein.

[Note: The leaflet for the carton will only be printed with the instructions relevant to open the carton. The leaflet for the plastic bottles will only be printed with the instructions relevant to open the plastic bottle.]

Dieses Arzneimittel ist zur Anwendung in der Mundhöhle bestimmt, wird in den Mund gelegt, wo es sich auflöst und Nikotin freisetzt, das über die Mundschleimhaut vom Körper absorbiert wird.

Legen Sie eine Lutschtablette in Ihren Mund und bewegen Sie sie ab und zu von einer zur anderen Seite im Mund, bis sie vollständig aufgelöst ist. Dies sollte normalerweise weniger als 20 Minuten dauern. Lutschtablette nicht kauen oder als Ganzes schlucken. Sie sollten nicht essen oder trinken, während Sie eine Lutschtablette im Mund haben.

Wenn Sie versucht sind, wieder zu rauchen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie

- sich sorgen, dass Sie wieder mit dem Rauchen anfangen könnten
- es schwierig finden, vollständig mit der Anwendung der Lutschtabletten aufzuhören.

Wenn Sie wieder mit dem Rauchen anfangen wollen, werden diese Ihnen helfen, zu den besten Ergebnissen bei der Weiterführung der Nikotin-Substitutionstherapie (NRT) zu kommen.

Wenn Sie eine größere Menge von Nicorette Fruit angewendet haben, als Sie sollten

Eine Nikotin-Überdosis kann auftreten, wenn Sie gleichzeitig rauchen und Nicorette Fruit anwenden.

Wenn Sie eine größere Menge von Nicorette Fruit haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Setzen Sie sich **sofort** in Verbindung mit einem Arzt oder der nächsten Notaufnahme, wenn ein Kind dieses Arzneimittel eingenommen hat oder wenn Sie mehr Nicorette Fruit eingenommen haben als Sie sollten.

Nikotin-Dosen, die von erwachsenen Rauchern während der Behandlung vertragen werden, können bei **Kindern** schwere Vergiftungssymptome bis hin zum **Tod** verursachen.

Die Symptome einer Überdosis sind Übelkeit, Erbrechen, übermäßiger Speichelfluss, Magenschmerzen, Durchfall, Schwitzen, Kopfschmerzen, Schwindel, verändertes Hörvermögen und ausgesprochenes Schwächegefühl. In hohen Dosen können auf diese Symptome niedriger Blutdruck, schwacher und unregelmäßiger Puls, Atembeschwerden, extreme Müdigkeit, Kreislaufkollaps und allgemeine Konvulsionen folgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wirkungen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören (Nikotinentzug)

Einige der unerwünschten Wirkungen, die Sie feststellen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, können Entzugserscheinungen aufgrund der verminderten Nikotinaufnahme sein. Dazu gehören:

- Reizbarkeit, Aggression, Ungeduld oder Frustration
- Angstgefühl, Ruhelosigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten
- Nächtliches Aufwachen oder Schlafstörungen
- Gesteigerter Appetit oder Gewichtszunahme
- Niedergeschlagenheit
- Drang zu rauchen
- Senkung der Herzfrequenz
- Zahnfleischbluten oder Mundgeschwüre
- Schwindel oder Benommenheit
- Husten, Halsschmerzen, verstopfte oder laufende Nase
- Verstopfung

Wenn Sie eine der folgenden schweren Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Anwendung von Nicorette Fruit ab und setzen Sie sich sofort in Verbindung mit einem Arzt, denn diese könnten

Anzeichen einer schweren Allergie sein (Häufigkeit nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Quaddeln (Hautzustand, der durch juckende erhöhte oder rote Flecken charakterisiert ist)
- Schwellung von Gesicht, Zunge oder Rachen
- Atemschwierigkeiten
- Schluckschwierigkeiten

Die meisten Nebenwirkungen treten am Anfang der Behandlung auf. Während den ersten Tagen der Behandlung können Reizungen in Mund und Rachen auftreten; bei der Weiteranwendung gewöhnen sich die meisten Anwender jedoch daran.

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Personen betreffen:

- Husten
- Kopfschmerzen
- Schluckauf
- Übelkeit
- Reizung von Rachen, Mund oder Zunge

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Personen betreffen:

- Lokale Wirkungen wie brennendes Gefühl, Entzündung im Mund, veränderte Geschmacksempfindung
- Kältegefühl, Wärmegefühl, Kribbeln auf der Haut
- Mundtrockenheit oder übermäßiger Speichelfluss
- Verdauungsstörung
- Schmerzen oder Beschwerden im Bauch (Abdomen)
- Erbrechen, Blähungen oder Durchfall
- Sodbrennen
- Müdigkeit
- Überempfindlichkeit (Allergie)

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen:

- Wirkungen auf die Nase, wie verstopfte Nase, Niesen
- Pfeifende Atmung (Bronchospasmus) oder das Gefühl, dass das Atmen anstrengender ist als normal (Dyspnoe), Beklemmung im Rachen
- Hautrötung oder vermehrtes Schwitzen
- Wirkungen im Mund, wie Prickeln im Mund, Entzündung der Zunge, Mundgeschwüre, Schädigung der Mundschleimhaut oder Veränderungen Ihrer Stimme, Schmerzen in Mund und Rachen, Aufstoßen
- Herzklopfen, erhöhte Herzfrequenz, Hypertonie
- Schneller und unregelmäßiger Herzschlag, der mit geeigneten Arzneimitteln behandelt werden kann
- Ausschlag und/oder Juckreiz
- Abnormale Träume
- Beschwerden und Schmerzen in der Brust
- Schwäche, Unwohlsein

Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen:

- Schluckbeschwerden, eingeschränkte Empfindung im Mund
- Würgen

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar:

- Verschwommenes Sehen, verstärkter Tränenfluss
- Trockener Rachen, Magenbeschwerden, Schmerzen in den Lippen
- Hautrötung
- Krampfanfälle

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website: www.guichet.lu/pharmakovigilanz

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Nicorette Fruit aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

- Polypropylenbehältnis: in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Kartonschachtel: in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Innerhalb von 3 Monaten nach Entfernen der Umverpackung verbrauchen.

Behältnis nicht für etwas anderes wieder benutzen, denn es könnte sich Lutschtablettenstaub im Behältnis befinden, der sich als feiner Film auf die Sachen legen könnte.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Nicorette Fruit enthält

Der Wirkstoff ist Nikotin. Jede Lutschtablette enthält 2 mg oder 4 mg Nikotin (als Nikotinresinat).

Die sonstigen Bestandteile sind:

- **Kern:** Mannitol (E421), Xanthangummi, Tutti Frutti Aroma (enthält Spuren von Sulfiten), Gummi arabicum (E414), Natriumkarbonat wasserfrei (E500)(i), Sucralose (E955), Acesulfam-Kalium (E950), Magnesiumstearat (E470b);
- **Umhüllung:** Hypromellose (E464), Tutti Frutti Aroma, Titandioxid (E171), Sucralose (E955), mikrokristalline Cellulose (E460), Kaliumaluminiumsilikat (E555), Titandioxid (E171), Acesulfam-Kalium (E950), Polysorbat 80 (E433).

Nicorette Fruit Lutschtabletten sind zuckerfrei.

Wie Nicorette Fruit aussieht und Inhalt der Packung

Ovale, weiße bis gebrochen weiße Lutschtablette mit der Markierung 'n' auf einer Seite und '2' oder '4' auf der anderen Seite. Die Lutschtablette hat die Maße $\pm 14 \times 9 \times 7$ mm.

Packungsgrößen:

Jede Plastikflasche enthält 20 Lutschtabletten. Die Verpackungen können 1, 4 oder 8 Flaschen enthalten.

Jede Kartonschachtel enthält 40 Lutschtabletten. Die Verpackungen können 1, 2 oder 4 Kartonschachteln enthalten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Kenvue Belgium NV

Michel De Braeystraat 52

2000 Antwerpen

Hersteller

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg, Schweden.

Kenvue Belgium NV, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgien

Kenvue Germany GmbH, Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss, Germany (Nur für 2 mg)

Verkaufsabgrenzung

Freie abgabe.

Zulassungsnummern

Nicorette 2 mg Lutschtabletten, gepresst

BE: BE514631 (Plastikflasche)

BE: BE662442 (Kartonschachtel)

LU: 2018010040

Nicorette 4 mg Lutschtabletten, gepresst

BE: BE514640 (Plastikflasche)

BE: BE662443 (Kartonschachtel)

LU: 2018010041

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

BE, DK, FI, DE, IE, LU, PL	Nicorette Fruit
FR	Nicorettefruits
NO	Nicorette
SE	Nicorette Frukt

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 07/2025.

v15.0_B14.0Bis