

Notice : information du patient

Etoricoxib Sandoz 30 mg comprimés pelliculés
Etoricoxib Sandoz 60 mg comprimés pelliculés
Etoricoxib Sandoz 90 mg comprimés pelliculés
Etoricoxib Sandoz 120 mg comprimés pelliculés

étoricoxib

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Etoricoxib Sandoz et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Etoricoxib Sandoz ?
3. Comment prendre Etoricoxib Sandoz ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Etoricoxib Sandoz ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Etoricoxib Sandoz et dans quel cas est-il utilisé ?

Qu'est-ce qu'Etoricoxib Sandoz ?

- Etoricoxib Sandoz contient la substance active étoricoxib. Etoricoxib Sandoz fait partie d'une classe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs de la COX-2. Ils appartiennent à une famille de médicaments appelée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quel cas Etoricoxib Sandoz est-il utilisé ?

- Etoricoxib Sandoz aide à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les personnes âgées de 16 ans et plus atteintes d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.
- Etoricoxib Sandoz est aussi utilisé pour le traitement à court terme de la douleur modérée après une intervention de chirurgie dentaire chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une dégradation progressive du cartilage qui protège les extrémités des os. Celle-ci provoque un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire à long terme des articulations. Elle provoque une douleur, une raideur, un gonflement et une perte progressive du mouvement des articulations qu'elle affecte. Elle peut aussi provoquer une inflammation dans d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie de crises soudaines et récurrentes d'inflammation, de très vive douleur et de rougeur au niveau des articulations.

Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans l'articulation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Etoricoxib Sandoz ?

Ne prenez jamais Etoricoxib Sandoz :

- si vous êtes allergique à l'étoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous êtes allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), notamment l'acide acétylsalicylique et les inhibiteurs de la COX-2 (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)
- si vous avez un ulcère de l'estomac actuel ou une hémorragie dans votre estomac ou vos intestins
- si vous avez une maladie grave du foie
- si vous avez une maladie grave des reins
- si vous êtes ou pourriez être enceinte ou si vous allaitez (voir rubrique « Grossesse, allaitement et fertilité »)
- si vous êtes âgé(e) de moins de 16 ans
- si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que la maladie de Crohn, une colite ulcéreuse ou une colite
- si vous avez une pression artérielle élevée qui n'a pas été contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin si vous n'êtes pas sûr(e) que votre pression artérielle soit correctement contrôlée).
- si votre médecin a diagnostiqué des problèmes cardiaques, notamment une insuffisance cardiaque (modérée à sévère), une angine (douleur thoracique) ou si vous avez des antécédents de crise cardiaque, de pontage coronarien
- si vous avez eu une maladie artérielle périphérique (mauvaise circulation dans les jambes ou les pieds en raison d'artères étroites ou bloquées)
- si vous avez eu toute sorte d'AVC (notamment mini-AVC, accident ischémique transitoire ou AIT). L'étoricoxib peut légèrement augmenter votre risque de crise cardiaque ou d'AVC et c'est pourquoi il ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un AVC

Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas ce médicament avant d'avoir consulté votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Etoricoxib Sandoz, si :

- vous avez des antécédents d'hémorragie ou d'ulcères au niveau de l'estomac.
- vous êtes déshydraté(e), par exemple en raison d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée.
- vous avez un gonflement dû à une rétention hydrique.
- vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque, ou toute autre forme de maladie cardiaque.
- vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. Etoricoxib Sandoz peut augmenter la pression artérielle chez certaines personnes, en particulier à doses élevées ; et votre médecin pourra être amené à contrôler votre pression artérielle de temps en temps.
- vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins.
- vous êtes traité(e) pour une infection. Etoricoxib Sandoz peut masquer ou camoufler une fièvre, laquelle est un signe d'infection.
- vous avez du diabète, un cholestérol élevé ou si vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.
- vous êtes une femme essayant de concevoir.
- vous avez plus de 65 ans

Si vous n'êtes pas sûr(e) que l'un des points ci-dessus s'applique à votre cas, **parlez-en à votre médecin avant de prendre Etoricoxib Sandoz** afin de déterminer si ce médicament est adapté à votre cas.

Etoricoxib Sandoz est aussi efficace chez les patients adultes âgés que chez les patients adultes jeunes. Si vous êtes âgée de plus de 65 ans, votre médecin pourra être amené à vous surveiller étroitement. Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients de plus de 65 ans.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Autres médicaments et Etoricoxib Sandoz

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier si vous prenez l'un des médicaments suivants, votre médecin peut être amené à vous surveiller pour vérifier que les médicaments agissent correctement dès que vous commencez à prendre Etoricoxib Sandoz :

- médicaments qui fluidifient votre sang (anticoagulants), tels que la warfarine
- rifampicine (un antibiotique)
- méthotrexate (médicament utilisé pour supprimer le système immunitaire, et souvent utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde)
- ciclosporine ou tacrolimus (médicaments utilisés pour supprimer le système immunitaire, p.ex. après une transplantation d'organes)
- lithium (un médicament utilisé pour traiter certains types de dépression)
- médicaments utilisés pour aider au contrôle de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque, appelés inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, par exemple, énalapril et ramipril, et losartan et valsartan
- diurétiques
- digoxine (un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque et l'arythmie)
- minoxidil (un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle)
- salbutamol en comprimés ou en solution buvable (médicament utilisé pour traiter l'asthme)
- pilules contraceptives (l'association peut augmenter votre risque d'effets secondaires)
- hormonothérapie substitutive (l'association peut augmenter votre risque d'effets secondaires)
- acide acétylsalicylique; le risque d'ulcère de l'estomac est plus élevé si vous prenez Etoricoxib Sandoz avec de l'acide acétylsalicylique
 - l'acide acétylsalicylique pour la prévention de crises cardiaques ou d'accident vasculaire cérébral :
Etoricoxib Sandoz peut être pris avec de l'acide acétylsalicylique à **faible dose**. Si vous prenez actuellement de l'acide acétylsalicylique à faible dose en prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, vous ne devez pas arrêter de prendre l'acide acétylsalicylique avant d'en parler à votre médecin.
 - l'acide acétylsalicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :
ne prenez pas d'acide acétylsalicylique à **dose élevée** ou d'autres anti-inflammatoires pendant le traitement par Etoricoxib Sandoz.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

Etoricoxib Sandoz ne doit pas être pris pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, ne prenez pas ce médicament. Si vous devenez enceinte, arrêtez de prendre Etoricoxib Sandoz et consultez votre médecin. Consultez votre médecin en cas de doute ou si vous avez besoin de plus de conseils.

Allaitement

On ne sait pas si l'étoricoxib est excrété dans le lait maternel. Si vous allaitez ou planifiez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre Etoricoxib Sandoz. Si vous utilisez Etoricoxib Sandoz, vous ne devez pas allaiter.

Fertilité

Devenir enceinte peut être rendu plus difficile par l'étoricoxib. Par conséquent, Etoricoxib Sandoz n'est pas recommandé chez les femmes essayant de concevoir.

Vous devez informer votre médecin si vous planifiez une grossesse ou si vous avez des problèmes pour devenir enceinte.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des cas d'étourdissement et de somnolence ont été rapportés chez certains patients prenant Etoricoxib Sandoz.

Ne conduisez pas si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

N'utilisez ni outils ni machines si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

Etoricoxib Sandoz contient du lactose et du sodium

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé pelliculé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Etoricoxib Sandoz ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Ne prenez pas plus que la dose recommandée pour votre état. Votre médecin discutera de votre traitement de temps en temps. Il est important que vous utilisiez la plus faible dose permettant de contrôler votre douleur et vous ne devez pas prendre Etoricoxib Sandoz plus longtemps que nécessaire. En effet, le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral pourrait augmenter après un traitement prolongé, en particulier à des doses élevées.

Il existe différents dosages disponibles de ce médicament et selon votre maladie, votre médecin vous prescrira le dosage qui est approprié pour vous.

La dose recommandée est :

Ostéoarthrite

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmentée à un maximum de 90 mg une fois par jour si nécessaire.

Spondylarthrite ankylosante

La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmentée à un maximum de 90 mg une fois par jour si nécessaire.

Affections douloureuses aiguës

Etoricoxib Sandoz ne doit être utilisé que pendant la période aiguë de la douleur.

- **Goutte**

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour, laquelle ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours de traitement maximum.

- **Douleur postopératoire en chirurgie dentaire**

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, limitée à 3 jours de traitement maximum.

Personnes âgées

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les personnes âgées. Comme pour les autres médicaments, des précautions doivent être prises chez les personnes âgées.

Personnes présentant des troubles hépatiques

- Si vous avez une maladie légère du foie, vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.
- Si vous avez une maladie **modérée** du foie, vous ne devez pas prendre plus de 30 mg par jour.

Mode d'administration

Etoricoxib Sandoz est administré par voie orale.

Prenez les comprimés une fois par jour.

Etoricoxib Sandoz peut être pris avec ou sans aliments. L'effet d'Etoricoxib Sandoz peut apparaître plus rapidement s'il est pris sans aliments.

Si vous avez pris plus d'Etoricoxib Sandoz que vous n'auriez dû

Vous ne devez jamais prendre plus de comprimés que ce que votre médecin vous a recommandé. Si vous prenez trop de comprimés, consultez un médecin immédiatement.

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Etoricoxib Sandoz, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Etoricoxib Sandoz

Il est important de prendre Etoricoxib Sandoz suivant les prescriptions de votre médecin. Si vous oubliez une dose, reprenez simplement votre traitement habituel le jour suivant. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous développez l'un des signes suivants, arrêtez de prendre Etoricoxib Sandoz et parlez-en à votre médecin immédiatement :

- apparition ou aggravation d'un souffle court, de douleurs thoraciques ou d'un gonflement de la cheville
- coloration jaune de la peau et des yeux (jaunisse) - ce sont des signes de troubles hépatiques
- douleur d'estomac sévère ou permanente, ou coloration noire des selles
- réaction allergique - laquelle peut comprendre des troubles cutanés tels qu'ulcères ou ampoules, ou gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, pouvant provoquer des difficultés pour respirer.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir pendant le traitement par Etoricoxib Sandoz :

Très fréquent (peuvent toucher plus de 1 personne sur 10) :

- douleur d'estomac.

Fréquent (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10) :

- alvéole sèche (inflammation et douleur après l'extraction d'une dent)
- gonflement des jambes et/ou des pieds dû à une rétention hydrique (œdème)
- étourdissements, maux de tête
- sentir les battements de votre cœur, rythme cardiaque irrégulier
- élévation de la pression artérielle
- sifflement ou souffle court (bronchospasmes)
- constipation, flatulence (excédent de gaz), inflammation de la paroi de l'estomac (gastrite), aigreurs d'estomac, diarrhée, indigestion (dyspepsie)/gêne gastrique, nausées, vomissements, inflammation de l'œsophage, ulcères buccaux
- variations des tests sanguins évaluant le fonctionnement du foie
- contusions
- faiblesse et fatigue, syndrome pseudo-grippal.

Peu fréquent (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 100) :

- inflammation du tractus gastro-intestinal qui implique à la fois l'estomac et l'intestin grêle/ grippe intestinale (gastroentérite)
- infection des voies respiratoires supérieures
- infection urinaire
- diminution du nombre de globules rouges, ce qui peut rendre la peau pâle et induire une faiblesse et un essoufflement
- diminution du nombre de globules blancs,
- diminution des plaquettes, ce qui augmente le risque de saignements et de bleus
- hypersensibilité (réaction allergique dont de l'urticaire pouvant être suffisamment grave pour nécessiter une consultation médicale immédiate)
- augmentation ou diminution de l'appétit, prise de poids
- anxiété, dépression, diminution du discernement, voir, ressentir ou entendre des choses qui n'existent pas (hallucinations)
- altération du goût, difficulté de dormir, engourdissement ou picotements, sommeil
- vision trouble, irritation et rougeur de l'œil
- bourdonnement dans les oreilles, vertiges (sensation de rotation tout en restant immobile)
- rythme cardiaque anormal (fibrillation atriale), fréquence cardiaque rapide, insuffisance cardiaque, sensation de compression, pression ou lourdeur dans la poitrine (angine de poitrine), crise cardiaque
- bouffées de chaleur, accident vasculaire cérébral, mini-accident vasculaire cérébral (accident ischémique transitoire [AIT]), augmentation sévère de la pression artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'éruption cutanée
- toux, essoufflement, hémorragie nasale
- ballonnement gastrique ou intestinal, modifications de votre transit intestinal, bouche sèche, ulcère de l'estomac ou de l'intestin grêle, inflammation de la paroi de l'estomac pouvant s'aggraver et entraîner une hémorragie, syndrome de l'intestin irritable, inflammation du pancréas
- gonflement du visage, éruption cutanée ou démangeaison cutanée, rougeur cutanée
- crampe/spasme musculaire, douleur/rigidité musculaire
- taux élevés de potassium dans le sang, ce qui peut causer un rythme cardiaque anormal, variations des tests sanguins ou urinaires évaluant le fonctionnement des reins, troubles rénaux graves
- douleur thoracique.

Rare (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

- réaction allergique sévère caractérisée par un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant provoquer des difficultés pour respirer ou avaler (œdème de Quincke)/réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes, notamment un choc (réactions allergiques grave qui nécessitent une consultation médicale immédiate)
- confusion, agitation
- inflammation du foie (hépatite), insuffisance hépatique, coloration jaune de la peau et/ou des yeux (jaunisse)

- faible taux de sodium dans le sang, ce qui peut causer de la fatigue et de la confusion, des contractions musculaires, des convulsions et un coma
- réactions cutanées sévères.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

| Belgique | Luxembourg |
|--|--|
| Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.afmps.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be | Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments 20, Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg-Hamm Tél. : (+352) 2478 5592 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu Lien vers le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html |

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Etoricoxib Sandoz ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Etoricoxib Sandoz

- La substance active est l'étoricoxib.
Chaque comprimé pelliculé contient 30 mg d'étoricoxib.
Chaque comprimé pelliculé contient 60 mg d'étoricoxib.
Chaque comprimé pelliculé contient 90 mg d'étoricoxib.
Chaque comprimé pelliculé contient 120 mg d'étoricoxib.
- Les autres composants sont hydrogénophosphate de calcium anhydre, cellulose microcristalline, povidone K29-32, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique, hypromellose, lactose monohydraté, dioxyde de titane (E171), triacétine.
Les comprimés de 30 mg, 60 mg et 120 mg contiennent aussi de la laque d'aluminium carmin d'indigo (E132) et de l'oxyde de fer jaune (E172).

Aspect d'Etoricoxib Sandoz et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés de 30 mg :

Comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur bleu-vert.

Comprimés de 60 mg :

Comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur vert foncé.

Comprimés de 90 mg :

Comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur blanche.

Comprimés de 120 mg :

Comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur vert pâle.

Les comprimés pelliculés sont conditionnés sous plaquettes ou dans des piluliers dotés d'un bouchon et contenant un déshydratant (gel de silice). Le déshydratant, utilisé pour maintenir les comprimés secs, ne doit pas être avalé.

Présentations :

5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde

Fabricants :

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Allemagne

Pharmacare Premium Ltd., HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000, Malte

Numéros de l'Autorisation de mise sur le marché

Etoricoxib Sandoz 30 mg (plaquette): BE472115

Etoricoxib Sandoz 30 mg (pilulier): BE472151

Etoricoxib Sandoz 60 mg (plaquette): BE472124

Etoricoxib Sandoz 60 mg (pilulier): BE472160

Etoricoxib Sandoz 90 mg (plaquette): BE472133

Etoricoxib Sandoz 90 mg (pilulier): BE472177

Etoricoxib Sandoz 120 mg (plaquette): BE472142

Etoricoxib Sandoz 120 mg (pilulier): BE472186

Mode de délivrance

Sur prescription médicale

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

AT Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg – Filmtabletten

BE Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimés pelliculés

| | |
|----|--|
| BG | КОСТАРОКС 30 MG, 60 MG, 90 MG, 120 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ |
| EE | Coxitor, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Coxitor |
| ES | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimidos recubiertos con película EFG |
| FI | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen |
| FR | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg comprimé pelliculé |
| DE | Etoricoxib – 1 A Pharma 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletten |
| HR | Kostarox 60 mg, 90 mg filmom obložene tablete |
| IE | Etoricoxib 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Film-coated tablets |
| LV | Coxitor 60 mg, 90 mg, 120 mg apvalkotās tabletes |
| LT | Coxitor 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg plėvelė dengtos tabletės |
| LU | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimés pelliculés |
| NL | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmomhulde tabletten |
| NO | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmdrasjerte tabletter |
| PL | KOSTAROX |
| RO | KOSTAROX 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate |
| SI | KOSTAROX 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmsko obložene tablete |
| SE | Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmdragerade tabletter |

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 11/2020.