

Notice: information du patient
2LVERU granules en gélules à ouvrir

Interleukine 1 : 10-17CH; Interleukine 2 : 10-17CH; Interféron α : 10-17CH; Acide Ribonucléique : 8-10CH; Acide nucléique spécifique SNA-HLAI^{II} : 10-18CH; Acide nucléique spécifique SNA-VERU : 10-18CH

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après six semaines.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que 2LVERU et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre 2LVERU ?
3. Comment prendre 2LVERU ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver 2LVERU ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que 2LVERU et dans quel cas est-il utilisé ?

2LVERU est un médicament homéopathique qui contient des ingrédients traditionnellement utilisés en micro-immunothérapie, utilisé comme adjuvant de la réponse immunitaire dans le traitement des verrues.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre 2LVERU ?

Ne prenez jamais 2LVERU

si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre 2LVERU.

Enfants

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et 2LVERU

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

Éviter tout médicament à base de menthe, dans l'heure qui précède la prise du médicament.

2LVERU avec des aliments et boissons

Il est conseillé d'éviter la prise de menthe, ainsi que des produits excitants (café, chocolat) dans l'heure qui précède la prise sublinguale.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

2LVERU n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

2LVERU contient du saccharose

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre 2LVERU ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie pour adultes :


Une gélule par jour, le matin à jeun, en respectant toujours l'ordre de numération de 1 à 10 des gélules et ce jusqu'à disparition des verrues.

Posologie pour population pédiatrique :


Enfants et adolescents de 12 à 18 ans :

Une gélule par jour, le matin à jeun, en respectant toujours l'ordre de numération de 1 à 10 des gélules et ce jusqu'à disparition des verrues.


Il ne faut pas avaler la gélule entière. Lisez attentivement les instructions :



1. Sortez une des trois plaquettes de la boîte numérotation



2. Prenez une gélule en suivant la



3. Ouvrez la gélule avec soin en soulevant la tête (*)

A la prise suivante, suivez l'ordre numérique des gélules indiqué sur la plaquette (2, 3,...). A la fin de la première plaquette, continuez avec la gélule 1 de la plaquette suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la boîte.



4. Versez le contenu de la gélule sous la langue et laissez fondre

Si vous avez pris plus de 2LVERU que vous n'auriez dû

Selon les principes de l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez pris plus de 2LVERU que la dose recommandée, l'effet ne devrait pas être plus fort.

Si vous avez pris trop de 2LVERU, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre 2LVERU

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous vous trompez dans l'ordre de prise des gélules, ou si vous oubliez une gélule, continuez à partir de la dernière gélule que vous avez prise.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

De façon exceptionnelle, il peut apparaître une dyspepsie (troubles digestifs) lors des prises à jeun. Dans ce cas, la prise des granules se fera 1 heure après le repas.

Des difficultés d'endormissement peuvent subvenir en cas de prise après 16 heures.

Comme pour tout traitement homéopathique, une impression d'aggravation des symptômes peut survenir, qui disparaît généralement après quelques jours. Si cette impression perdure, consultez votre médecin.

Si vous observez une autre réaction, parlez-en à votre pharmacien ou votre médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

BELGIQUE

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be

LUXEMBOURG

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver 2LVERU ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine à une température ne dépassant pas 25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Durée de conservation : 3 ans

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP.

Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient 2LVERU

- Les substances actives sont :

Chaque séquence de 5 gélules contient :

Interleukine 1 (IL-1) :	10-17CH
Interleukine 2 (IL-2) :	10-17CH
Interféron α (IFN α) :	10-17CH
Acide Ribonucléique (ARN) :	8-10CH
Acide nucléique spécifique SNA-HLAI I :	10-18CH
Acide nucléique spécifique SNA-VERU :	10-18CH

- Les autres composants sont :

Granules : saccharose

Gélules : gélatine, colorant bleu (selon gélule) : noir brillant BN (E151), oxyde de fer noir (E172), carmin indigo (E132), opacifiant : dioxyde de titane (E171).

Aspect de 2LVERU et contenu de l'emballage extérieur

2LVERU se présente sous formes de granules imprégnés

Mode d'administration : voie sublinguale

Boîte de 30 gélules

Les granules sont conditionnés en gélules de gélatine comme c'est indiqué dans le point 3.
Ces gélules ne doivent pas être ingérées.

Les gélules sont conditionnées dans des plaquettes en alu/PVC de 10 gélules.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

LABO'LIFE BELGIUM, SRL. Aut 1507 H

Av. d'Ecolys 2 bte 36

5020 Namur, BELGIQUE

Tel (32) (0)81 40 87 81- Fax (32) (0)81 40 87 89

Fabricant :

LABO'LIFE ESPAÑA, S.A. No Reg.3.279 E

Av. des Raiguer 7

07330 Consell, ESPAGNE

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché :

Belgique : HO-BE508533

Grand-Duché de Luxembourg : 2018060137

Mode de délivrance

Délivrance libre : adultes, enfant et adolescents de plus de 12 ans.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2024.