
Notice : information de l'utilisateur**Nosca-Méréprine 1 mg/ml sirop**
Chlorhydrate de noscapine monohydraté**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Nosca-Méréprine sirop et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Nosca-Méréprine sirop
3. Comment utiliser Nosca-Méréprine sirop
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Nosca-Méréprine sirop
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Nosca-Méréprine sirop et dans quel cas est-il utilisé ?

La noscapine atténue le réflexe de la toux et est utilisée dans le traitement symptomatique de la toux non productive. Indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 6 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Nosca-Méréprine sirop ?**N'utilisez jamais Nosca-Méréprine sirop :**

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Insuffisance respiratoire.
- Toux asthmatique.
- En cas de grossesse.
- Chez les enfants de moins de 6 ans.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Nosca-Méréprine sirop.

- En présence d'une toux productive, avant d'utiliser ce médicament, il convient de déterminer les causes de la toux et de décider en concertation avec le médecin ou pharmacien si l'administration d'un traitement adapté s'impose.

- Les personnes âgées peuvent être plus sensibles ; une réduction de la dose peut donc être nécessaire.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Autres médicaments et Nosca-Méréprine sirop ».

Enfants

Ce médicament ne peut pas être utilisé chez les enfants âgés de 0 à 6 ans, car les avantages associés au traitement ne l'emportent pas sur les risques.

Ne pas dépasser la posologie indiquée.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Nosca-Méréprine sirop.

Autres médicaments et Nosca-Méréprine sirop

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Mises en garde :

En plus de Nosca-Méréprine sirop, utilisez-vous également de la warfarine ou d'autres médicaments qui ralentissent la coagulation sanguine (anticoagulants tels que l'acénocoumarol, la phenprocoumone ou le clopidogrel) ?

Ce type d'association peut influencer fortement l'effet du médicament anticoagulant. Par conséquent, en cas d'utilisation simultanée de ces médicaments, votre médecin doit contrôler régulièrement la valeur INR et, si nécessaire, adapter la posologie de la warfarine (ou des autres médicaments similaires que vous prenez).

Ne pas utiliser Nosca-Méréprine sirop en association avec les substances suivantes :

- Alcool ou sédatifs (calmants), hypnotiques (somnifères), dérivés de la morphine, neuroleptiques (médicaments contre la psychose) ou anxiolytiques (médicaments utilisés contre les troubles anxieux), en raison du risque de renforcement de leur effet.

Par ailleurs, il est possible que Nosca-Méréprine sirop présente une interaction avec d'autres médicaments, notamment :

- Les médicaments contre l'épilepsie, tels que la phénytoïne et le phénobarbital.
- Les médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, comme le tacrolimus et la ciclosporine.
- Les médicaments utilisés pour le traitement du diabète, comme le tolbutamide, le natéglinide, le glibenclamide, le glyburide, le gliclazide, le glimépiride et le glipizide.
- Les médicaments utilisés pour traiter les cancers, tels que le cyclophosphamide, l'ifosfamide et le téniposide.
- Des médicaments qui aident à abaisser la tension artérielle, comme le losartan.

On ignore dans quelle mesure l'efficacité de ces médicaments est influencée par l'utilisation simultanée de Nosca-Méréprine sirop. Dès lors, l'utilisation simultanée de Nosca-Méréprine sirop et de ces médicaments est déconseillée.

L'utilisation concomitante de Nosca-Méréprine sirop et de sédatifs tels que les benzodiazépines ou les médicaments apparentés augmente le risque de sensations vertigineuses, difficultés respiratoires, coma, et peut mettre en jeu le pronostic vital. Pour cette raison, l'utilisation concomitante doit être envisagée uniquement en l'absence d'autres options thérapeutiques.

Cependant, si votre médecin vous prescrit Nosca-Méréprine sirop avec des sédatifs, il doit s'assurer de limiter la dose et la durée du traitement concomitant.

Veillez informer votre médecin de tous les sédatifs que vous prenez et suivre attentivement ses recommandations concernant la dose. Il peut être utile de demander à vos amis ou famille de faire attention aux signes et symptômes décrits ci-dessus. Contactez votre médecin si vous présentez ce type de symptômes.

Nosca-Méréprine sirop avec de l'alcool

Nosca-Méréprine sirop peut provoquer une somnolence et des étourdissements.

Ne pas utiliser Nosca-Méréprine sirop en association avec de l'alcool en raison du risque de renforcement de ces effets.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas Nosca-Méréprine sirop si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous pourriez tomber enceinte et vous n'utilisez pas de moyen de contraception.

L'utilisation de Nosca-Méréprine sirop est déconseillée si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Nosca-Méréprine sirop peut théoriquement provoquer une somnolence et de légers étourdissements.

Toutefois, de tels effets sont rares lorsque le sirop est utilisé pour atténuer le réflexe de la toux.

Lorsqu'il est utilisé en association avec des sédatifs (calmants) et de l'alcool, ce produit provoque parfois de la somnolence.

Si vous avez envie de dormir après avoir utilisé Nosca-Méréprine sirop, il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines nécessitant un haut degré de vigilance.

Nosca-Méréprine sirop contient de l'éthanol

Ce médicament contient 1.5 mg d'alcool (éthanol) par dose de 30 ml de sirop. La quantité en 0.05 mg/ml de ce médicament équivaut à moins de 1 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Nosca-Méréprine sirop contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218)

Peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées)

Nosca-Méréprine sirop contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose de 30 ml de sirop, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Nosca-Méréprine sirop contient du propylène glycol (E1520)

Ce médicament contient 45 mg de propylène glycol par dose de 30 ml de sirop équivalent à 1,5 mg/ml.

Nosca-Méréprine sirop contient du saccharose

Ce médicament contient 22,35 g de saccharose par dose de 30 ml de sirop équivalent à 745 mg/ml. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré. Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. De plus, le saccharose peut provoquer des troubles gastro-intestinaux et de la diarrhée.

3. Comment utiliser Nosca-Méréprine sirop ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon avec sécurité enfant tout en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

La dose recommandée est de 15 à 30 ml, 3 à 4 fois par jour (= 24 heures).

La dose quotidienne maximale est de 120 ml.

L'intervalle entre 2 prises doit être d'au moins 4 heures.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Enfants à partir de 12 ans

15 ml, 4 à 5 fois par jour. La dose quotidienne maximale est de 75 ml.

Enfants âgés de 6 à 12 ans

15 ml, 2 à 4 fois par jour. La dose quotidienne maximale est de 60 ml.

Enfants de moins de 6 ans

L'utilisation de Nosca-Méréprine sirop est contre-indiquée chez les enfants de moins de 6 ans.

Personnes âgées

Les personnes âgées peuvent être plus sensibles en raison du ralentissement du métabolisme de la noscapine. Une réduction de la dose peut donc être nécessaire chez ces patients.

Si vous avez l'impression que l'effet de Nosca-Méréprine sirop est trop fort ou au contraire trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

La dose doit être mesurée à l'aide du gobelet gradué fourni. Ne pas dépasser les doses indiquées.

N'utilisez pas le sirop plus de 5 jours sans consulter un médecin.

Si vous avez pris plus de Nosca-Méréprine sirop que vous n'auriez dû

Les symptômes d'un surdosage de Nosca-Méréprine sirop sont les suivants :

Agitation, confusion, anxiété, éruption cutanée, nausées, vomissements, étourdissements, somnolence, difficulté respiratoire due à un rétrécissement des bronches, essoufflement, rougeur, rythme cardiaque rapide et baisse temporaire de la tension artérielle.

Après l'utilisation de grandes quantités, une insuffisance respiratoire (dépression respiratoire), des convulsions et un coma peuvent survenir.

En cas de confirmation d'une intoxication, le patient sera toujours hospitalisé.

Si vous avez utilisé trop de Nosca-Méréprine sirop, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Nosca-Méréprine sirop

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible.

Cependant, s'il est presque le moment de prendre votre dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée et continuez à prendre vos doses selon le schéma posologique habituel.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Effets indésirables rares (touchent moins de 1 utilisateur sur 1000) :

- Légère somnolence, étourdissements
- Nausées

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Réactions d'hypersensibilité, telles qu'éruption cutanée et irritation de l'œil (conjonctivite) ou des muqueuses du nez (rhinite) ; ainsi qu'apparition soudaine d'un gonflement de la peau et des muqueuses (p. ex. gorge ou langue), entraînant des difficultés respiratoires et/ou des démangeaisons et une éruption cutanée, souvent dans le cadre d'une réaction allergique (angio-œdème).
- Douleur aiguë au niveau de l'abdomen (ventre) et de la poitrine.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet: www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Nosca-Méréprine sirop

Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et la boîte après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Après première ouverture, la durée de conservation de ce médicament est 6 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Nosca-Méréprine sirop

- La substance active est le chlorhydrate de noscapine monohydraté, à raison de 1 mg par ml de sirop.
- Les autres composants sont : acide citrique (E 330), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), saccharinate de sodium, saccharose, essence de framboise (contient du propylène glycol (E 1520) et de l'éthanol) et eau purifiée.

Aspect de Nosca-Méréprine sirop et contenu de l'emballage extérieur

Flacon de 150 ml ou 300 ml de sirop avec fermeture sécurité enfant et un gobelet doseur transparent de 15 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Pays-Bas

Représentant local :

Cooper Consumer Health BE SA
Gaston Crommenlaan 8
B-9050 Gand
Tel : +32 9 296 2149
E-Mail : contactbe@cooperconsumerhealth.com

Fabricant :

Delpharm Bladel B.V.
Industrieweg 1
5531 AD Bladel
Pays-Bas

Numéro d'Autorisation de mise sur le marché

BE528942
LU: 201907169

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2025.