

Notice : information de l'utilisateur

Viburcol junior solution buvable

Belladonna D6, Chamomilla D4, Dulcamara D6, Plantago major D4, Pulsatilla pratensis D6, Calcarea carbonica ostreorum D8.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 à 3 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Viburcol junior solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Viburcol junior solution buvable ?
3. Comment prendre Viburcol junior solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Viburcol junior solution buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Viburcol junior solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

Viburcol junior est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés dans le traitement des symptômes tels que l'agitation et l'irritabilité, avec ou sans fièvre, lors d'affections aiguës ou de poussées dentaires.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 à 3 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Viburcol junior solution buvable ?

Ne prenez jamais Viburcol junior

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique (hypersensible) aux plantes de la famille des Composées (Astéracées).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Viburcol junior.

Autres médicaments et Viburcol junior

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

Viburcol junior avec des aliments et boissons

Pour autant que l'on sache, ce médicament peut être pris avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Viburcol junior sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Pour autant que l'on sache, Viburcol junior peut être pris, selon la posologie indiquée, au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données indiquant que Viburcol junior puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Viburcol junior contient sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par unidose de 1 ml, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Viburcol junior solution buvable ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Enfants en dessous de 2 ans :

1 unidose 1x par jour.

Enfants de 2 à 5 ans :

1 unidose 2x par jour.

Enfants et adolescents de 6 à 18 ans :

1 unidose 3x par jour.

Pour usage oral.

Les unidoses sont destinées à usage unique. Chaque récipient unidose doit être utilisé immédiatement après son ouverture.

Détachez un récipient de la barrette. Enlevez l'embout en le tournant. Versez le contenu dans la bouche.

Si vous avez pris plus de Viburcol junior que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous prenez plus de Viburcol junior que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort.

Si vous avez pris trop de Viburcol junior, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245 245).

Si vous oubliez de prendre Viburcol junior

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Viburcol junior

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Dans certains cas isolés, des allergies transitoires peuvent survenir.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
1000 BRUXELLES Madou
Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Viburcol junior solution buvable ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine. A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
Ne pas conserver de récipient unidose ouvert.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Après ouverture du sachet, les récipients unidoses peuvent être conservés 6 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Viburcol junior

- Les substances actives d'une unidose de 1 ml sont : Belladonna D6 11 mg ; Chamomilla D4 25 mg ; Dulcamara D6 25 mg ; Plantago major D4 25 mg ; Pulsatilla pratensis D6 50 mg ; Calcarea carbonica ostreorum D8 75 mg.
- Les autres composants (excipients) sont : eau pour injection, chlorure de sodium.

Aspect de Viburcol junior et contenu de l'emballage extérieur

Solution buvable.

Boîte contenant 10 récipients unidoses de 1 ml, conditionnés par 5 dans un sachet (aluminium).

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium NV
Booiebos 25
B-9031 Drogen (Gent)
Tél. : 09/265 95 65
E-mail : info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché
HO-BE528373

Mode de délivrance
Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est novembre 2022.