

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Valganciclovir Sandoz 450 mg Filmtabletten

Valganciclovir (als Hydrochlorid)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Valganciclovir Sandoz und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Valganciclovir Sandoz beachten?
3. Wie ist Valganciclovir Sandoz einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Valganciclovir Sandoz aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Valganciclovir Sandoz und wofür wird es angewendet?

Valganciclovir Sandoz gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die das Wachstum von Viren direkt hemmen. Im Körper wird der Wirkstoff in den Tabletten, Valganciclovir, in Ganciclovir umgewandelt. Ganciclovir verhindert, dass ein bestimmtes Virus, das Cytomegalievirus (CMV), sich vermehrt und in gesunde Zellen eindringt. Bei Patienten mit einem geschwächten Immunsystem kann CMV eine Infektion in den Organen des Körpers auslösen. Dies kann lebensbedrohlich sein.

Valganciclovir Sandoz wird angewendet:

- Zur Behandlung von durch CMV verursachte Infektionen der Netzhaut der Augen bei erwachsenen Patienten mit erworbener Immunschwäche (AIDS). Eine CMV-Infektion der Netzhaut kann zu Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen.
- Zur Vorbeugung einer CMV-Infektion bei Erwachsenen und Kindern, die bisher nicht mit CMV infiziert waren und bei einer Transplantation das Organ eines CMV-infizierten Spenders erhalten haben.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Valganciclovir Sandoz beachten?

Valganciclovir Sandoz darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Valganciclovir, Ganciclovir oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie stillen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie **Valganciclovir Sandoz** einnehmen,

- wenn Sie allergisch gegen Aciclovir, Penciclovir, Valaciclovir oder Famciclovir sind. Dies sind andere Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Valganciclovir Sandoz ist erforderlich

- wenn die Mengen Ihrer weißen oder roten Blutkörperchen oder Ihrer Blutplättchen (kleine Zellen, die an der Blutgerinnung beteiligt sind) gering sind. Ihr Arzt wird vor Beginn Ihrer Behandlung mit Valganciclovir Sandoz Blutuntersuchungen bei Ihnen durchführen und weitere Untersuchungen werden durchgeführt, während Sie die Tabletten einnehmen.
- wenn Sie eine Strahlentherapie erhalten oder Dialysepatient sind
- wenn Sie eine Nierenerkrankung haben. Es kann sein, dass Ihr Arzt Ihnen eine niedrigere Dosis verschreibt und Ihr Blut während der Behandlung regelmäßig untersucht werden muss.
- wenn Sie zurzeit Ganciclovir-Kapseln einnehmen und Ihr Arzt Sie auf **Valganciclovir Sandoz**-Tabletten umstellen möchte. Es ist wichtig, dass Sie nicht mehr als die von Ihrem Arzt verschriebene Anzahl an Tabletten einnehmen, da sonst die Gefahr einer Überdosierung besteht.

Einnahme von Valganciclovir Sandoz zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wenn Sie andere Arzneimittel zur gleichen Zeit wie **Valganciclovir Sandoz** einnehmen, kann diese Kombination die Wirkstoffmenge beeinflussen, die in Ihren Blutkreislauf gelangt, oder zu schädlichen Wirkungen führen.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie bereits Arzneimittel einnehmen, die einen der folgenden Wirkstoffe enthalten:

- Imipenem-Cilastatin (ein **Antibiotikum**). Die gleichzeitige Einnahme mit **Valganciclovir Sandoz** kann zu Krampfanfällen führen
- Zidovudin, Didanosin, Lamivudin, Stavudin, Tenofovir, Abacavir, Emtricitabin oder ähnliche **Arzneimittel zur Behandlung von AIDS**
- Adefovir oder andere Arzneimittel zur Behandlung von Hepatitis B
- Probenecid (ein **Arzneimittel gegen Gicht**). Die gleichzeitige Einnahme von **Valganciclovir Sandoz** kann den Ganciclovir-Gehalt in Ihrem Blut erhöhen.
- Mycophenolatmofetil, Ciclosporin oder Tacrolimus (**werden nach Organtransplantationen angewendet**)
- Vincristin, Vinblastin, Doxorubicin, Hydroxycarbamid oder ähnliche **Arzneimittel zur Behandlung von Krebs**
- Trimethoprim, Trimethoprim/Sulfonamid-Kombinationen und Dapson (**Antibiotika**)
- Pentamidin (**Arzneimittel zur Behandlung von Parasiten oder Lungeninfektionen**)
- Flucytosin oder Amphotericin B (**Arzneimittel gegen Pilzkrankungen**)

Einnahme von Valganciclovir Sandoz zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Valganciclovir Sandoz sollte zu einer Mahlzeit eingenommen werden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund einmal nicht essen können, sollten Sie **Valganciclovir Sandoz** dennoch wie gewohnt

einnehmen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie schwanger sind, dürfen Sie **Valganciclovir Sandoz** nicht einnehmen, sofern Ihr Arzt Ihnen dazu ratet. Wenn Sie schwanger sind oder beabsichtigen, schwanger zu werden, müssen Sie dies Ihrem Arzt mitteilen.

Die Einnahme von **Valganciclovir Sandoz** während einer Schwangerschaft kann Ihr ungeborenes Kind schädigen.

Sie dürfen **Valganciclovir Sandoz** nicht einnehmen, wenn Sie stillen. Wenn Ihr Arzt möchte, dass Sie eine Behandlung mit **Valganciclovir Sandoz** beginnen, müssen Sie vor der ersten Einnahme der Tabletten abstillen.

Frauen im gebärfähigen Alter müssen eine wirksame Empfängnisverhütung praktizieren, wenn sie **Valganciclovir Sandoz** einnehmen und für mindestens 7 Monate, nachdem die Behandlung beendet wurde.

Männer, deren Partnerinnen schwanger werden könnten, müssen während der Einnahme von **Valganciclovir Sandoz** sowie bis zu 4 Monate nach dem Ende der Behandlung Kondome verwenden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Sie dürfen nicht Auto fahren oder Werkzeuge oder Maschinen bedienen, wenn Sie sich während der Behandlung mit diesem Arzneimittel benommen, müde, zitterig oder verwirrt fühlen.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. Wie ist Valganciclovir Sandoz einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Sie müssen Ihre Tabletten mit Vorsicht handhaben. Die Tabletten dürfen nicht zerbrochen oder zerdrückt werden. Sie sind unzerkaut und möglichst zusammen mit einer Mahlzeit einzunehmen. Sollten Sie versehentlich eine beschädigte Tablette berührt haben, waschen Sie sich die Hände gründlich mit Wasser und Seife. Wenn Tablettenpulver in Ihre Augen gelangt, spülen Sie die Augen mit sterilem Wasser bzw. mit sauberem Wasser, wenn Ihnen kein steriles Wasser zur Verfügung steht.

Sie müssen die von Ihrem Arzt verschriebene Anzahl Tabletten genau einhalten, um eine Überdosierung zu vermeiden.

Valganciclovir Sandoz Tabletten sollten möglichst zu einer Mahlzeit eingenommen werden – siehe Abschnitt 2.

Für Kinder und Jugendliche, die eine Dosisanpassung benötigen, stehen andere Darreichungsformen zur Verfügung.

Erwachsene:

Vorbeugung einer CMV-Erkrankung bei Patienten nach Organtransplantation

Sie müssen innerhalb von 10 Tagen nach der Transplantation mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

Die übliche Dosis beträgt EINMAL täglich zwei Tabletten.

Nehmen Sie diese Dosis bis zu 100 Tage lang nach Ihrer Organtransplantation ein. Nach einer Nierentransplantation wird Ihr Arzt Ihnen möglicherweise raten, die Tabletten für 200 Tage einzunehmen.

Behandlung einer aktiven CMV-Retinitis bei AIDS-Patienten (sogenannte Induktionstherapie)

Die empfohlene Dosis **Valganciclovir Sandoz** beträgt ZWEIMAL täglich zwei Tabletten über 21 Tage (drei Wochen).

Nehmen Sie diese Dosis nicht länger als 21 Tage ein, da sich das Risiko für mögliche Nebenwirkungen sonst erhöht, es sei denn, Ihr Arzt hat Sie dazu angewiesen.

Langzeitbehandlung zur Vorbeugung des Wiederauftretens einer aktiven Entzündung bei AIDS-Patienten mit CMV-Retinitis (sogenannte Erhaltungstherapie)

Die empfohlene Dosis beträgt EINMAL täglich zwei Tabletten, die möglichst jeweils zur gleichen Tageszeit eingenommen werden sollten.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Sie **Valganciclovir Sandoz** einnehmen müssen. Falls Ihre Netzhautentzündung sich bei dieser Dosis verschlimmert, kann Ihr Arzt Sie anweisen, die Induktionstherapie (s.o.) zu wiederholen oder Ihnen ein anderes Arzneimittel zur Behandlung der CMV-Infektion verschreiben.

Ältere Patienten

Valganciclovir Sandoz wurde in Studien noch nicht an älteren Patienten untersucht.

Patienten mit Nierenerkrankungen

Wenn Ihre Nieren nicht einwandfrei arbeiten, kann der Arzt anweisen, dass Sie täglich weniger Tabletten oder Ihre Tabletten nur an bestimmten Wochentagen einnehmen. Es ist **sehr wichtig**, dass Sie nur die Anzahl Tabletten einnehmen, die der Arzt Ihnen verordnet hat.

Patienten mit Lebererkrankungen

Valganciclovir wurde in Studien noch nicht an Patienten mit Lebererkrankungen untersucht.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Vorbeugung einer CMV-Erkrankung bei Patienten nach Organtransplantation

Kinder müssen innerhalb von 10 Tagen nach der Transplantation mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen. Die einzunehmende Dosis ist je nach Körpergröße des Kindes unterschiedlich und sollte EINMAL täglich eingenommen werden. Ihr Arzt wird die am besten geeignete Dosis für Ihr Kind, die auf Körpergröße, Gewicht und Nierenfunktion basiert, bestimmen. Diese Dosis sollte bis zu

100 Tage lang eingenommen werden. Wenn Ihr Kind eine Nierentransplantation erhalten hat, rät der Arzt möglicherweise, dass die Dosis 200 Tage lang einzunehmen ist. Bei Kindern, die nicht in der Lage sind, Valganciclovir Sandoz Filmtabletten zu schlucken, kann Valganciclovir Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Valganciclovir Sandoz eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie mehr Tabletten eingenommen haben als Sie sollten oder dies vermuten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder ein Krankenhaus. Die Einnahme zu vieler Tabletten kann zu schwerwiegenden Nebenwirkungen, insbesondere an Blut oder Nieren, führen. Unter Umständen kann eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich werden.

Wenn Sie eine Größere Menge von Valganciclovir Sandoz haben eingenommen, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von Valganciclovir Sandoz vergessen haben

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie die versäumte Dosis ein, sobald Sie es bemerkt haben, und nehmen Sie die folgende Dosis zur üblichen Zeit ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Valganciclovir Sandoz abbrechen

Sie dürfen die Behandlung nicht abbrechen, sofern Ihr Arzt Ihnen nicht dazu ratet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen

Bis zu 1 von 1 000 Patienten erleiden eine plötzliche und schwere allergische Reaktion gegen Valganciclovir (anaphylaktischer Schock). Nehmen Sie **Valganciclovir Sandoz NICHT** weiter ein und begeben Sie sich in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses, wenn bei Ihnen eines der folgenden Symptome auftritt:

- erhabener, juckender Hautausschlag (**Nesselsucht**)
- **plötzliche Schwellungen von Rachen, Gesicht, Lippen und Mund**, die zu Schluck- oder Atemschwierigkeiten führen können
- **plötzliche Schwellungen von Händen, Füßen oder Knöcheln.**

Schwerwiegende Nebenwirkungen

Informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn Sie eine der folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen bemerken – Ihr Arzt wird Ihnen unter Umständen raten, die Einnahme von Valganciclovir Sandoz zu beenden, und Sie benötigen eventuell dringend eine medizinische Behandlung:

Sehr häufig: können mehr als 1 von 10 Personen betreffen

- niedrige Anzahl an weißen Blutkörperchen – mit Zeichen einer Infektion wie Halsschmerzen, Geschwüren im Mund oder Fieber
- niedrige Anzahl an roten Blutkörperchen – mögliche Zeichen sind Kurzatmigkeit oder Müdigkeit, Spüren des Herzschlags oder blasse Haut

Häufig: können bis zu 1 von 10 Personen betreffen

- Infektion des Blutes (Sepsis) – mögliche Zeichen sind Fieber, Schüttelfrost, Spüren des Herzschlags, Verwirrtheit und undeutliche Sprache
- niedrige Mengen an Blutplättchen – mögliche Zeichen sind häufigere Blutungen oder Blutergüsse als sonst, Blut im Urin oder Stuhl oder Zahnfleischbluten, die Blutung kann schwer sein
- stark verringerte Anzahl an Blutkörperchen
- Entzündung der Bauchspeicheldrüse – ein Zeichen sind starke Bauchschmerzen, die in den Rücken ausstrahlen
- Krampfanfälle

Gelegentlich: können bis zu 1 von 100 Personen betreffen

- Unfähigkeit des Knochenmarks, Blutkörperchen zu bilden
- Halluzinationen – Hören oder Sehen von Dingen, die nicht existieren
- anomale Gedanken oder Gefühle, Verlust des Kontaktes mit der Realität
- Versagen der Nierenfunktion

Die folgenden Nebenwirkungen sind während einer Behandlung mit Valganciclovir oder Ganciclovir aufgetreten:

Weitere Nebenwirkungen

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken:

Sehr häufig: können mehr als 1 von 10 Personen betreffen

- Soor und Mundsoor
- Infektion der oberen Atemwege (z. B. Nebenhöhlenentzündung, Mandelentzündung)
- Appetitlosigkeit
- Kopfschmerzen
- Husten
- Kurzatmigkeit
- Durchfall
- Übelkeit oder Erbrechen
- Bauchschmerzen
- Ekzem
- Müdigkeit
- Fieber

Häufig: können bis zu 1 von 10 Personen betreffen

- Grippe
- Harninfektion – mögliche Zeichen sind Fieber, häufigeres Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen

- Infektion der Haut und der Gewebe unter der Haut
- leichte allergische Reaktion – mögliche Zeichen umfassen rote und juckende Haut
- Gewichtsabnahme
- Niedergeschlagenheit, Angstgefühle oder Verwirrtheit
- Schlafstörungen
- Schwäche- oder Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen, wodurch das Gleichgewicht beeinträchtigt sein kann
- Veränderungen des Tastsinns, Kribbeln, Prickeln, stechendes oder brennendes Gefühl
- Veränderung des Geschmacksempfindens
- Schüttelfrost
- Augenentzündung (Konjunktivitis), Augenschmerzen oder Sehprobleme
- Ohrenscherzen
- niedriger Blutdruck, der Schwindelgefühl oder eine Ohnmacht auslösen kann
- Schluckstörungen
- Verstopfung, Blähungen, Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen, Schwellung des Bauches
- Geschwüre im Mund
- anomale Werte bei Labortests der Leber- und Nierenfunktion
- nächtliches Schwitzen
- Juckreiz, Hautausschlag
- Haarausfall
- Rückenschmerzen, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Muskelkrämpfe
- Schwindelgefühl, Schwäche oder allgemeines Unwohlsein

Gelegentlich: können bis zu 1 von 100 Personen betreffen

- Unruhe
- Zittern (Tremor)
- Taubheit
- unregelmäßiger Herzschlag
- Nesselsucht, trockene Haut
- Blut im Urin
- Unfruchtbarkeit bei Männern – siehe Abschnitt „Fortpflanzungsfähigkeit“
- Schmerzen im Brustkorb

Eine Ablösung der Sehzellschicht des Auges (Netzhautablösung) trat nur bei AIDS-Patienten auf, die mit Valganciclovir gegen eine CMV-Infektion behandelt wurden.

Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen

Bei Kindern und Jugendlichen traten ähnliche Nebenwirkungen wie bei Erwachsenen auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, www.afmps.be, Abteilung Vigilanz: Website:

www.notifierunefetindesirable.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist **Valganciclovir Sandoz** aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Blisterpackung, dem Umkarton oder dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch:

Flaschen: 2 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was **Valganciclovir Sandoz** enthält

Der Wirkstoff ist Valganciclovir (als Hydrochlorid).

Eine Tablette enthält 450 mg Valganciclovir (als Hydrochlorid).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose (PH101), Crospovidon (Typ A), Povidon (K30), Stearinsäure 50

Filmüberzug: Opadry Pink 15B24005: Hypromellose (E 464) (3 cP), Hypromellose (E 464) (6 cP), Titandioxid (E 171), Macrogol 400 (E 1521), Eisenoxid rot (E 172), Polysorbat 80 (E 433)

Wie **Valganciclovir Sandoz** aussieht und Inhalt der Packung

Valganciclovir Sandoz sind rosarote, ovale, beidseitig gewölbte Filmtabletten (16,7 x 7,8 mm) mit der Prägung „J“ auf der einen und „156“ auf der anderen Seite.

Die Filmtabletten sind verpackt in Aluminium/PVC/Aluminium/OPA-Blisterverpackungen in einem Umkarton, oder in einer HDPE-Flasche mit kindergesichertem Polypropylen-Schraubverschluss mit eingelegtem Aluminiumpulpefolie und aufgefüllt mit Watten.

Blisterverpackung: 10, 30, 60, 90, 120 Filmtabletten

Flasche: 60 Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Sandoz nv/sa, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde

Hersteller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Warschau, Polen

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Deutschland

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slowenien

Zulassungsnummer

Blisterpackung: BE467884

HDPE Flasche: BE467893

Art der Abgabe

Verschreibungspflichtig.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

AT	Valganciclovir Sandoz 450 mg - Filmtabletten
BE	Valganciclovir Sandoz 450 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
DE	Valganciclovir HEXAL 450 mg Filmtabletten
DK	Valganciclovir "Sandoz"
EE	Valganciclovir Sandoz 450 mg õhukese polümeerikattega tabletid
FI	Valganciclovir Sandoz 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen
FR	VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg, comprimé pelliculé
IT	Valganciclovir Sandoz 450 mg compresse rivestite con film
LT	Valganciclovir Sandoz 450 mg plėvele dengtos tabletės
LV	Valganciclovir Sandoz 450 mg apvalkotās tabletes
NL	Valganciclovir Sandoz 450 mg, filmomhulde tabletten
NO	Valganciclovir Sandoz 450 mg filmdrasjerte tabletter
PL	CEGLAR, 450 MG, TABLETKI POWLEKANE
SE	Valganciclovir Sandoz 450 mg filmdragerade tabletter

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2025.