

II. BIJSLUITER

BIJSLUITER
Chanazone 1 g, poeder voor oraal gebruik bij paarden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea
Co. Galway,
Ireland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Chanazone 1 g, poeder voor oraal gebruik voor paarden.
Fenylbutazone.

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDDD(E)L(EN)

Elk zakje van 5 g bevat 1 g fenylbutazone.
Gebroken wit tot geel poeder.

4. INDICATIE(S)

Het diergeneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van musculoskeletale aandoeningen bij paarden, waar pijnbestrijding en een vermindering van de bijkomende ontsteking noodzakelijk zijn. Voorbeelden zijn kreupelheid geassocieerd met osteoarthritis, bursitis, laminitis en ontsteking van de zachte weefsels, vooral wanneer continue mobiliteit gewenst is.

Het is ook waardevol bij het inperken van postoperatieve ontstekingen, myositis en andere ontstekingen van de zachte weefsels.

Fenylbutazone poeder kan worden gebruikt als antipyreticum wanneer dit raadzaam is, bijv. bij virale luchtweginfecties.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen, wanneer het risico op gastro-intestinale ulceratie of bloedingen bestaat of wanneer er sprake is van bloeddyscrasie.

Niet gebruiken bij dieren met schildklierstoornissen.

Niet gebruiken bij dieren met ernstige hypertonie.

Niet gebruiken bij dieren met laesies in het darmslijmvlies, veroorzaakt door parasitaire infecties.

6. BIJWERKINGEN

Net als bij andere NSAID's die de prostaglandinesynthese remmen, kan er maag- en/of nierintolerantie optreden. Dit gaat meestal gepaard met overdosering en dergelijke voorvallen komen zelden voor (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren). Herstel is gebruikelijk na het stopzetten van de behandeling en na de start van een ondersteunende symptomatische behandeling (zie 12 voor meer informatie).

Bloeddyscrasie kan optreden.

Pony's zijn zeer gevoelig voor maagzweren met dit diergeneesmiddel, zelfs bij therapeutische dosissen (diarree, zweren in de mond en hypoproteïnemie kunnen eveneens voorkomen).

Indien er bijwerkingen optreden, moet de behandeling worden gestaakt en een dierenarts worden geraadpleegd.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Paarden (niet bestemd voor menselijke consumptie).

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Oraal gebruik.

De aanbevolen dosering is 4,4 - 8,8 mg/kg per dag.

Per 450 kg lichaamsgewicht dient het volgende doseringsadvies te worden gevolgd op basis van de individuele respons:

Dag 1 4,4 mg fenylbutazone/kg lichaamsgewicht tweemaal daags (equivalent aan 2 zakjes of 10 g diergeneesmiddel tweemaal daags).

Dag 2-4 2,2 mg fenylbutazon/kg lichaamsgewicht tweemaal daags (equivalent aan 1 zakje of 5 g van het diergeneesmiddel tweemaal daags), gevolgd door 2,2 mg fenylbutazon/kg lichaamsgewicht eenmaal daags (equivalent aan 1 zakje of 5 g van het diergeneesmiddel eenmaal daags) of om de dag, zoals nodig.

Indien er na 4-5 dagen geen zichtbare respons is, dient u de behandeling stop te zetten. Hooi kan de absorptie van fenylbutazone en dus het begin van een klinisch effect vertragen. Het is raadzaam om geen hooi te geven onmiddellijk voor of tijdens de toediening van het diergeneesmiddel.

Voor een gemakkelijke toediening kan het diergeneesmiddel voor elke behandeling worden gemengd met een portie zemelen of haver.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De therapeutische index van fenylbutazon is laag. De aangegeven dosis of behandelingsduur niet overschrijden.

10. WACHTTIJD(EN)

Niet te gebruiken bij paarden die voor humane consumptie bestemd zijn.

Behandelde paarden mogen nooit worden geslacht voor humane consumptie.

Het paard moet worden verklaard als niet bestemd voor humane consumptie onder de nationale paardenpaspoortwetgeving.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos en het zakje na EXP.

De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

De klinische effecten van fenylbutazone kunnen gedurende ten minste drie dagen na beëindiging van de behandeling zichtbaar zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het gezondheidsonderzoek van het paard.

De Internationale Paardensportfederatie (FEI) beschouwt fenylbutazone als een verboden stof in het kader van deelname van het behandelde paard aan paardensportevenementen. Een paard, dat onder behandeling van het diergeneesmiddel staat of recent behandeld is geweest, kan mogelijk de deelname aan sportevenementen worden onthouden. Raadpleeg de aanbevelingen van de FEI, de nationale wetten en de regels van de nationale bond voor de wachttijden voorafgaand aan een wedstrijd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Aangezien de therapeutische index van fenylbutazone laag is, mag de vermelde dosering van 8,8 mg/kg/dag niet worden overschreden.

Gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oude dieren kan bijkomende risico's inhouden. Als het gebruik niet kan worden vermeden, is een zorgvuldige klinische monitoring van de dieren noodzakelijk.

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren aangezien er een risico op verhoogde niertoxiciteit bestaat. Houd tijdens de behandeling steeds water beschikbaar om uitdroging te voorkomen.

NSAID's kunnen een remming van de fagocytose veroorzaken. Bij de behandeling van inflammatoire aandoeningen die gepaard gaan met bacteriële infecties dient bijgevolg een geschikte gelijktijdige antimicrobiële therapie te worden overwogen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheid (allergische reacties) veroorzaken bij personen die zijn gesensibiliseerd voor fenylbutazone, via huidcontact of accidentele inademing.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor fenylbutazone of voor één van de hulpstoffen moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

In geval van optreden van symptomen na blootstelling, zoals huiduitslag, dient u een arts te raadplegen en hem deze waarschuwing te tonen. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen of moeilijkheden met ademen zijn ernstigere symptomen die met spoed medische hulp vereisen.

Dit diergeneesmiddel kan irriterend zijn voor de huid en ogen. Vermijd contact met de ogen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen met schoon water. Bij blijvende irritatie dient u een arts te raadplegen.

Ingestie of inhalatie van het poeder te allen tijde vermijden. In geval van accidentele ingestie of inhalatie dient een arts te worden geraadpleegd en de productverpakking te worden getoond. Was blootgestelde huid en de handen na gebruik.

Dracht en lactatie:

Voorzichtigheid is geboden bij toediening aan drachtige merries. Hoewel er geen nadelige effecten van fenylbutazone op de foetus of de zwangerschap zijn gemeld tijdens het gebruik in de praktijk, werden er geen definitieve veiligheidsonderzoeken uitgevoerd bij merries.

Bij hoge doseringen bij proefdieren zijn foetotoxische effecten van fenylbutazone waargenomen.

Fenylbutazone bij drachtige en zogende merries uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts. Vermijd het gebruik ervan rond de tijd van de partus.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Andere NSAID's mogen niet gelijktijdig of binnen 24 uur worden toegediend.

Gelijktijdige toediening van potentieel nefrotoxische geneesmiddelen dient te worden vermeden.

Fenylbutazone veroorzaakt hepatische microsomale enzymactiviteit.

Er is risico op verhoogde niertoxiciteit na gelijktijdige toediening van aminoglycosiden.

Gelijktijdig gebruik van glucocorticoïden, andere NSAID's of anticoagulantia versterkt de bijwerkingen van fenylbutazone.

De therapeutische werkzaamheid van diuretica kan verminderen wanneer ze worden gebruikt in combinatie met producten die fenylbutazon bevatten.

Fenylbutazon is in hoge mate gebonden aan plasma-eiwitten. Het kan andere geneesmiddelen die sterk eiwitgebonden zijn verdringen, bijv. sommige sulfonamiden, warfarine. Het kan ook zelf worden

verdrongen, wat leidt tot een toename van niet-gebonden farmacologisch werkzame concentraties, met mogelijke toxische effecten tot gevolg.

Een gelijktijdige behandeling met andere therapeutische middelen moet met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd wegens het risico op metabole interacties. Fenylobutazone kan interfereren met het metabolisme van andere geneesmiddelen zoals warfarine en barbituraten, met toxiciteit tot gevolg.

Het werd aangetoond dat de farmacokinetische eigenschappen van penicilline en gentamicine kunnen worden beïnvloed door de gelijktijdige toediening van producten die fenylobutazone bevatten. Dit kan leiden tot een verminderde therapeutische werking, aangezien de weefselpenetratie kan afnemen. De verdeling van andere gelijktijdig toegediende geneesmiddelen kan ook worden beïnvloed.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Overdosering kan leiden tot zweren in de maag en dikke darm en algemene enteropathie. Renale papillaire schade kan ook optreden met een verminderde nierfunctie tot gevolg. Subcutaan oedeem, vooral onder de kaak, kan optreden ten gevolge van plasmaproteïneverlies.

Bij overdosering werden CZS-effecten (opwinding, toevallen), hematurie en acidose waargenomen.

Er is geen specifiek antidotum. Als er tekenen van mogelijke overdosering optreden, dient het dier symptomatisch te worden behandeld.

Onverenigbaarheden:

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

**13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Januari 2021

15. OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgrootte: zakjes van 5 g verkrijgbaar in verpakkingen van 16 en 100 zakjes.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

BE-V504062

Op diergeneeskundig voorschrift.