

**BUCCOVE**

RSC



zuigtabletten

**Chloorhexidi**

**ne**

**hydrochlorid**

**e - Lidocaïne**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**hydrochloride**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Buccoverso en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Buccoverso niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

### **1. WAT IS BUCCOVERSO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Buccoverso is een zuigtablet voor plaatselijke werking in mond en keelholte.

Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Buccoverso is aangewezen bij:

- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie;
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig;
- Buccoverso bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

## **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

### **Wanneer mag u Buccoverso niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Buccoverso?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Buccoverso gebruikt.

- Buccoverso mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Bij jonge kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben. Dit geneesmiddel bevat namelijk menthol.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Kinderen**

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Buccoverso nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesteraseremmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u bovengenoemde voorzorgen respecteert, mag u Buccoverso gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

### **Buccoverso bevat menthol en sorbitol**

Buccoverso bevat menthol: wees voorzichtig bij kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben.

Buccoverso bevat 1208,5 mg sorbitol per tablet, overeenkomend met 0,97 mg/mg tablet. Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit geneesmiddel gebruikt. Sorbitol kan maag-darmklachten veroorzaken en een licht laxerende werking hebben.

### 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik Buccoverso altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

*Volwassenen:* 6 tot 10 tabletten per dag.

#### **Gebruik bij kinderen**

*Kinderen vanaf 6 jaar:* 3 tot 5 tabletten per dag.

De tablet langzaam in de mond opzuigen.

Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

#### **Heeft u te veel van Buccoverso gebruikt?**

Wanneer u te veel van Buccoverso heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dit geneesmiddel bevat slechts een fractie van de toxische dosis. Bij goed gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein.

Symptomen van overdosering zijn: rusteloosheid, oorsuizingen, ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van het hartritme, vermindering van de controle op de slikreflex.

#### **Bent u vergeten Buccoverso te gebruiken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

#### **Als u stopt met het gebruik van Buccoverso**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Buccoverso bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Er kunnen smaakstoornissen, een branderig gevoel aan de tong en ernstige allergische reacties (anafylactische reacties) optreden.

- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Postbus 97

1000 BRUSSEL Madou

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Buccoverso niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/de blisterverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.**

### **Welke stoffen zitten er in Buccoverso?**

- De werkzame stoffen in Buccoverso zijn: chloorhexidine hydrochloride 5 mg - lidocaïne hydrochloride 1 mg.
- De andere stoffen in Buccoverso zijn: sorbitol - magnesiumstearaat - watervrij citroenzuur - menthol.

### **Hoe ziet Buccoverso eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Buccoverso is verkrijgbaar in een doos met 40 zuigtabletten in blisterverpakking, in een doos met 12, 36 of 48 zuigtabletten in geperforeerde eenheidsblisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE464773

### **Afleveringswijze**

Vrije aflevering.

**Deze bijsluiters is voor het laatst goedgekeurd in 10/2021.**

