

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### MEDICA HALSTABLETTEN ERDBEERE 5 mg/1 mg Lutschtabletten, gepresst

Chlorhexidin Dihydrochlorid - Lidocain Hydrochlorid Monohydrat

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Medica Halstabletten Erdbeere und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medica Halstabletten Erdbeere beachten?
3. Wie ist Medica Halstabletten Erdbeere anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Medica Halstabletten Erdbeere aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### 1. Was ist Medica Halstabletten Erdbeere und wofür wird es angewendet?

Medica Halstabletten Erdbeere ist eine Lutschtablette für die lokale Anwendung im Mund- und Rachenraum.

Es ist ein Desinfektionsmittel und lokal schmerzstillendes Mittel.

Medica Halstabletten Erdbeere ist angezeigt bei:

- Behandlung der Symptome von Halsschmerzen, rotem Hals, Erkrankungen des Rachens mit Reizungen.

Im Fall einer bakteriellen Infektion mit Fieber ist eine ergänzende Behandlung erforderlich.

Medica Halstabletten Erdbeere enthält keinen Zucker und ist folglich auch für Diabetiker geeignet.

Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medica Halstabletten Erdbeere beachten?**

### **Medica Halstabletten Erdbeere darf nicht angewendet werden,**

- Wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidin Dihydrochlorid oder Lidocain Hydrochlorid Monohydrat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei Kindern unter 6 Jahren.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Medica Halstabletten Erdbeere anwenden.

- Medica Halstabletten Erdbeere darf nicht langanhaltend, ununterbrochen oder immer wieder verwendet werden. Beschränken Sie die Anwendung lediglich auf die notwendige Linderung von Schmerzen und Reizungen.
- Wenn eine zu hohe Dosis verwendet wird (mehr als 20 Tabletten pro Tag), besteht ein geringes Risiko einer verminderten Kontrolle des Schluckreflexes.
- Bei Kleinkindern, die schon einen Krampfanfall gehabt haben. Dieses Arzneimittel enthält nämlich Menthol.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch den Abschnitt: „Anwendung von Medica Halstabletten Erdbeere zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

### **Kinder**

Dieses Arzneimittel darf nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

### **Anwendung von Medica Halstabletten Erdbeere zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

- Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln für leichte Formen von Alzheimer (Cholinesterasehemmern) anwenden.
- Nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

### **Anwendung von Medica Halstabletten Erdbeere zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie die vorangegangenen Vorsichtsmaßnahmen beachten, können Sie Medica Halstabletten Erdbeere während der Schwangerschaft und der Stillzeit anwenden. Informieren Sie Ihren Arzt über die Anwendung dieses Arzneimittels.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Medica Halstabletten Erdbeere enthält Sorbitol (E420) und Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält 1189,9 mg Sorbitol pro Tablette. Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) - eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann - festgestellt wurde. Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen und kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

### **3. Wie ist Medica Halstabletten Erdbeere anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

*Erwachsene:* 6 bis 10 Tabletten pro Tag.

#### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

*Kinder ab 6 Jahren:* 3 bis 5 Tabletten pro Tag.

Die Tablette langsam lutschen.

Dieses Arzneimittel darf nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, falls sich die Symptome verschlimmern oder nach 3 bis 4 Tagen keine Besserung eintritt.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Medica Halstabletten Erdbeere angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Medica Halstabletten Erdbeere angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Dieses Arzneimittel enthält lediglich einen Bruchteil einer toxischen Dosis. Bei richtiger Anwendung sind die Risiken einer Überdosierung sehr gering.

Symptome einer Überdosierung sind: Ruhelosigkeit, Ohrensausen, Atmungsschwierigkeiten, Herzrhythmusstörungen, Verminderung der Kontrolle des Schluckreflexes.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Sehr selten: allergische Haut- und Schleimhautreaktionen.

- Es kann zu Geschmacksstörungen, einem brennenden Gefühl auf der Zunge und ernstliche allergische Reaktionen (anaphylaktischen Reaktionen) kommen.
- Bei langanhaltender, ununterbrochener Anwendung kann eine bräunliche Verfärbung der Zähne auftreten. Diese Verfärbung ist jedoch leicht zu entfernen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

#### **Belgien:**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - Abteilung Vigilanz – Postfach 97, 1000 BRÜSSEL, Madou – Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be) – e-mail: adr@fagg-afmps.be.

#### **Luxemburg:**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé - Site internet: [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance). Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Medica Halstabletten Erdbeere aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Schachtel/der Blisterpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.**

#### **Was Medica Halstabletten Erdbeere enthält**

- Die Wirkstoffe sind: Chlorhexidin Dihydrochlorid 5 mg - Lidocain Hydrochlorid Monohydrat 1 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Sorbitol (E420) - Magnesiumstearat - Zitronensäure, wasserfrei - Menthol – Erdbeeraroma (enthält Natrium) - Sucralose.

Siehe Abschnitt 2, „Medica Halstabletten Erdbeere enthält Sorbitol (E420) und Natrium“.

#### **Wie Medica Halstabletten Erdbeere aussieht und Inhalt der Packung**

Packung mit 40 Lutschtabletten, gepresst, in Blisterpackung, Packung mit 12, 36 oder 48 Lutschtabletten, gepresst in Folienstreifen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgien

**Zulassungsnummer**

BE464782

LU: 2017040106

**Art der Abgabe**

Freie Abgabe.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 05/2023.**