

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Lescol Exel 80 mg tabletten met verlengde afgifte

Fluvastatine

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Lescol Exel en waarvoor wordt Lescol Exel ingenomen?
2. Wanneer mag u Lescol Exel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Lescol Exel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lescol Exel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. WAT IS LESCOL EXEL EN WAARVOOR WORDT LESCOL EXEL INGENOMEN?**

Lescol Exel bevat het werkzaam bestanddeel fluvastatine natrium, wat behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd statines; dit zijn lipide-verlagende geneesmiddelen: ze verlagen het vet (lipides) in uw bloed. Ze worden gebruikt bij patiënten, van wie de omstandigheden niet kunnen worden gecontroleerd door middel van alleen dieet en inspanning.

- Lescol Exel is een geneesmiddel dat gebruikt wordt **om verhoogde waarden van vetten in het bloed van volwassenen te behandelen**, met name gehele cholesterol en de zogenaamde "slechte" of LDL cholesterol, welke gerelateerd is aan een verhoogde kans op hartkwalen en beroerte
  - o bij volwassen patiënten met hoge bloedwaarden van cholesterol
  - o bij volwassen patiënten met hoge bloedwaarden van zowel cholesterol als triglycerides (een ander soort lipides in het bloed)
- Uw arts kan ook Lescol Exel voorschrijven ter voorkoming van verdere ernstige hartaandoeningen (bijv. hartaanval) bij patiënten nadat ze al een hartcatheterisatie, met een interventie in het hartbloedvat, hebben ondergaan.

Als u vragen hebt over de werking van Lescol Exel, of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleegt u uw arts.

#### **2. WANNEER MAG U LESCOL EXEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

Volg alle instructies van uw arts nauwkeurig op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

Lees de volgende informatie voordat u Lescol Exel gebruikt.

#### **Wanneer mag u Lescol Exel niet gebruiken?**

- u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u

vinden in rubriek 6.

- als u momenteel leverproblemen heeft, of als u onverklaarde aanhoudende verhoogde waarden van bepaalde leverenzymen (transaminasen) heeft.
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft (zie “Zwangerschap en borstvoeding”).

Als één van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan geen Lescol Exel in en informeer uw arts.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lescol Exel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Lescol Exel inneemt.

- als u het geneesmiddel fusidinezuur (een geneesmiddel tegen bacteriële infecties) gebruikt of in de afgelopen 7 dagen hebt gebruikt, peroraal dan wel per injectie. Fusidinezuur kan in combinatie met Lescol Exel leiden tot ernstige spierproblemen (rhabdomyolyse).
- als u eerder een leverziekte heeft gehad. Leverfunctietesten zullen gewoonlijk worden uitgevoerd voordat u start met Lescol Exel, wanneer uw dosis wordt verhoogd en op verschillende intervallen tijdens de behandeling om te controleren op bijwerkingen.
- als u een nierziekte heeft.
- als u een schildklierziekte (hypothyroïdisme) heeft.
- als uzelf of uw familie een medische geschiedenis van spierziekten heeft.
- als u spierproblemen heeft gehad met een ander lipideverlagend geneesmiddel.
- als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt.
- als u een ernstige infectie heeft.
- als u een zeer lage bloeddruk heeft (mogelijke tekenen zijn duizeligheid, ijlhoofdigheid).
- als u gecontroleerde of ongecontroleerde overmatige spierinspanning levert.
- als u een operatie moet ondergaan.
- als u ernstige metabole, endocriene of elektrolytenstoornissen vertoont zoals gedecompenseerde suikerziekte of een laag kaliumgehalte in het bloed.
- als u myasthenie (een ziekte waarbij algemene spierzwakte optreedt, in sommige gevallen ook in spieren die worden gebruikt bij de ademhaling) of oculaire myasthenie (een ziekte die oogspierzwakte veroorzaakt) heeft of heeft gehad, aangezien statines de aandoening soms kunnen verergeren of kunnen leiden tot het optreden van myasthenie (zie rubriek 4).

Wanneer u dit geneesmiddel inneemt zal uw arts u van nabij opvolgen als u diabetes heeft of als u een risico heeft om diabetes te ontwikkelen. U heeft waarschijnlijk een risico om diabetes te ontwikkelen als u een hoge suikerspiegel en vetten in uw bloed, overgewicht of hoge bloeddruk heeft.

### **Ga bij uw arts of apotheker na, voordat u Lescol Exel inneemt**

- of u ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft

Als één van deze omstandigheden op u van toepassing is, **informeer dan uw arts voordat u Lescol Exel gebruikt**. Uw arts zal een bloedtest uitvoeren voordat uw arts Lescol Exel voorschrijft.

Vertel het uw arts of apotheker ook als u een spierzwakte heeft die constant aanwezig is. Er kunnen extra tests en geneesmiddelen nodig zijn om in dit geval een diagnose te stellen en te behandelen.

Als u tijdens behandeling met Lescol Exel symptomen of tekenen ontwikkelt zoals misselijkheid, braken, verlies van eetlust, gele ogen of huid, verwardheid, euforie of depressie, geestelijke traagheid, spraakstoornissen, slaapstoornissen, bevingen of gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen, kunnen dat tekenen zijn van leverfalen. In een dergelijk geval moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

### **Lescol Exel en mensen ouder dan 70 jaar**

Als u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts willen uitzoeken of u risicofactoren heeft voor spierziekten. Hiervoor kunt u specifieke bloedtesten nodig hebben.

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Lescol Exel is niet onderzocht en niet bedoeld voor kinderen onder de 9 jaar. Voor informatie over doseringen bij kinderen en jongvolwassenen ouder dan 9 jaar, zie rubriek 3.

Er is geen ervaring in kinderen en jongvolwassenen met het gebruik van fluvastatine in combinatie met nicotinezuur, colestyramine of fibraten.

### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Neemt u naast Lescol Exel nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u voor de behandeling van een bacteriële infectie fusidinezuurtabletten moet innemen, moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van Lescol Exel. Uw arts zal u vertellen wanneer u Lescol Exel weer veilig kunt gaan gebruiken. Gebruik van Lescol Exel samen met fusidinezuur kan in zeldzame gevallen leiden tot spierzwakte, gevoeligheid of pijn van de spieren (rabdomyolyse). Zie rubriek 4 voor meer informatie over rabdomyolyse.

Lescol Exel kan met of zonder andere cholesterolverlagende geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door uw arts worden gebruikt.

Wacht met het innemen van Lescol Exel tot ten minste 4 uur na het innemen van een hars, bijv. colestyramine (voornamelijk ingenomen om hoog cholesterolgehalte te behandelen).

Vertel uw arts en apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- Ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken).
- Fibraten (bijv. gemfibrozil), nicotinezuur of galzuurverbindingen (geneesmiddelen die worden gebruikt om spiegels van slecht cholesterol te verlagen).
- Fluconazol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen).
- Rifampicine (een antibioticum).
- Fenytoïne (een geneesmiddel om epilepsie te behandelen).
- Orale anticoagulantia zoals warfarine (geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedklontering te verminderen).
- Glibenclamide (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om suikerziekte te behandelen).
- Colchicines (middel tegen jicht).

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Neem geen Lescol Exel in als u zwanger bent of borstvoeding geeft, aangezien het werkzaam bestanddeel uw ongeboren kind mogelijk kan schaden en het niet bekend is of het werkzaam bestanddeel wordt uitgescheiden in menselijke moedermelk.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik betrouwbare anticonceptiemiddelen gedurende de gehele tijd dat u Lescol Exel inneemt.

Als u zwanger wordt tijdens inname van dit geneesmiddel, zet dan de inname van Lescol Exel stop en ga naar uw arts. Uw arts zal met u bespreken welk risico de inname van Lescol Exel tijdens de zwangerschap kan inhouden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er is geen informatie over de effecten van Lescol Exel op uw vermogen om te rijden en machines te bedienen.

## **3. HOE NEEMT U LESCOL EXEL IN?**

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Overschrijd de aanbevolen dosering niet.

Uw arts zal u aanraden om een cholesterol-arm dieet te volgen. Blijf dit dieet volgen terwijl u Lescol Exel gebruikt.

### **Hoeveel Lescol Exel in te nemen**

#### **Aanbevolen doseringen bij volwassenen**

De dosis range van fluvastatine voor volwassenen is 20 tot 80 mg per dag, afhankelijk van de mate van cholesterol verlaging die bereikt moet worden. Aanpassingen van de dosis kunnen door uw arts worden doorgevoerd met tussenposen van 4 of meer weken.

#### **Gebruik bij kinderen en jongeren**

Voor kinderen (9 jaar en ouder) is de gebruikelijke startdosis 20 mg fluvastatine per dag. De dagelijkse maximum dosis is 80 mg. Aanpassingen van de dosis kunnen door uw arts worden doorgevoerd met tussenposen van 6 weken.

Uw arts zal u precies vertellen hoeveel fluvastatine u moet innemen.

Afhankelijk van uw reactie op de behandeling kan uw arts een hogere of lagere dosering voorschrijven.

### **Wanneer Lescol Exel in te nemen**

Als u Lescol Exel tabletten inneemt, kunt u uw dosis op elk tijdstip van de dag innemen. Lescol Exel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Slik het geheel door met een glas water.

### **Heeft u te veel van Lescol Exel ingenomen?**

Wanneer u teveel tabletten van Lescol Exel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antifgifcentrum (070/245.245).

Als u per ongeluk te veel Lescol Exel hebt ingenomen, moet u meteen contact opnemen met uw arts. U hebt misschien medische zorg nodig.

### **Bent u vergeten Lescol Exel in te nemen?**

Neem één dosis in zodra u er aan denkt. Maar neem het niet in als het minder dan 4 uur vóór uw volgende dosis is. In dit geval neemt u uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het innemen van Lescol Exel**

Om de voordelen van uw behandeling te handhaven moet u niet stoppen met het gebruik van Lescol Exel, tenzij uw arts u dat heeft verteld. U moet doorgaan met het gebruik van Lescol Exel volgens instructies om de spiegels van uw 'slechte' cholesterol laag te houden.

Lescol Exel zal uw aandoening niet genezen, maar het helpt het onder controle te houden. Uw cholesterolspiegels moeten regelmatig worden gecontroleerd om uw vooruitgang te controleren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige zeldzame (treffen tot 1 op de 1000 gebruikers) of zeer zeldzame (treffen tot 1 op de 10000 gebruikers) bijwerkingen kunnen ernstig zijn: haal direct medische assistentie.

- als u onverklaarde spierpijn, gevoeligheid of zwakheid heeft. Dit kunnen vroege tekenen van een mogelijk ernstige spierafbraak zijn. Dit kan worden vermeden als uw arts uw behandeling met fluvastatine zo snel mogelijk stopt. Deze bijwerkingen zijn ook gezien bij vergelijkbare geneesmiddelen in deze klasse (statines).
- als u ongebruikelijke vermoeidheid of koorts heeft, geelkleuring van de huid en ogen, donkergekleurde urine (tekenen van hepatitis).
- als u tekenen van huidreacties heeft, zoals huiduitslag, netelroos, roodheid, jeuk, zwelling van gelaat, oogleden en lippen.
- als u zwelling van de huid heeft, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid (tekenen van ernstige allergische reactie).
- als u gemakkelijker dan normaal bloedt of blauwe plekken krijgt (tekenen van verlaagde bloedplaatjesaantal).
- als u rode of paarse huidletsels krijgt (tekenen van bloedvatontsteking).
- als u rode gevlekte uitslag, vooral in het gezicht, heeft gepaard gaand met vermoeidheid, koorts, misselijkheid, verlies van eetlust (tekenen van lupus erythematosus-achtige reactie).
- als u ernstige pijn boven in de maag heeft (tekenen van ontstoken alvleesklier).

Als u één van deze bijwerkingen ervaart, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts.

Andere bijwerkingen: vertel het aan uw arts als u zich hierover zorgen maakt.

*Vaak (treffen tot 1 op de 10 gebruikers):* Slaapproblemen, hoofdpijn, maagklachten, buikpijn, misselijkheid, abnormale bloedwaarden voor spier- en levertests.

*Zeer zelden (treffen tot 1 op de 10000 gebruikers):* Tintelingen of stijfheid van handen of voeten, gestoord of verminderd gevoel.

*Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):*

- Impotentie, spierzwakte die constant aanwezig is, ademhalingsmoeilijkheden, waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts.
- Diarree
- Myasthenia gravis (een ziekte die algemene spierzwakte veroorzaakt, in sommige gevallen in spieren die worden gebruikt bij de ademhaling)
- oculaire myasthenie (een ziekte die oogspierzwakte veroorzaakt)

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van zwakte in uw armen of benen die verergert na perioden van activiteit, dubbelzien of hangende oogleden, moeite met slikken of kortademigheid.

Andere mogelijke bijwerkingen

- slaapstoornissen, waaronder slapeloosheid en nachtmerries
- geheugenverlies
- sexuele moeilijkheden

- neerslachtigheid (depressie)
- diabetes. U heeft waarschijnlijk een risico om diabetes te ontwikkelen als u een hoge suikerspiegel en vetten in uw bloed, overgewicht of hoge bloeddruk heeft. Uw arts zal u volgen terwijl u dit geneesmiddel neemt.
- peesontsteking met irritatie en zwelling

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

#### **België**

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 1210 Brussel	Postbus 97 B-1000 Brussel Madou
----------------------------------	------------------------------------

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### **5. HOE BEWAART U LESCOL EXEL?**

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Lescol Exel bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
- Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of als er mee geknoeid is.
- Laat uw tablet Lescol Exel in de blisterverpakking zitten tot u ze nodig hebt voor gebruik, ter bescherming tegen vocht.
- Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

#### **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

##### **Welke stoffen zitten er in Lescol Exel?**

- De werkzame stof in Lescol Exel is fluvastatine natrium.  
Elke Lescol Exel 80 mg tablet bevat 84,24 mg fluvastatine natrium overeenkomend met 80 mg fluvastatine vrij zuur.
- De andere stoffen in Lescol Exel zijn:  
microkristallijne cellulose, hypromellose, hydroxypropylcellulose, kalium waterstofcarbonaat, povidone, magnesiumstereaat, macrogol 8000, geel ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171).

##### **Hoe ziet Lescol Exel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Lescol Exel 80 mg tabletten met verlengde afgifte zijn geel, rond, licht biconvex met schuine randen. Ze hebben de letters "LE" aan één kant en "NVR" aan de andere.

- *Flessen*: De tabletten met verlengde afgifte zijn beschikbaar in verpakkingen van 28, 30, 50, 98 of 100 (2 x 50 of 1 x 100) tabletten en in hospitaalverpakkingen van 300 (15x 20) of 600 (30 x 20) tabletten.

- *Blisterverpakkingen*: De tabletten met verlengde afgifte zijn beschikbaar in verpakkingen van 7, 14, 28 (4 x 7 of 2 x 14), 28 (in een geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakking), 30, 42, 49 (7 x 7), 56 (8 x 7), 70, 84, 90 of 98 (14 x 7 of 7 x 14) tabletten en in hospitaalverpakkingen van 28, 56, 98 of 490 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

#### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

ETHYX PHARMACEUTICALS

19 Rue Duquesne

69006 LYON

Frankrijk

#### Fabrikant

Novartis Pharma nv/sa, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde, België

Novartis Pharma GmbH, Jakob-Lind-Straße 5, Top 3.05, 1020 Wien, Oostenrijk

Demetriades and Papaellinas Ltd, 179 Giannos Kranidiotis avenue, Latsia, Nicosia, 2235, Cyprus

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Duitsland

Novartis (HELLAS) S.A.C.I., 12th km. National Road Athens-Lamia, 14451 Metamorphoses, Griekenland

Novartis Hungária Kft., Bartók Béla út 43-47, 1114 Budapest, Hongarije

Novartis Farma S.P.A., Via Provinciale Schito, 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italië

Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A., Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n° 10E, Taguspark, 2740-255, Porto Salvo, Portugal

Novartis Farmaceutica S.A., Gran Via de les Corts Catalanes 764, 08013 Barcelona, Spanje

Novartis Norge AS, Nydalen Allé 37 A, NO-0484 Oslo, Noorwegen

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vei 14, 2300 København S, Denemarken

Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista, Zweden

Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam, Nederland

Novartis s.r.o., Na Pankraci 1724/129, 140 00 Prague 4, Tsjechië

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, Finland

Novartis Poland Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warsaw, Polen

Novartis Farma S.p.A., Viale Luigi Sturzo 43, 20154 - Milano (MI), Italië

Novartis Pharma S.A.S., 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, 2<sup>nd</sup> Floor, The West Works Building, White City Place, 195 Wood Lane, London, W12 7FQ, Verenigd Koninkrijk

### **Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen**

Lescol Exel 80 mg tabletten met verlengde afgifte (alu-alu blisterverpakking): BE230386

Lescol Exel 80 mg tabletten met verlengde afgifte (HDPE fles): BE230395

### **Afleveringswijze**

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) onder de volgende namen:

80 mg tabletten met verlengde afgifte

<b>Naam van de lidstaat</b>	<b>Naam van het geneesmiddel</b>
<b>Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)</b>	<b>Lescol XL</b>
<b>Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden</b>	<b>Lescol Depot</b>
<b>Duitsland</b>	<b>Fluvastatin Novartis</b>
<b>Oostenrijk</b>	<b>Lescol MR</b>
<b>België, Luxemburg</b>	<b>Lescol Exel</b>
<b>Frankrijk</b>	<b>Lescol LP</b>
<b>Duitsland</b>	<b>Locol</b>
<b>Italië</b>	<b>Lescol, Lipaxin</b>
<b>Portugal</b>	<b>Canef</b>
<b>Spanje</b>	<b>Lescol Prolib, Liposit Prolib, Vaditon Prolib, Digaril Prolib</b>

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2023.