

NOTICE: INFORMATION DU PATIENT

Etoricoxib EG 30 mg comprimés pelliculés
Etoricoxib EG 60 mg comprimés pelliculés
Etoricoxib EG 90 mg comprimés pelliculés
Etoricoxib EG 120 mg comprimés pelliculés

Etoricoxib

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce qu'Etoricoxib EG et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Etoricoxib EG?
3. Comment prendre Etoricoxib EG?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Etoricoxib EG?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Etoricoxib EG et dans quel cas est-il utilisé?

Qu'est-ce qu'Etoricoxib EG?

- Etoricoxib EG contient la substance active étoricoxib. L'étoricoxib appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2). Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quel cas Etoricoxib EG est-il utilisé?

- Etoricoxib EG contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les personnes âgées de 16 ans et plus atteintes d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.
- Etoricoxib EG est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

Qu'est que l'arthrose?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os. Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque des douleurs, une raideur, des gonflements et une perte progressive du mouvement des articulations atteintes. Elle peut entraîner également une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte?

La goutte est une maladie qui se caractérise par des crises soudaines et récurrentes associant une inflammation très douloureuse et une rougeur au niveau des articulations.

Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des grandes articulations.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Etoricoxib EG?

Ne prenez jamais Etoricoxib EG:

- si vous êtes allergique à l'étoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- si vous êtes allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'acide acétylsalicylique et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 (voir rubrique 4 « Effets indésirables éventuels »)
- si vous souffrez actuellement d'un ulcère ou saignement gastro-intestinal
- si vous souffrez d'une maladie grave du foie
- si vous souffrez d'une maladie grave des reins
- si vous êtes enceinte ou pourrait être enceinte, ou si vous allaitez (voir 'Grossesse, allaitement et fertilité')
- si vous êtes âgé(e) de moins de 16 ans
- si vous souffrez d'une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, rectocolite hémorragique ou colite
- si vous souffrez d'hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin si vous n'êtes pas sûr que votre pression artérielle soit bien contrôlée).
- si votre médecin a diagnostiqué des problèmes cardiaques, y compris une insuffisance cardiaque (formes modérées ou sévères), angine de poitrine (douleur thoracique)
- si vous avez des antécédents de crise cardiaque, de pontage coronarien, de maladie des artères périphériques (mauvaise circulation dans les jambes ou les pieds due à des artères rétrécies ou bouchées)
- si vous avez des antécédents de toute sorte d'accident vasculaire cérébral (y compris un mini-AVC, un accident ischémique transitoire ou AIT). L'étoricoxib pourrait légèrement augmenter votre risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, et c'est la raison pour laquelle la substance ne doit pas être utilisée chez les personnes ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Etoricoxib EG, si:

- vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère à l'estomac.
- vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée.
- vous avez des œdèmes dus à une rétention d'eau.
- vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque.
- vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. Etoricoxib EG peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier à doses élevées, et votre médecin voudra de temps en temps contrôler votre tension sanguine.
- vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins.
- vous êtes traité pour une infection. Etoricoxib EG peut masquer ou cacher une fièvre, qui est un signe d'infection.

- vous souffrez de diabète, avez un taux de cholestérol élevé ou êtes fumeur(se). Ces conditions peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque.
- vous êtes une femme qui essaie d'être enceinte.
- vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des points ci-dessus vous concerne, **contactez votre médecin avant de prendre Etoricoxib EG** pour vérifier si ce médicament est adapté à votre cas.

Etoricoxib EG est aussi efficace chez l'adulte âgé que chez l'adulte jeune. Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, votre médecin voudra vous surveiller de manière appropriée. Aucun ajustement de posologie n'est nécessaire pour les patients âgés de plus de 65 ans.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Autres médicaments et Etoricoxib EG

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, si vous prenez l'un des médicaments suivants, votre médecin voudra peut-être vous contrôler pour vérifier que vos médicaments agissent correctement, après avoir débuté la prise d'Etoricoxib EG.

- médicaments qui fluidifient votre sang (anticoagulants) tels que la warfarine
- rifampicine (un antibiotique)
- méthotrexate (un médicament immunosuppresseur, souvent utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde)
- ciclosporine ou tacrolimus (médicaments immunosuppresseurs)
- lithium (un médicament utilisé pour traiter certains types de dépression)
- médicaments utilisés pour aider à contrôler l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque appelés inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine; des exemples sont l'énalapril et le ramipril, et le losartan et le valsartan
- diurétiques (comprimés favorisant l'élimination d'eau)
- digoxine (un médicament pour l'insuffisance cardiaque et le rythme cardiaque irrégulier)
- minoxidil (un médicament utilisé pour traiter l'hypertension)
- salbutamol en comprimés ou en solution buvable (un médicament pour l'asthme)
- pilules contraceptives (l'association peut augmenter votre risque d'effets indésirables)
- traitement hormonal substitutif (l'association peut augmenter votre risque d'effets indésirables)
- acide acétylsalicylique, le risque d'ulcères de l'estomac est plus élevé si vous prenez Etoricoxib EG avec de l'acide acétylsalicylique.
 - *acide acétylsalicylique en prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral:*
Etoricoxib EG peut être pris avec de l'acide acétylsalicylique à faibles doses. Si vous prenez actuellement de l'acide acétylsalicylique à faibles doses pour la prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, vous ne devez pas interrompre la prise d'acide acétylsalicylique avant d'avoir parlé à votre médecin.
 - *acide acétylsalicylique et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS):*
ne prenez pas d'acide acétylsalicylique ou d'autres anti-inflammatoires à fortes doses pendant le traitement par Etoricoxib EG.

Etoricoxib EG avec des aliments

Le début de l'effet d'Etoricoxib EG peut être plus rapide si la prise se fait sans aliments.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

Les comprimés d'Etoricoxib EG ne doivent pas être pris pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, ne prenez pas les comprimés d'Etoricoxib EG. Si vous êtes enceinte, arrêtez de prendre l'Etoricoxib EG et consultez votre médecin. Consultez votre médecin si vous n'êtes pas sûre ou avez besoin de plus de conseils.

Allaitement

On ignore si l'étoricoxib est excrété dans le lait maternel chez l'homme. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, consultez votre médecin avant de prendre Etoricoxib EG. Si vous utilisez Etoricoxib EG, vous ne devez pas allaiter.

Fertilité

L'utilisation d'Etoricoxib EG n'est pas recommandée chez les femmes qui essaient d'avoir un enfant.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des étourdissements et une somnolence ont été rapportés chez certains patients prenant Etoricoxib EG. Ne conduisez pas si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence. N'utilisez ni outil ni machine si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

Etoricoxib EG contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Etoricoxib EG contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Etoricoxib EG?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Votre médecin sera amené à discuter régulièrement avec vous de votre traitement. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre l'Etoricoxib EG plus longtemps que prescrit, ceci en raison du risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral qui peut augmenter après un traitement prolongé, en particulier à hautes doses.

Différents dosages de ce médicament sont disponibles et, selon votre maladie, votre médecin vous prescrira le dosage adapté à votre cas.

La dose recommandée est de:

Arthrose

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmentée à 90 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Spondylarthrite ankylosante

La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmentée à 90 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

Douleur aiguë

Etoricoxib EG ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours de traitement au maximum.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, limitée à 3 jours de traitement maximum.

Personnes souffrant de problèmes de foie

- Si vous souffrez d'une maladie du foie légère, vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.
- Si vous souffrez d'une maladie du foie modérée, vous ne devez pas prendre plus de 30 mg par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Etoricoxib EG ne doit être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Personnes âgées

Aucun ajustement de posologie n'est nécessaire chez les patients âgés. Comme avec d'autres médicaments, la prudence est de rigueur chez les patients âgés.

Mode d'administration

Etoricoxib EG est à prendre par voie orale. Prenez les comprimés une fois par jour. Etoricoxib EG peut être pris avec ou sans nourriture.

Si vous avez pris plus d'Etoricoxib EG que vous n'auriez dû

Vous ne pouvez jamais prendre plus de comprimés que la quantité recommandée par votre médecin. Si vous avez quand même pris trop de comprimés d'Etoricoxib EG, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Etoricoxib EG

Il est important de prendre Etoricoxib EG comme votre médecin vous a prescrit. Si vous oubliez une dose, reprenez tout simplement votre traitement à l'horaire habituel le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez un des signes suivants, vous devez arrêter immédiatement Etoricoxib EG et contacter tout de suite votre médecin (voir la rubrique 2 « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Etoricoxib EG »):

- apparition ou aggravation d'un essoufflement, de douleurs thoraciques ou d'œdème des chevilles
- jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse) qui sont des signes de problèmes de foie
- douleur d'estomac sévère ou permanente ou coloration noire des selles
- une réaction allergique pouvant inclure des problèmes cutanés tels qu'ulcérations ou formation de vésicules, ou gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner des difficultés à respirer

Les effets indésirables suivants peuvent survenir durant le traitement par Etoricoxib EG:

Très fréquent: (peut toucher plus de 1 personne sur 10)

- douleur à l'estomac

Fréquent: (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- alvéolite (inflammation et douleur après une extraction dentaire)
- gonflement des jambes et/ou des pieds dû à une rétention d'eau (œdème)
- étourdissements, maux de tête
- palpitations (battements du cœur rapides ou irréguliers), rythme cardiaque irrégulier (arythmie)
- augmentation de la pression artérielle
- sifflement ou essoufflement (bronchospasmes)
- constipation, flatulence (quantité excessive de gaz), gastrite (inflammation de la paroi de l'estomac), brûlures d'estomac, diarrhée, indigestion (dyspepsie)/gêne à l'estomac, nausées, vomissements, inflammation de l'œsophage, ulcérations de la bouche
- modifications des examens sanguins liés à votre foie
- taches bleues
- faiblesse et fatigue, syndrome pseudo-grippal

Peu fréquent: (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- gastroentérite (inflammation du tractus gastro-intestinal qui implique à la fois l'estomac et l'intestin grêle/grippe intestinale), infection des voies respiratoires hautes, infection des voies urinaires
- modification des valeurs biologiques (diminution du nombre de globules rouges, diminution du nombre de globules blancs, diminution des plaquettes)
- hypersensibilité (une réaction allergique dont urticaire pouvant être suffisamment grave pour nécessiter un avis médical immédiat)
- augmentation ou diminution de l'appétit, prise de poids
- anxiété, dépression, diminution du discernement; voir, ressentir ou entendre des choses qui n'existent pas (hallucinations)
- altération du goût, insomnie, engourdissement ou picotements, somnolence
- vision trouble, irritation et rougeur de l'œil
- bourdonnements d'oreilles, vertiges (sensation de tournoiement en restant immobile)
- anomalie du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire), fréquence cardiaque rapide, insuffisance cardiaque, sensation d'oppression, de pression ou de poids dans la poitrine (angine de poitrine), crise cardiaque
- bouffées de chaleur, accident vasculaire cérébral, mini-AVC (accident ischémique cérébral transitoire), élévation sévère de la pression artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins
- toux, essoufflement, saignements de nez
- ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, modification du transit intestinal, sécheresse de la bouche, ulcère de l'estomac, inflammation de la paroi de l'estomac pouvant devenir grave et aller jusqu'à l'hémorragie, syndrome du côlon irritable, inflammation du pancréas
- gonflement du visage, éruption cutanée ou démangeaisons de la peau, rougeur de la peau
- crampes/spasmes musculaires, douleur musculaire/raideur
- taux de potassium élevés dans votre sang, modifications des examens sanguins ou urinaires liés à vos reins, problèmes rénaux graves
- douleur thoracique

Rare: (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- angio-œdème (une réaction allergique avec gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant provoquer des difficultés respiratoires ou de déglutition qui peuvent être suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux immédiats)/ réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes y compris choc (une réaction allergique sévère qui nécessite des soins médicaux immédiats)
- confusion, agitation
- problèmes de foie (hépatite)
- faible taux de sodium dans le sang
- insuffisance hépatique, jaunissement de la peau et/ou des yeux (jaunisse)
- réactions cutanées sévères

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via: **Belgique:** AFMPS – Division Vigilance – Boîte Postale 97 – B-1000 Bruxelles Madou – site internet: www.afmps.be. **Luxembourg:** Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – E-mail: crpv@chru-nancy.fr – Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 – Fax: (+33) 3 83 65 61 33 ou Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à Luxembourg – E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu – Tél.: (+352) 247-85592 – Fax: (+352) 247-95615. Lien pour le formulaire: <http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Etoricoxib EG?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Etoricoxib EG

- La substance active est l'étoricoxib.
 - Etoricoxib EG 30 mg: Chaque comprimé pelliculé contient 30 mg d'étoricoxib.
 - Etoricoxib EG 60 mg: Chaque comprimé pelliculé contient 60 mg d'étoricoxib.
 - Etoricoxib EG 90 mg: Chaque comprimé pelliculé contient 90 mg d'étoricoxib.
 - Etoricoxib EG 120 mg: Chaque comprimé pelliculé contient 120 mg d'étoricoxib.
- Les autres composants sont hydrogénophosphate de calcium, anhydre, cellulose microcristalline, povidone K29-32, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique, hypromellose, lactose monohydraté, dioxyde de titane (E171), triacétine.
Les comprimés de 30, 60 et 120 mg contiennent également de la laque aluminique d'indigotine (E132) et de l'oxyde de fer jaune (E172).

Aspect d'Etoricoxib EG et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés d'Etoricoxib EG sont disponibles en quatre dosages.
Les comprimés à 30 mg sont des comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur bleu-vert.
Les comprimés à 60 mg sont des comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur vert foncé.
Les comprimés à 90 mg sont des comprimés pelliculés biconvexes, ronds et blancs.
Les comprimés à 120 mg sont des comprimés pelliculés biconvexes, ronds, de couleur vert pâle.

[30 mg]

Présentations de 7, 14, 28, 30, 98 comprimés pelliculés sous plaquettes.

[60 mg]

Présentations de 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 comprimés pelliculés sous plaquettes.

Présentations de 100 comprimés pelliculés dans des piluliers avec bouchon à vis contenant un déshydratant (gel de silice). Le déshydratant, utilisé pour maintenir les comprimés au sec, ne doit pas être avalé.

[90 mg]

Présentations de 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 comprimés pelliculés sous plaquettes.

Présentations de 100 comprimés pelliculés dans des piluliers avec bouchon à vis contenant un déshydratant (gel de silice). Le déshydratant, utilisé pour maintenir les comprimés au sec, ne doit pas être avalé.

[120 mg]

Présentations de 5, 7, 14, 20, 28, 30, 98 comprimés pelliculés sous plaquettes.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

EG (Eurogenerics) SA – Esplanade Heysel b22 – 1020 Bruxelles

Fabricants

Pharmacare Premium Ltd. - HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbuga. BBG 3000 - Malte

Delorbis Pharmaceuticals Ltd., 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, Nicosia - Chypre

STADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Allemagne

Centrafarm Services B.V. - Nieuwe Donk 9, NL-4879 Ac Etten-Leur - Pays-Bas

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

BE	Etoricoxib EG 30/60/90/120 mg comprimés pelliculés
FI	Etoricoxib STADA 30/60/90/120 mg tabletit, kalvopäälysteiset
DE	Etoricoxib AL 30/60/90/120 mg Filmtabletten
IT	ETORICOXIB EG
LU	Etoricoxib EG 30/60/90/120 mg comprimés pelliculés sécables
NL	Etoricoxib CF 60/90 mg filmomhulde tabletten
PO	Etoricoxib Ciclum
RO	Toricoxal
SI	Etorikoksib STADA 30/60/90/120 mg filmsko obložene tablete
ES	Etoricoxib STADA 30/60/90/120 mg comprimidos recubiertos con película
SE	Etoricoxib STADA 30/60/90/120 mg filmdragerade tabletter

Numéros d'autorisation de mise sur le marché:

Etoricoxib EG 30 mg comprimés pelliculés:	BE500444
Etoricoxib EG 60 mg comprimés pelliculés (plaquette):	BE500453
Etoricoxib EG 60 mg comprimés pelliculés (pilulier):	BE500462
Etoricoxib EG 90 mg comprimés pelliculés (plaquette):	BE500471
Etoricoxib EG 90 mg comprimés pelliculés (pilulier):	BE500480
Etoricoxib EG 120 mg comprimés pelliculés:	BE500497

Mode de délivrance: sur prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée / révisée est 12/2020 / 02/2020.