

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Soluprick Positieve controle, 10 mg/ml, oplossing voor huidpriktest Histamine dihydrochloride

EN

Soluprick Negatieve controle, oplossing voor huidpriktest

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Soluprick en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Soluprick en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Soluprick is een oplossing voor de huidpriktest.

Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle worden alleen voor diagnostiek gebruikt. Ze worden gebruikt in de huidpriktest om vast te stellen welke stoffen bij u een allergische reactie veroorzaken.

Soluprick Negatieve controle zal geen reactie veroorzaken. De histaminedihydrochloride in de Soluprick Positieve controle veroorzaakt, bij een positieve reactie, een harde gezwollen plek op de huid, die omgeven kan zijn door een rood gebied. Dit toont de arts dat de huidpriktest werkt. Deze test is in het bijzonder belangrijk als u geneesmiddelen heeft gebruikt die de reactiviteit van de huidpriktest verminderen zoals antihistaminica, sommige antidepressiva of sterk werkzame lokale steroïde preparaten.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Als u allergisch bent voor één van de stoffen, behalve het allergeen, in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Informeer uw arts als bovenstaande voor u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle gebruikt:

- Als u huidproblemen heeft in het gebied waar de huidpriktest moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld eczeem, infectie van de huid of schade door de zon)
- Als u lijdt aan een ziekte die uw algemene gezondheid beïnvloedt

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Soluprick Positieve controle

Vertel uw arts of zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen kunnen het resultaat van de huidpriktest beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat, voordat de huidpriktest wordt verricht, u aan uw arts of zorgverlener meldt of u een van de volgende geneesmiddelen heeft gebruikt.

- Kortwerkende antihistaminica in de afgelopen 3 dagen;
- Langwerkende antihistaminica in de afgelopen week;
- Steroïden in een dosis hoger dan 10 mg prednisolon per dag in de afgelopen 3 weken;
- Sterk werkzame lokale steroïden die de laatste drie weken op uw huid zijn aangebracht.
- Tricyclische antidepressiva;
- Omalizumab (een geneesmiddel gebruikt bij allergische astma en/of ontstekingen in de neus en bijholten) in de afgelopen 4 tot 6 weken;

Behandeling met minder dan 10 mg prednisolon (in tabletvorm) per dag zal de reactie op de huidpriktest niet onderdrukken.

Andere geneesmiddelen kunnen de uitslag van de huidpriktest beïnvloeden. U dient met uw arts het risico van het staken van de behandeling te bespreken in vergelijking met de voordelen van een huidpriktest.

Soluprick Negatieve controle

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Op dit moment is er geen ervaring met het gebruik van Soluprick Positieve controle en Negatieve controle tijdens de zwangerschap. Dit middel mag niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen, tenzij de behandelend arts van mening is dat de voordelen opwegen tegen de risico's.

Een huidpriktest kan worden uitgevoerd bij vrouwen die borstvoeding geven. De hoeveelheid geneesmiddel die in de moedermelk terechtkomt is te verwaarlozen en wordt verwacht geen effecten op het kind te hebben.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Soluprick Positieve en Negatieve controle hebben geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts of gezondheidsmedewerker zal de huidpriktest bij u verrichten. De procedure gaat als volgt:

- De huidpriktest wordt gewoonlijk op de binnenzijde van de onderarm uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is dat de test op uw rug wordt gedaan.
- De huid moet droog en schoon zijn en kan worden gedesinfecteerd met alcohol door de arts of verpleegkundige.
- Een druppel van de testoplossing, Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle, wordt op de huid gebracht op voldoende afstand van elkaar.
- De arts of verpleegkundige prikt met een lancet door de druppel in de bovenste laag van de huid.
- Na 15 minuten wordt de reactie afgelezen. Een positieve reactie is een kleine bleke zwelling of bult (kwaddel) met een rode rand.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Huidpriktest met Soluprick Positieve controle en Negatieve controle wordt uitgevoerd door een zorgverlener. In het geval van een overdosis wordt u gecontroleerd en behandeld door een zorgverlener.

Wanneer u teveel aan Soluprick Positieve controle en Soluprick Negatieve controle heeft gebruikt, neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 245 245).

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Soluprick Positieve Controle zal de verwachte lokale bijwerkingen geven die veroorzaakt worden door histamine. Na de test zal de positieve controle een harde, zwellende plek op de huid veroorzaken, die omgeven kan zijn door een rode plek met plaatselijke jeuk.

In sommige gevallen (frequentie niet bekend) kan een lichte pijn optreden.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- De praktijk/kliniek zal de huidpriktest oplossing bewaren.
- Bewaren in de koelkast (2°C–8°C).
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het label en vouwdoos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Na opening kan dit product nog maximaal 6 maanden worden bewaard.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Het werkzame bestanddeel in Soluprick Positieve controle is histaminedihydrochloride 10 mg/ml. Er zit geen werkzaam bestanddeel in Soluprick Negatieve controle.

De andere bestanddelen zijn glycerol, fenol, dinatriumfosfaat dihydraat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, natriumchloride, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injectie.

Hoe ziet Soluprick eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Soluprick zit in een glazen injectieflacon die 2 ml heldere oplossing bevat. De flacon is afgesloten met een rubber dop en een schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Denemarken

Fabrikant

ALK-Abelló S.A.
Miguel Fleta 19
E-28037 Madrid
Spanje

Nummer(s) van de vergunning:

Soluprick Positieve controle: BE 456266
Soluprick Negatieve controle: BE 456275

Afleveringswijze

Medisch voorschrift

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) onder volgende namen:

Oostenrijk	ALK Prick Positiv Kontrolle, ALK Prick Negativ Kontrolle
België	Soluprick Positieve controle, Soluprick Negatieve controle
Denemarken	ALK Soluprick Positiv Kontrol, ALK Soluprick Negativ kontrol
Frankrijk en Luxemburg	Soluprick contrôle Positif, Soluprick contrôle Négatif
IJsland	Soluprick Positiv Kontrol, Soluprick Negativ Kontrol
Ierland	Soluprick Positive control, Soluprick Negative control
Noorwegen	Soluprick Positiv kontroll, Soluprick Negativ kontroll

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: 12/2025