

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für Anwender

Oscillococcinum Globuli
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Oscillococcinum Globuli und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Oscillococcinum Globuli beachten?
3. Wie ist Oscillococcinum Globuli einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Oscillococcinum Globuli aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Oscillococcinum Globuli und wofür wird es angewendet?

Homöopathisches Arzneimittel das traditionell bei Behandlung von grippalen Zuständen verwendet wird: Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen.

Oscillococcinum verkürzt die Dauer von Grippe-symptomen. Während der Grippezeit kann eine einmalige Einnahme pro Woche die Intensität der Symptome verringern.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Oscillococcinum Globuli beachten?

Oscillococcinum darf nicht eingenommen werden

wenn Sie allergisch gegen Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Tritt innerhalb von 3 Tagen keine Besserung ein oder verschlimmern sich die Symptome, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Kinder

Dieses Arzneimittel ist auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

Einnahme von Oscillococcinum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen anzuwenden.

Packungsbeilage

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Oscillococcinum hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Oscillococcinum enthält Lactose und Saccharose

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Oscillococcinum Globuli einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

Dosierung:

Erwachsene und Kinder:

Die Dosierung hängt vom Zeitpunkt der Anwendung ab:

- zur Vorbeugung während der Grippezeit: 1 Dosis pro Woche.
- bei beginnendem grippalem Zustand: 1 Dosis so früh wie möglich, danach eventuell in Abständen von sechs Stunden 2- bis 3mal wiederholen.
- bei ausgebrochenem grippalem Zustand: morgens und abends 1 Dosis über 1 bis 3 Tage.

Art der Anwendung:

Sublingual.

Arzneimittel mindestens 15 Minuten vor oder 1 Stunde nach den Mahlzeiten einnehmen.

Alle in einer Dosis enthaltenen Globuli im Mund zergehen lassen.

Globuli erst in Wasser auflösen für Kinder unter 1 Jahr.

Wenn Sie eine größere Menge von Oscillococcinum eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Oscillococcinum haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von Oscillococcinum vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Packungsbeilage

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

1000 BRÜSSEL

Madou

Website: www.notifierunefetindesirable.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg:

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link zum Formular: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Oscillococcinum Globuli aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier darauffolgenden Ziffern nächsten das Jahr. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Oscillococcinum enthält

- der Wirkstoff ist:

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 0,01 ml
pro Dosis à 1g.

- die sonstigen Bestandteile sind : Saccharose, Lactose.

Wie Oscillococcinum aussieht und Inhalt der Packung

Globulidosis in Polypropylenröhrchen mit Polyethylenkapsel in einer Schachtel mit 3, 6, 12 oder 30 Dosen von 1 g. **Alle Darreichungsformen können nicht kaufbar sein.**

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Packungsbeilage

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
F-69510 Messimy
Frankreich

Zulassungsnummer

HO-BE457120

Art der Abgabe

Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 05/2025