BIJSLUITER: informatie voor de gebruiker

Oscillococcinum globulen
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Oscillococcinum globulen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Oscillococcinum, globulen niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Oscillococcinum globulen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Oscillococcinum globulen?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Oscillococcinum globulen en waarvoor wordt dit middel het gebruikt?

Homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel gebruikt wordt bij de behandeling van grieptoestanden: rillingen, spierpijn, koorts, hoofdpijn.
Oscillococcinum verkort de duur van de griepsymptomen. Tijdens de blootstellingsperiode aan griep kan een wekelijks gebruik de intensiteit van deze symptomen verminderen.

2. Wanneer mag u Oscillococcinum globulen niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Oscillococcinum globulen niet gebruiken?
Wanneer u allergisch bent aan één van de actieve bestanddelen of aan een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

Wanneer mag u Oscillococcinum niet gebruiken?
Raadpleeg een arts als er geen verbetering optreedt binnen drie dagen of als de symptomen erger worden.

Kinderen
Dit geneesmiddel is ook aangewezen voor gebruik door kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Oscillococcinum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Oscillococcinum heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Oscillococcinum bevat lactose en sacharose
Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u Oscillococcinum globulen?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:

Volwassenen en kinderen:
De dosering varieert naargelang het moment waarop men begint:
- tijdens de blootstellingsperiode aan griep: 1 dosis per week.
- beginnende grieptoestand: zo vroeg mogelijk 1 dosis, eventueel 2 tot 3 keer herhalen met een interval van 6 uur.
- uitgebroken grieptoestand: 's ochtends en 's avonds 1 dosis gedurende 1 tot 3 dagen.

Wijze van toediening:
Sublinguale toediening. Het geneesmiddel moet ten minste 15 minuten vóór of 1 uur na de maaltijd worden ingenomen. Alle globulen van de dosis in de mond brengen en laten oplossen. Voor kinderen jonger dan 1 jaar moeten de globulen vooraf in water worden opgelost.

Heeft u te veel Oscillococcinum ingenomen?
Wanneer u te veel van Oscillococcinum heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Oscillococcinum in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
1000 BRUSSEL
Madou
Website: **www.eenbijwerkingmelden.be**
E-mail: **adr@fagg.be**

Luxemburg:
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments
Tél. : (+352) 2478 5592
E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**
Link voor het formularium:
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Oscillococcinum globulen?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Geen specifieke voorzorgsmaatregelen bij het bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Oscillococcinum

- **De werkzame stof is**

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 0,01 ml

voor 1 dosis van lg.

- **De andere stoffen zijn :** sacharose, lactose.

Hoe ziet Oscillococcinum eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dosis globulen in een buisje van polypropyleen met een dop van polyethyleen in een doos van 3, 6, 12 of 30 dosissen van 1 g. Niet alle verpakkingen kunnen gecommercialiseerd zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE457120

Wijze van aflevering

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 10/2025.