

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Thymoseptine Sirup

Thymian-Flüssigextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn die Symptome bei Anwendung des Arzneimittels weiterbestehen oder andere als die in der Packungsbeilage erwähnte Nebenwirkungen auftreten.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Thymoseptine Sirup und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Thymoseptine Sirup beachten?
3. Wie ist Thymoseptine Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Thymoseptine Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Thymoseptine Sirup und wofür wird es angewendet?

Thymoseptine ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das Thymian-Flüssigextrakt enthält.

Thymoseptine wird angewendet zur Schleimlösung bei Husten in Zusammenhang mit einer Erkältung. Die Anwendung im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Thymoseptine Sirup beachten?

Thymoseptine darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Thymian oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie allergisch gegen ein anderes Mitglied aus der Lamiaceae-Familie.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Thymoseptine einnehmen.

Sie müssen bei Eintreten einer der folgenden Situationen Ihren Arzt oder Apotheker informieren:

- wenn Sie Symptome einer Infektion bemerken (Fieber, eitriger Schleimauswurf).

- wenn Sie Atemschwierigkeiten haben.

Kinder und Jugendliche

Für Kinder unter 2 Jahren wird Thymoseptine nicht empfohlen.

Einnahme von Thymoseptine zusammen mit anderen Arzneimitteln

Die gleichzeitige Einnahme von anderen Arzneimitteln, die Alkohol enthalten, sollten vermieden werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Einnahme von Thymoseptine zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Unzutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um eventuelle verhängnisvolle Auswirkungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit auszuschließen. Die Anwendung von Thymoseptine während der Schwangerschaft oder Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Zur Auswirkung auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu lenken oder Maschinen zu bedienen, wurden keine entsprechenden Untersuchungen durchgeführt.

Thymoseptine enthält Saccharose und Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält 8 g Saccharose pro Dosis für Erwachsene. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält 10,7 vol % Ethanol (Alkohol), d.h. zu 1,27 g pro Dosis für Erwachsene, entsprechend 32 ml Bier, 13 ml Wein pro Dosis. Gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Ist bei Schangeren bzw. Stillenden Kindern sowie Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. Wie ist Thymoseptine Sirup einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die folgenden Dosierungen werden empfohlen:

- Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 15 ml (1 Esslöffel), höchstens 4 mal täglich.
- Kinder ab 7 Jahre: 10 ml (2 Teelöffel), höchstens 4 mal täglich.
- Kinder ab 2 Jahre: 5 ml (1 Teelöffel), höchstens 4 mal täglich.

Der Abstand zwischen zwei Einnahmen muss mindestens 4 Stunden betragen.

Nehmen Sie Thymoseptine vorzugsweise nach der Mahlzeit ein.

Verwenden Sie für eine genaue Dosierung immer den in der Packung enthaltenen graduierten Meßbecher.

Öffnen Sie die Flasche wie folgt: drücken Sie die Kunststoffschraubkappe nach unten, während Sie sie gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht für mehr als eine Woche ohne Hinzuziehen eines Arztes ein, wenn die Symptome anhalten oder wenn sich Fieber einstellt.

Wenn Sie eine größere Menge von Thymoseptine eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Thymoseptine haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die Antgiftzentrum (070/245.245).

Bei Überdosierung ist eine symptomatische Behandlung erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Thymoseptine vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Thymoseptine abbrechen

Erneutes Auftreten des Beschwerden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen und Magen-Darm-Beschwerden wurden beobachtet. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Avenue Galilée - Galileelaan 5/03 1210 BRÜSSEL	Postfach 97 1000 BRÜSSEL Madou
--	--------------------------------------

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Thymoseptine Sirup aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Packung nach den Buchstaben « EXP » angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Thymoseptine enthält

Der Wirkstoff ist Flüssigextrakt (1:1) aus Thymiankraut (*Thymus vulgaris* L.). 5 ml Sirup enthalten 750 mg Thymian Extrakt. Auszugsmittel: Ethanol 22 % V/V.

Die sonstigen Bestandteile sind Saccharose, Glycerol, Ethanol und gereinigtes Wasser.

Wie Thymoseptine aussieht und Inhalt der Packung

Klare, braune Lösung ; süßer und aromatischer Geschmack.
Thymoseptine ist in 150 ml oder 250 ml Braunglasflaschen erhältlich.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

Registrierungsinhaber und Hersteller

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Registrierungsnummer

BE-TU449182

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 09/2021