

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Lymecycline Brown & Burk 408 mg Hartkapseln

Lymecyclin (entsprechend 300 mg Tetracyclin-Base)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Lymecycline Brown & Burk und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lymecycline Brown & Burk beachten?
3. Wie ist Lymecycline Brown & Burk einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen können auftreten?
5. Wie ist Lymecycline Brown & Burk aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Lymecycline Brown & Burk und wofür wird es angewendet?

- Lymecyclin gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Tetracyclin-Antibiotika genannt werden.
- Lymecyclin wird in erster Linie zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Akne angewendet. Akne zeigt sich in Form von dunklen Mitessern und Hautunreinheiten, die oft als Pickel oder Pusteln bezeichnet werden.
- Lymecyclin greift die Bakterien an, die eine der Hauptursachen von Akne sind. Der Name dieser Bakterien ist *Propionibacterium acnes*.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, weshalb Ihnen dieses Arzneimittel verschrieben wurde, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lymecycline Brown & Burk beachten?

Lymecycline Brown & Burk darf nicht eingenommen werden, wenn Sie

- schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen,
- allergisch gegen Lymecyclin oder andere Tetracyclin-Antibiotika, wie Doxycyclin, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Eine allergische Reaktion schließt möglicherweise Ausschlag oder Juckreiz mit ein
- jemals eine Nierenerkrankung hatten
- Lymecyclin Brown & Burk darf Kindern unter 8 Jahren nicht verabreicht werden.
- Lymecycline Brown & Burk darf nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln eingenommen werden, die oral verabreichte Retinoide enthalten (diese schließen auch einige andere Arzneimittel zur Behandlung von Akne mit ein).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Lymecyclin einnehmen, wenn Sie

- eine Leber- oder Nierenerkrankung haben,
- an Myasthenia gravis leiden (eine Krankheit, die die Muskeln schwächt).
- an systemischem Lupus erythematosus (einer allergischen Erkrankung, die Gelenkschmerzen, Hautausschlag oder Fieber verursacht) oder an Myasthenia gravis (einer Krankheit, die die Muskeln schwächt) leiden,

- jemals Hautausschlag durch Sonnenlicht oder die Nutzung von Solarien bekommen haben.

Die Langzeitanwendung von Antibiotika kann zu einer resistenten bakteriellen Infektion führen (Bakterien, die eine Infektion verursachen, reagieren nicht auf die Behandlung mit Antibiotika).

Nehmen Sie das Arzneimittel mit ausreichend Wasser ein, um Reizungen und Geschwüre der Speiseröhre zu vermeiden.

Einnahme von Lymezycline Brown & Burk zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Nehmen Sie die folgenden Arzneimittel nicht gleichzeitig mit Lymezyclin ein, da diese die Wirkung Ihres Lymezyclin beeinträchtigen könnten. Warten Sie nach der Einnahme von Lymezyclin mindestens zwei bis drei Stunden, bevor Sie diese Art von Produkten einnehmen.

- Verdauungsstörungen
- Medikamente zur Heilung von Geschwüren
- Quinapril (gegen Bluthochdruck)
- Nahrungsergänzungsmittel, die Kalzium, Aluminium, Magnesium, Zink oder Eisen enthalten
- Aktivkohle, Wismutcheleate und Sucralfat
- Didanosin bei HIV-Infektion

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Arzneimittel zur Blutverdünnung, z.B., Warfarin
- Diuretika (zur Behandlung von Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen oder Bluthochdruck)
- systemische Retinoide, einschließlich oraler Retinoide (zur Behandlung von Akne, z. B. Roaccutan) oder Arzneimittel, die hohe Dosen Vitamin A enthalten (siehe oben „Lymezyclin darf nicht eingenommen werden“).
- Wenn Sie eine Behandlung mit Lithium einnehmen, kann dieses Arzneimittel den Lithiumspiegel erhöhen in deinem Blut.
- Wenn Sie die „Pille“ zur Empfängnisverhütung einnehmen, kann diese bei Einnahme von Lymezycline Brown & Burk möglicherweise nicht richtig wirken, insbesondere falls Sie aus irgendeinem Grund an Erbrechen oder Durchfall leiden. Eine zusätzliche „Barrieremethode“ zur Empfängnisverhütung (z.B., ein Kondom) sollte zur Vermeidung einer Schwangerschaft verwendet werden. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage Ihrer „Pille“, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen oder wie lange Sie diese Vorsichtsmaßnahmen anwenden sollten.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich einem Eingriff unterziehen müssen, der eine bei Anästhesie erfordert, da Lymezyclin mit einigen Anästhetika nicht verwendet werden kann z.B., Methoxyfluran.

Tetracyclin kann zu einem falsch positiven Urintest auf Glukose führen. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Lymezyclin einnehmen und einen Urintest benötigen.

Einnahme von Lymezycline Brown & Burk zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Aufnahme von Lymezyclin wird von mäßigen Mengen Milch nicht beeinträchtigt. Lymezycline Brown & Burk Kapseln sollten immer mit einem Glas Wasser eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, dürfen Sie Lymezycline Brown & Burk nicht einnehmen. Die Anwendung von Arzneimitteln wie Lymezycline Brown & Burk kann das ordnungsgemäße Wachstum sich entwickelnder Zähne beeinträchtigen und zu dauerhafter Zahnverfärbung führen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es ist nicht bekannt, ob Lyme cyclin bekanntermaßen die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

3. Wie ist Lyme cycline Brown & Burk einzunehmen?

Wenden Sie Lyme cyclin immer genau nach Anweisung Ihres Arztes an. Die korrekte Dosis ist auf dem Etikett angegeben, das Ihr Apotheker auf dem Behälter angebracht hat. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren

Mäßige bis schwere Fälle von Akne

Die übliche Dosis ist eine Lyme cyclin-Kapsel einmal täglich, vorzugsweise morgens.

Wie lange Sie Lyme cyclin einnehmen müssen, hängt davon ab, wie schnell sich Ihr Zustand verbessert. Bei Akne beträgt diese in der Regel mindestens 8 bis 12 Wochen. Ihr Arzt kann entscheiden, die Behandlung für maximal 6 Monate fortzusetzen.

Lyme cyclin-Kapseln sollten immer mit einem Glas Wasser eingenommen werden. Sie sollten außerdem zu einer leichten Mahlzeit ohne Milchprodukte eingenommen werden.

Nierenfunktionsstörung:

Wenn Sie ein Nierenproblem haben, kann Ihr Arzt entscheiden, Ihre Dosis zu reduzieren.

Lyme cycline Brown & Burk darf Kindern unter 8 Jahren nicht verabreicht werden, weil dies schädlich für sie sein könnte.

Wenn Sie eine größere Menge von Lyme cycline Brown & Burk eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie, oder jemand anderes, zu viele Lyme cycline Brown & Burk Kapseln eingenommen haben, rufen Sie Ihren Arzt an, oder begeben Sie sich ins nächstgelegene Krankenhaus. Vergessen Sie nicht, das Arzneimittel mitzunehmen. Dies könnte Aufschluss darüber geben, wie viele Kapseln eingenommen wurden.

Wenn Sie eine größere Menge von Lyme cycline Brown & Burk haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antidotzentrum (070 245 245).

Wenn Sie die Einnahme von Lyme cycline Brown & Burk vergessen haben

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie diese einfach ein, sobald es Ihnen einfällt, und fahren Sie wie bisher fort, es sei denn, es ist Zeit für die nächste Dosis. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, um eine vergessene Kapsel auszugleichen. Sie sollten niemals mehr Kapseln einnehmen, als Ihr Arzt empfiehlt.

Wenn Sie die Einnahme von Lyme cycline Brown & Burk abbrechen

Akne reagiert langsam auf Antibiotika. Es ist wichtig, die Dauer der Behandlung wie von Ihrem Arzt empfohlen, zu respektieren. Wenn Sie die Einnahme von Lyme cycline Brown & Burk zu früh beenden, könnte sich Ihre Akne oder Infektion verschlimmern oder erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Lymecycline Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Lymecyclin kann die folgenden Nebenwirkungen verursachen.

Häufige Nebenwirkungen (treten bei weniger als 1 von 10 Patienten auf)

- Übelkeit (Übelkeit)
- Bauchschmerzen
- Durchfall
- Kopfschmerzen

Unbekannte Häufigkeit des Auftretens (Häufigkeit kann auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden)

- allergische (Überempfindlichkeits-)Reaktion, die zu Schwellungen der Augen, Lippen oder Zunge führt*
- Blasenbildung oder Abschälen großer Hautbereiche*
- Geschwüre oder Läsionen an Mund, Lippen, Genital- oder Analbereich*
- Sehstörungen
- Schwindel
- Erbrechen (Übelkeit)
- Entzündung oder Geschwürbildung der Speiseröhre, die Schmerzen, Schluckbeschwerden oder schmerzhaftes Sodbrennen verursacht. Gelbfärbung der Haut oder Augen (Gelbsucht)
- Leberentzündung (Hepatitis)
- erhöhte Empfindlichkeit der Haut gegenüber Sonnenlicht
- erhöhter Druck im Gehirn
- Veränderungen der Anzahl oder Art bestimmter Blutzellen
- Schmerzen im Oberbauch
- Veränderungen bei einigen Blutuntersuchungen (Leberfunktionstests)
- Fieber
- Juckreiz, Hautausschlag oder Nesselsucht
- Entzündung des Darms
- Depression
- Alptraum

Bei der Behandlung mit der Arzneimittelklasse, zu der Lymecyclin gehört (den Tetracyclinen), können folgende Nebenwirkungen auftreten:

- Systemischer Lupus erythematosus (eine allergische Erkrankung, die Gelenkschmerzen, Hautausschläge oder Fieber verursacht).
- Pankreatitis (Entzündung der Bauchspeicheldrüse).
- Veränderung der Blutuntersuchungen (Abnahme der roten Blutkörperchen, Zunahme bestimmter weißer Blutkörperchen)
- Anstieg des Harnstoffspiegels im Blut, der durch die Einnahme von Diuretika zusammen mit Lymecyclin verstärkt werden kann
- Entzündung oder Geschwürbildung der Speiseröhre, die Schmerzen, Schluckbeschwerden oder schmerzhaftes Sodbrennen verursacht.
- Schwierigkeiten beim Schlucken
- Entzündung der Bauchspeicheldrüse
- Leberschaden
- Verfärbung der Zähne
- Entzündung oder Schmerzen der Zunge, des Mundes, der Wangen, des Zahnfleisches oder der Lippen
- Schmerzen oder Juckreiz im Genitalbereich
- Hefepilzinfektion im Bereich des Anus oder der Genitalien
- Infektion des Dickdarms

- Unter Tetracyclin-Therapie wurde über gutartige intrakranielle Hypertonie berichtet, zu deren Symptomen Kopfschmerzen, Erbrechen, Sehstörungen (verschwommenes Sehen, blinde Flecken oder Doppeltsehen) oder dauerhafter Sehverlust gehören können.

*Benachrichtigen Sie sofort Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Nebenwirkungen wie Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge und Rachen, Atembeschwerden, Nesselsucht, Blasenbildung oder Abschälen großer Hautbereiche, Geschwüre oder Läsionen an Mund, Lippen, Genital- oder Analbereich auftreten, starke oder anhaltende Kopfschmerzen, starke Übelkeit oder Sehstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, Avenue Galilée-Galileelaan 5/03, 1210 BRÜSSEL, oder Postfach 97, 1000 BRÜSSEL Madou Website: www.notifierunefetindesirable.be e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Lyme cycline Brown & Burk aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Lyme cycline Brown & Burk enthält

Jede Hartkapsel enthält 408 mg Lyme cyclin (entsprechend 300 mg Tetracyclin-Base). Die sonstigen Bestandteile sind Magnesiumstearat und kolloidales Siliziumdioxid. Die Kapselhülle enthält Gelatine, Titandioxid (E171), Erythrosin (E127), Chinolingelb (E104) und Indigocarmin (E132). Die Drucktinte enthält Kaliumhydroxid, Eisenoxid schwarz (E172), Propylenglycol und Schellack.

Wie Lyme cycline Brown & Burk aussieht und Inhalt der Packung

Lyme cycline Brown & Burk Kapseln sind Hartgelatinekapseln, die ein gelbes Kapselunterteil und eine rote Kappe haben, auf die NM aufgedruckt ist.

Lyme cycline Brown & Burk Kapseln sind in Blisterpackungen in Schachteln zu 28 oder 56 Kapseln abgepackt. Jede Blisterpackung enthält 7 Kapseln und jeder Karton enthält 4 oder 8 Blisterpackungen. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Brown & Burk IR Limited
22 Northumberland Road,
Ballsbridge, Dublin 4,
Ireland

Hersteller

KINEDEXE UK Limited
Unit 15 Moorcroft
Harlington Road
Uxbridge, UB8 3HD
Vereinigtes Königreich

Zulassungsnummer

BE437236

Art der Abgabe

Verschreibungspflichtig.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten unter folgenden Namen zugelassen:

Vereinigtes Königreich: Lymecycline 408 mg capsules
Belgien: Lymecycline Brown & Burk 408 mg gélules/harde capsules/hartkapseln
Dänemark: Lymecyclin Brown & Burk
Finnland: Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapselit
Irland: Rimicorim 300mg Capsules
Norwegen: Lymecycline Brown & Burk 300 mg harde kapsler
Schweden: Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2023.