

Notice : information de l'utilisateur

Lymecycline Brown & Burk 408 mg gélules Lymécycline (équivalent à 300 mg de tétracycline base)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOUS.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.'
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.'

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Lymecycline Brown & Burk et dans quel cas est-il utilisé?
2. Ce que vous devez savoir avant de prendre Lymecycline Brown & Burk
3. Comment prendre Lymecycline Brown & Burk
4. Les effets secondaires éventuels
5. Comment conserver Lymecycline Brown & Burk
6. Contenu du paquet et autres informations

1. Qu'est-ce Lymecycline Brown & Burk et dans quel cas est-il utilisé?

La lymécycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

La lymécycline est principalement préconisée dans le traitement de formes modérées à sévères d'acné. L'acné se manifeste par des comédons et des pustules (boutons et points noirs). La lymécycline agit sur la bactérie principalement responsable des symptômes de l'acné. Le nom de cette bactérie est *Propionibacterium acnes*.

Si vous n'êtes pas sûr(e) de la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, adressez-vous à votre médecin.

2. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE LYMECYCLINE Brown & Burk

Ne prenez jamais Lymecycline Brown & Burk:

- si vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse, ou si vous allaitez
- si vous êtes allergique à la lymécycline ou à d'autres antibiotiques de la famille des tétracyclines tels que la doxycycline, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés à la rubrique 6. Une réaction allergique peut se manifester notamment par une éruption cutanée ou des démangeaisons.
- vous avez déjà souffert d'une maladie rénale
- La lymécycline ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 8 ans.
- La lymécycline ne doit pas être prise en association avec des médicaments qui contiennent des rétinoïdes administrés par voie orale (notamment certains autres médicaments utilisés dans le traitement de l'acné)

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Lymecycline Brown & Burk si vous,

- avez déjà eu une atteinte du foie ou des reins ;

- souffrez de lupus érythémateux systémique (une affection allergique qui provoque des douleurs articulaires, des éruptions cutanées ou de la fièvre) ou de myasthénie grave (une maladie qui affaiblit les muscles) ;
- avez déjà développé des éruptions cutanées en réponse à une exposition à la lumière du soleil ou à des lampes à bronzer.

L'utilisation à long terme d'antibiotiques peut entraîner une infection bactérienne résistante (les bactéries à l'origine de l'infection ne répondent pas au traitement antibiotique.).

Prenez le médicament avec une quantité suffisante d'eau pour éviter les irritations et les ulcères de l'œsophage.

Autres médicaments et Lymécycline

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas les médicaments suivants en même temps que Lymécycline, car ils pourraient affecter l'efficacité de Lymécycline. Attendez au moins deux à trois heures après la prise de Lymécycline avant de prendre ces types de produits :

- remèdes contre l'indigestion
- médicaments pour aider à la cicatrisation des ulcères
- quinapril (pour l'hypertension artérielle)
- suppléments contenant du calcium, de l'aluminium, du magnésium, du zinc ou du fer
- charbon actif, chélates du bismuth et sucralfate
- didanosine pour l'infection par le VIH

Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- médicaments pour fluidifier votre sang, p. ex. warfarine
- diurétiques (utilisés pour traiter les maladies rénales, les maladies cardiaques ou l'hypertension artérielle)
- rétinoïdes systémiques, y compris les rétinoïdes oraux (pour traiter l'acné, p. ex. Roaccutane), ou médicaments contenant de fortes doses de vitamine A (voir la partie « Ne prenez pas de Lymécycline » ci-dessus).
- si vous prenez un traitement à base de lithium, ce médicament peut augmenter les taux de lithium dans votre sang
 - si vous prenez une pilule contraceptive, celle-ci peut ne pas fonctionner correctement pendant que vous prenez de la lymécycline, en particulier si vous êtes malade ou si vous avez la diarrhée, quelle qu'en soit la raison. Une méthode de contraception supplémentaire de type « barrière » (p. ex., un préservatif) doit être utilisée pour vous assurer de ne pas tomber enceinte. Veuillez lire la notice de votre « pilule », ou parler à votre médecin ou à votre pharmacien en cas de doute sur ce que vous devez faire ou sur la durée de ces précautions.

Informez votre médecin si vous allez subir une intervention nécessitant une anesthésie, car la lymécycline ne peut pas être utilisée avec certains anesthésiques, p. ex. le méthoxyflurane.

La tétracycline peut entraîner un test urinaire faussement positif pour le glucose. Informez votre médecin si vous prenez de la lymécycline et que vous avez besoin de pratiquer un test urinaire.

Lymécycline Brown & Burk avec des aliments et des boissons

L'absorption de la lymécycline n'est pas affectée par des quantités modérées de lait. Veuillez à toujours prendre vos gélules de Lymécycline Brown & Burk avec un verre d'eau.

Grossesse et allaitement

Vous ne devez pas prendre la lymécycline si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

L'utilisation des médicaments tels que la lymécycline peut affecter la croissance correcte des dents de lait et entraîner une décoloration dentaire permanente.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La Lymécycline ne devrait pas affecter l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines''.

3. COMMENT PRENDRE LYMECYCLINE Brown & Burk.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. La dose correcte est précisée sur l'étiquette que votre pharmacien a placée sur le flacon. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes et enfants de plus de 12 ans

Acnémodérée à sévère :

La posologie usuelle est de 1 gélule de Lymécycline Brown & Burk par jour, de préférence le matin. La durée de votre traitement par Lymécycline Brown & Burk va dépendre de la rapidité de l'amélioration de votre état. Pour l'acné, la durée du traitement est normalement d'au moins 8 à 12 semaines. Votre médecin pourra décider de poursuivre le traitement pendant une durée maximum de 6 mois.

Vous devez toujours prendre les gélules de Lymécycline Brown & Burk avec un verre d'eau, au cours d'un repas léger ne contenant pas de produits laitiers.

Insuffisance rénale

Dans ce cas, le médecin peut vous prescrire une dose plus faible.

Ne pas administrer Lymécycline Brown & Burk aux enfants de moins de 8 ans, car cela pourrait leur être nocif.

Si vous avez pris plus de Lymécycline Brown & Burk que vous n'auriez dû

Si vous avez pris, ou si quelqu'un d'autre a pris trop de gélules de Lymécycline Brown & Burk, appelez un médecin ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Gardez le médicament et son emballage près de vous afin de faciliter l'identification du médicament et du nombre de gélules qui ont été prises.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Lymécycline Brown & Burk, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Lymécycline Brown & Burk

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-le simplement lorsque vous vous en rendez compte et continuez comme avant, sauf s'il est temps de prendre la dose suivante. Ne prenez pas de double dose pour compenser la gélule oubliée. Vous ne devez jamais prendre plus de gélules que ce que votre médecin vous recommande.

Si vous arrêtez de prendre Lymécycline Brown & Burk

L'acné répond lentement aux antibiotiques. Il est important de respecter la durée de traitement indiquée par votre médecin. Si vous arrêtez de prendre Lymécycline Brown & Burk de façon prématurée, votre acné ou votre infection pourrait s'aggraver ou revenir.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. LES EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La lymécycline peut être à l'origine des effets indésirables suivants :

Effets indésirables fréquents ('touchant moins d'une personne sur 10) :

- nausées (mal au cœur)
- douleurs abdominales
- diarrhée
- céphalées

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être déterminée avec les données disponibles) :

- réaction allergique (hypersensibilité) provoquant un gonflement des yeux, des lèvres ou de la langue*
- boursoufflures ou desquamation sur des zones étendues de la peau*
- ulcérations ou lésions au niveau de la bouche, des lèvres, des régions génitales ou anales*
- troubles de la vue
- vertiges
- vomissements (envie de vomir)
- inflammation ou ulcération de l'œsophage, occasionnant des douleurs, des difficultés à avaler ou des aigreurs d'estomac douloureuses
- jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse)
- inflammation du foie (hépatite)
- sensibilité accrue de la peau au soleil
- augmentation de la pression dans le cerveau
- des changements dans le nombre ou le type de certaines cellules sanguines
- douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen
- modifications de certaines analyses sanguines (tests de la fonction hépatique)
- fièvre
- démangeaisons, éruption cutanée ou urticaire
- inflammation de l'intestin
- dépression
- cauchemars

Les effets secondaires suivants peuvent se produire avec les tétracyclines (famille de médicaments à laquelle appartient la lymécycline) :

- lupus érythémateux systémique (une affection allergique qui provoque des douleurs articulaires, des éruptions cutanées ou de la fièvre)
- pancréatite (inflammation du pancréas)
- modification des analyses sanguines (diminution des globules rouges, augmentation de certains globules blancs)
- augmentation du taux d'urée dans le sang qui peut être intensifiée par la prise de diurétiques en même temps que la Lymécycline
- inflammation ou ulcération de l'œsophage, occasionnant des douleurs, des difficultés à avaler ou des aigreurs d'estomac douloureuses
- difficulté à déglutir
- inflammation du pancréas
- lésions hépatiques
- décoloration dentaire
- inflammation ou douleur au niveau de la langue, de la bouche, des joues, des gencives ou des lèvres
- douleur ou démangeaisons au niveau de la région génitale
- infection à levures autour de l'anus ou de la région génitale
- infection du côlon
- des cas d'hypertension intracrânienne bénigne, dont les symptômes peuvent inclure des céphalées, des vomissements, des troubles visuels (vision floue, taches aveugles ou vision

double) ou une perte permanente de la vision, ont été rapportés lors du traitement par la tétracycline.

*Prévenez immédiatement votre médecin si vous développez des effets secondaires tels que : gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge, difficulté à respirer, urticaire, boursoufflures ou desquamation de grandes surfaces de peau, ulcérations ou lésions sur la bouche, les lèvres, les régions génitale ou anale, maux de tête sévères ou persistants, nausées sévères, ou tout trouble visuel

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet secondaire qui n'est pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets secondaires directement via Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUXELLES ou Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES Madou. Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be; e-mail: adr@afmps.be
En signalant les effets secondaires, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité de ce médicament

5. COMMENT CONSERVER LYMECYCLINE Brown & Burk

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas Lyme cycline Brown & Burk après la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage et des plaquettes après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l'emballage extérieur d'origine.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DU PAQUET ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Lyme cycline Brown & Burk

- La substance active est la lymécycline. Chaque gélule contient 408 mg de lymécycline (équivalent à 300 mg de tétracycline base).
- Les autres composants sont : stéarate de magnésium, dioxyde de silicium colloïdal.
Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), érythrosine (E127), jaune de quinoléine (E104) et indigotine (E132).
L'encre contient de l'hydroxyde de potassium, de l'oxyde de fer noir (E172), du propylène glycol et de la gomme-laque.

L'aspect de la Lyme cycline Brown & Burk et le contenu du paquet

Lyme cycline Brown & Burk se présente sous forme de gélules en gélatine dure, à corps jaune et coiffe rouge, portant l'inscription NM. Les gélules de Lyme cycline Brown & Burk sont conditionnées sous plaquettes dans des boîtes de 28 ou 56 gélules. Chaque plaquette contient 7 gélules et il y a 4 ou 8 plaquettes dans chaque boîte.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Brown & Burk IR Limited
22 Northumberland Road,
Ballsbridge, Dublin 4,
Ireland

fabricant

KINEDEXE UK Limited
Unit 15 Moorcroft
Harlington Road
Uxbridge, UB8 3HD
Royaume-Uni

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

BE437236

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les États membres sous les noms suivants:

Royaume-Uni: Lymecycline 408 mg capsules

Belgique: Lymecycline Brown & Burk 408 mg gélules/harde capsules/hartkapseln

Danemark: Lymecyclin Brown & Burk

Finlande: Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapselit

Irlande: Rimicorim 300mg Capsules

Norvège: Lymecycline Brown & Burk 300 mg harde kapsler

Suède: Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2023.