

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**  
**LYMECYCLINE BROWN & BURK 408MG HARDE CAPSULES**

lymecycline (overeenkomend met 300 mg tetracycline basis)

**LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT INNEMEN WANT ER STAAT BELANGRIJKE INFORMATIE IN VOOR U.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Neem contact op met uw arts of apotheker als u last van bijwerkingen krijgt. Dit geldt ook voor een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Lyme cycline Brown & Burk en waarvoor wordt dit middel ingenomen
2. Wat u moet weten voordat u Lyme cycline Brown & Burk inneemt
3. Hoe neemt u Lyme cycline Brown & Burk in
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lyme cycline Brown & Burk
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS LYMECYCLINE BROWN & BURK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN**

Lymecycline behoort tot de groep antibiotica die tetracyclines worden genoemd.

Lymecycline wordt voornamelijk gebruikt voor matige tot ernstige acne. Acne uit zich in de vorm van zwarte puntjes en witte bultjes die ook wel mee-eters, puistjes of pukkels worden genoemd, Lymecycline bestrijdt de bacteriën die een van de belangrijkste oorzaken van acne zijn. De naam van deze bacteriën is propionibacterium acnes.

Weet u niet zeker waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven? Neem dan contact op met uw arts.

**2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LYMECYCLINE BROWN & BURK INNEEMT**

**Wanneer mag u Lyme cycline Brown & Burk niet gebruiken?**

- U bent zwanger, u bent van plan zwanger te worden, of u geeft borstvoeding.
- U bent allergisch (overgevoelig) voor lymecycline of voor andere tetracycline-antibiotica zoals doxycycline, of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Een allergische reactie kan zich onder andere voordoen als huiduitslag of jeuk.
- U hebt ooit een nieraandoening gehad.

Lymecycline mag niet aan kinderen en jongeren worden verstrekt.

Lymecycline mag niet gebruikt worden als u reeds wordt behandeld met orale retinoïden (waaronder een aantal andere middelen gebruikt voor behandeling van acne).

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lyme cycline Brown & Burk**

Neem contact op met uw arts voordat u Lyme cycline Brown & Burk inneemt als u:

- lever- of nierproblemen heeft,
- lijdt aan systemische lupus erythematoses (een allergische aandoening die gewrichtspijn, huiduitslag of koorts veroorzaakt) of myasthenia gravis (een ziekte die de spieren verzwakt),
- ooit huiduitslag heeft gekregen bij blootstelling aan zonlicht of ultraviolette lampen.

### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

- bloedverdunners (zoals warfarine)
- laspillen (diuretica) (deze worden gebruikt voor behandeling van nierziekte of hoge bloeddruk)
- andere middelen voor de behandeling van acne waaronder isotretinoïne.

Neem de volgende geneesmiddelen niet tegelijkertijd met Lymecline Brown & Burk in omdat ze de werkzaamheid van uw geneesmiddel tegen acne kunnen beïnvloeden. Wacht minstens 2 tot 3 uur na inname van Lymecline Brown & Burk vóór u de volgende soorten geneesmiddelen inneemt:

- middelen tegen gestoorde spijsvertering
- middelen tegen maagzweren
- quinapril (tegen hoge bloeddruk)
- supplementen met calcium, aluminium, magnesium, zink of ijzer
- didanosine tegen HIV-infectie

Als u een anticonceptiepil gebruikt, kan Lymecline Brown & Burk de werkzaamheid van uw anticonceptiepil verminderen, vooral als u moet braken of diarree heeft, om welke reden ook. U moet dan een voorbehoedsmiddel (bijv. condoom) gebruiken om er voor te zorgen dat u niet zwanger wordt. Lees de bijsluiter die bij uw "pil" is ingesloten of raadpleeg uw arts of apotheker als u niet zeker weet wat u moet doen of voor hoe lang u deze voorzorgen moet gebruiken.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

De opname van lymecycline wordt niet beïnvloed door matige hoeveelheden melk. Neem Lymecline Brown & Burk -capsules altijd in met een glas water.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Gebruik geen lymecycline als u zwanger bent, of als u borstvoeding geeft.

Het gebruik van geneesmiddelen zoals lymecycline kan de normale groei van het zich ontwikkelende gebit beïnvloeden en kan tot blijvende tandverkleuring leiden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Van lymecycline is niet bekend dat het een effect heeft op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

## **3. HOE NEEMT U LYMECYCLINE BROWN & BURK IN?**

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Gebruik bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar**

#### **Matige tot ernstige acne**

De gebruikelijke dosering is één Lymecline Brown & Burk -capsule eenmaal per dag, bij voorkeur 's morgens.

Hoe lang u Lymecline Brown & Burk moet gebruiken hangt af van hoe snel uw aandoening verbetert. Dat is voor acne normaal minstens 8 tot 12 weken. Het is mogelijk dat uw arts besluit om de behandeling voort te zetten, gedurende maximaal 6 maanden.

Neem Lymecline Brown & Burk -capsules altijd in met een glas water. U moet ze innemen tijdens een lichte maaltijd die geen melkproducten bevat.

**Nierstoornissen:**

Als u aan een nierstoornis lijdt kan uw arts besluiten om uw dosering te verlagen.

**Lymecycline Brown & Burk mag niet bij kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt, dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn.**

**Heeft u te veel van Lymecycline Brown & Burk ingenomen?**

Heeft u, of iemand anders, te veel Lymecycline-capsules ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Vergeet niet om het geneesmiddel en de verpakking mee te nemen om de identificatie van het geneesmiddel te vergemakkelijken en om te weten hoeveel capsules zijn ingenomen.

**Bent u vergeten Lymecycline Brown & Burk in te nemen?**

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt en volg gewoon het doseringsschema als voorheen, tenzij het tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis capsules in om een vergeten dosis te compenseren. Neem nooit meer capsules in dan uw arts heeft voorgeschreven.

**Als u stopt met het innemen van Lymecycline Brown & Burk**

Acne reageert langzaam op behandeling met antibiotica. Het is belangrijk dat u de door uw arts voorgeschreven behandeling afmaakt. Als u voortijdig stopt met de behandeling met Lymecycline Brown & Burk, kan uw acne of infectie verergeren of terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen bij gebruik van lymecycline voorkomen:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 10 patiënten)

- misselijkheid (braakneigingen)
- buikpijn
- diarree
- hoofdpijn

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- allergische reactie (overgevoeligheid) die zwelling van de ogen, lippen of tong veroorzaakt\*
- blaarvorming of afschilfering van grote stukken van de huid\*
- ontstoken zweren of aandoeningen aan de mond, lippen, rond de geslachtsorganen en anus\*
- stoornis aan het gezichtsvermogen
- duizeligheid
- baken (ziek zijn)
- vergeling van de huid of het wit van de ogen (geelzucht)
- grotere zongevoeligheid van de huid
- verhoogde hersendruk
- veranderingen in aantal of soort van bepaalde bloedcellen
- pijn in het bovenste deel van de buik
- veranderingen van sommige bloedwaarden (leverfunctiebepalingen)
- koorts
- jeuk, huiduitslag of netelroos
- ontsteking van de darm

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen met tetracyclines (de geneesmiddelenklasse waartoe lymecycline behoort):

- slokdarmontsteking of slokdarmzweren, wat pijn of slikstoornissen veroorzaakt of pijn door brandend maagzuur
- slikstoornissen
- ontsteking van de pancreas
- leveraandoeningen
- tandverkleuring
- ontsteking of pijn aan de tong, in de mond, aan de wangen, het tandvlees of de lippen
- pijn en jeuk rond de geslachtsorganen
- gisting infectie rond de anus of geslachtsorganen
- darminfectie
- blijvend verlies van gezichtsvermogen

\*Vertel uw arts onmiddellijk als u bijwerkingen heeft zoals gezwollen gezicht, lippen, tong en keel, ademhalingsmoeilijkheden, netelroos, blaarvorming of afschilfering van grote stukken van de huid, ontstoken zweren of aandoeningen aan de mond, lippen, rond de geslachtsorganen en anus, ernstige en aanhoudende hoofdpijn, ernstige misselijkheid, of welke stoornis ook aan het gezichtsvermogen.

### **Melden van bijwerkingen**

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundig als u last van bijwerkingen krijgt. Dit geldt ook voor een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in bijlage V.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U LYMECYCLINE BROWN & BURK?**

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Gebruik Lymecycline Brown & Burk niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.
- Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in Lymecycline Brown & Burk?**

De werkzame stof is lymecycline. Elke harde capsule bevat 408 mg lymecycline (overeenkomend met 300 mg tetracycline base). De andere stoffen zijn magnesiumstearaat en colloïdaal siliciumdioxide. De andere stoffen zijn magnesiumstearaat en colloïdaal siliciumdioxide.

De capsulehuls bevat gelatine, titaandioxide (E171), erytrosine ((E127), quinoline-geel (E104) en indigotine (E132)

De drukinkt bevat kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol en schellak.

### **Hoe ziet Lymecycline Brown & Burk eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Lymecycline Brown & Burkcapsules zijn harde gelatine capsules met een gele romp en rood kapje bedrukt met "NM".

Lymecycline Brown & Burk -capsules zijn verpakt in blisterverpakkingen in doosjes met 28 of 56 capsules. Elke blisterverpakking bevat 7 capsules en elk doosje bevat 4 of 8 blisterverpakkingen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Brown & Burk IR Limited  
22 Northumberland Road,  
Ballsbridge, Dublin 4,  
Ireland

**fabrikant**

KINEDEXE UK Limited  
Unit 15 Moorcroft  
Harlington Road  
Uxbridge, UB8 3HD  
Verenigd Koninkrijk

**Nummer van de vergunning voor het in handel brengen**

BE437236

**Afleveringswijze**

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten onder de volgende namen:**

Verenigd Koninkrijk: Lymecycline 408 mg capsules

België: Lymecycline Brown & Burk 408 mg gélules/harde capsules/hartkapseln

Denemarken: Lymecyclin Brown & Burk

Finland: Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapselit

Ierland: Rimicorim 300mg Capsules

Noorwegen: Lymecycline Brown & Burk 300 mg harde kapsler

Zweden: Lymecyklin Brown & Burk 300 mg kapslar

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2021.**