

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten

Calcium und Cholecalciferol

„Für Erwachsene“

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Sie müssen D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten allerdings sorgfältig einnehmen, um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten beachten?
3. Wie ist D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten und wofür wird es angewendet?

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten ist ein Calcium-Vitamin-D₃-Ergänzungspräparat.

Es wird angewendet

- zur Prophylaxe und Behandlung eines Calcium- und Vitamin-D-Mangels bei älteren Menschen
- zur Calcium- und Vitamin-D-Ergänzung als unterstützende Behandlung einer Osteoporose (Knochenschwund)

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten beachten?

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Calcium, Vitamin D₃ oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie einen erhöhten Calciumblutspiegel haben (Hyperkalzämie);
- wenn Sie eine erhöhte Calciumausscheidung im Harn haben (Hyperkalzurie);
- wenn Sie an einer Überfunktion der Nebenschilddrüse leiden (Hyperparathyreoidismus);
- wenn Sie an Knochenmarkskrebs leiden (Myelom);
- wenn Sie an einer Krebserkrankung leiden, die Ihre Knochen befallen hat (Knochenmetastasen);
- wenn Sie eine Ruhigstellung der Gliedmaßen (verlängerte Immobilisierung) haben, begleitet von Hyperkalzämie und/oder Hyperkalzurie;
- wenn Sie Nierensteine haben (Nephrolithiasis);

- wenn Sie Calciumablagerungen in den Nieren haben (Nephrokalzinose);
- wenn Sie unter einer Vitamin-D-Übersorgung leiden (Hypervitaminose D);
- wenn Sie schwere Nierenprobleme haben;
- wenn Sie ein Kind oder ein Jugendlicher sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten einnehmen.

- Während einer Langzeittherapie müssen die Calciumspiegel in Blut und Urin sowie Ihre Nierenfunktion regelmäßig überwacht werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie zur Bildung von Nierensteinen neigen. Gegebenenfalls kann Ihr Arzt, abhängig von Ihren Blutspiegeln, die Dosis reduzieren oder die Behandlung abbrechen.
- Sie wegen Herzproblemen gleichzeitig mit Herzglykosiden oder Thiazid-Diuretika (harntreibende Mittel) behandelt werden, müssen die Calciumspiegel in Blut und Urin sowie Ihre Nierenfunktion regelmäßig überwacht werden. Gegebenenfalls kann Ihr Arzt, abhängig von Ihren Blutspiegeln, die Dosis reduzieren oder die Behandlung abbrechen.
- Sie Nierenprobleme haben, dürfen Sie D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten nur mit besonderer Vorsicht einnehmen. Ihre Calciumspiegel in Blut und Urin müssen überprüft werden. Wenn Sie schwerwiegende Nierenprobleme haben, verwenden Sie andere Formen von Vitamin D anstelle von Cholecalciferol
- Nehmen Sie zusätzliche Calcium- oder Vitamin-D-Präparate nur unter ärztlicher Kontrolle ein. Ihr Arzt wird häufige Kontrollen des Calciumspiegels in Blut und Urin anordnen.
- Nehmen Sie D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten nur mit besonderer Vorsicht ein, wenn Sie an Sarkoidose leiden (eine Erkrankung des Immunsystems, die Ihre Leber, Lunge, Haut oder Lymphknoten betreffen kann). Es besteht das Risiko, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark ist, was zu einer Überdosierung von Calcium im Körper führen kann. Die Calciumspiegel in Blut und Urin müssen überwacht werden
- Wenn Ihre Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist und Sie an Osteoporose leiden, muss dieses Arzneimittel mit besonderer Vorsicht angewendet werden, da der Calciumspiegel in Ihrem Blut ansteigen kann.
- Wenn Sie an einer Leber- oder Nierenerkrankung leiden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, da sich große Mengen Benzylalkohol in Ihrem Körper anreichern und Nebenwirkungen verursachen können (sogenannte "metabolische Azidose").

Kinder und Jugendliche

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten ist nicht zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen vorgesehen.

Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

- Bei gleichzeitiger Behandlung mit Digitalis-Glykosiden (Herzglykoside aus dem Fingerhut) kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Eine strenge ärztliche Kontrolle einschließlich EKG-Untersuchung und Kontrolle des Calciumblutspiegels ist deshalb erforderlich.
- Bei gleichzeitiger Gabe von Diuretika aus der Stoffgruppe der Thiazide (auch als Wassertabletten bezeichnet) sollte der Calciumspiegel im Blut regelmäßig kontrolliert werden, da Thiazide die Ausscheidung von Calcium mit dem Urin vermindern.
- Die Aufnahme und damit die Wirksamkeit bestimmter Antibiotika (sogenannte Tetrazykline) wird durch die gleichzeitige Gabe von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten vermindert. Diese Arzneimittel sollten mindestens 2 Stunden vor oder 4-6 Stunden nach D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen werden.
- Weiterhin können Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wie z. B. Natriumfluorid (zur Härtung des Zahnschmelzes oder zur Behandlung der Osteoporose) und Bisphosphonaten (zur Behandlung der Osteoporose) auftreten. Diese Präparate sollten daher mindestens 3 Stunden vor D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen werden.

- Zwischen der Gabe von Colestyramin (einem Präparat zur Senkung erhöhter Cholesterinspiegel) oder Abführmitteln wie z. B. flüssigem Paraffinöl und D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten sollte ein möglichst langer zeitlicher Abstand eingehalten werden, da Vitamin D andernfalls nicht richtig aufgenommen werden kann.
- Die gleichzeitige Gabe von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten und Phenytoin (einem Präparat zur Behandlung der Epilepsie) oder Barbituraten (Schlafmitteln) kann zu einer verminderten Wirkung von Vitamin D führen.
- Die gleichzeitige Gabe von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten und Glukokortikoiden (z. B. Kortison) kann zu einer verminderten Wirkung von Vitamin D und zu erniedrigten Calciumspiegeln im Blut führen.
- Die zusätzliche Einnahme von Calcium und Vitamin D sollte nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen und erfordert eine regelmäßige Überprüfung der Calciumspiegel in Blut und Urin.
- Calcium kann die Wirkung von Levothyroxin (zur Behandlung von Schilddrüsenunterfunktion) abschwächen. Aus diesem Grund sollte Levothyroxin mindestens 4 Stunden vor oder 4 Stunden nach D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen werden.
- Die Wirkung von Chinolon-Antibiotika kann herabgesetzt sein, wenn sie gleichzeitig mit Calcium eingenommen werden. Chinolon-Antibiotika sollten 2 Stunden vor oder 6 Stunden nach D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen werden.
- Calciumsalze können die Aufnahme von Eisen, Zink und Strontiumranelat vermindern. Daher sollten Präparate, die Eisen, Zink oder Strontiumranelat enthalten, mindestens zwei Stunden vor oder nach D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen werden.

Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten kann zu jeder Tageszeit mit oder ohne Nahrung eingenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass Oxalsäure (enthalten in Spinat und Rhabarber) und Phytinsäure (enthalten in Vollkornprodukten) die Calcium-Aufnahme im Darm herabsetzen können. In einem Zeitraum von 2 Stunden vor und nach dem Verzehr von Nahrungsmitteln mit einem hohen Gehalt an Oxal- oder Phytinsäure sollten Patienten keine calciumhaltigen Arzneimittel einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wenn Sie schwanger sind, können Sie D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten im Falle eines Calcium- und Vitamin-D-Mangels einnehmen.

Die tägliche Dosis von einer halben Kautablette darf nicht überschritten werden. Während der Schwangerschaft sollte die Tagesdosis an Calcium nicht höher als 1 500 mg und die Tagesdosis an Vitamin D₃ nicht höher als 600 IE (Internationale Einheiten) sein.

Eine dauerhafte Überdosierung von Calcium und Vitamin D in der Schwangerschaft muss vermieden werden, da dies zu hohen Calciumspiegeln im Blut führen und negative Auswirkungen auf das ungeborene Kind haben kann.

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten kann während der Stillzeit angewendet werden. Da Calcium und Vitamin D in die Muttermilch übergehen, halten Sie zuerst Rücksprache mit Ihrem Arzt, ob Ihr Kind bereits Vitamin-D-haltige Präparate einnimmt.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, da sich in Ihrem Körper große Mengen Benzylalkohol anreichern und Nebenwirkungen verursachen können (sogenannte "metabolische Azidose").

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten hat keinen Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten enthält Isomalt (E953), Xylitol (E967), Sorbitol (E420), Sucrose, Aspartam (E951), Propylenglykol (E1520) und Benzylalkohol

Dieses Arzneimittel enthält 370 mg Isomalt (E953) pro Kautablette. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 300 mg Xylitol (E967) pro Kautablette. Xylitol kann eine abführende Wirkung haben.

Dieses Arzneimittel enthält 103,617 mg Sorbitol (E420) pro Kautablette. Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann – festgestellt wurde.

Dieses Arzneimittel enthält 1,694 mg Sucrose pro Kautablette. Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 1 mg Aspartam (E951) pro Kautablette. Aspartam ist eine Quelle für Phenylalanin. Es kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie (PKU) haben, eine seltene angeborene Erkrankung, bei der sich Phenylalanin anreichert, weil der Körper es nicht ausreichend abbauen kann.

Dieses Arzneimittel enthält 0,031 mg Propylenglykol (E1520) pro Kautablette.

Dieses Arzneimittel enthält 0,023 mg Benzylalkohol pro Kautablette. Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, beträgt die empfohlene Dosis:

Erwachsene und ältere Menschen:

Täglich 1 Kautablette (entsprechend 1 000 mg Calcium und 880 IE (Internationale Einheiten) Vitamin D₃).

Schwangere:

Täglich eine halbe Kautablette (entsprechend 500 mg Calcium und 440 IE (Internationale Einheiten) Vitamin D₃). Die Tagesdosis von einer halben Kautablette darf nicht überschritten werden.

Art der Anwendung

Die Tablette muss zerkaut werden, bevor sie geschluckt wird. Sie kann zu jeder Tageszeit mit oder ohne Nahrung eingenommen werden.

Dauer der Behandlung

Die Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten ist eine Langzeitbehandlung. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wie lange Sie D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten einnehmen sollen (siehe auch Abschnitt 2. "Was sollten Sie vor der Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten beachten?").

Wenn Sie eine größere Menge von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Eine Überdosierung von D-vital forte orange 1 000 mg/880 IE Kautabletten kann zu Symptomen führen wie z. B. Übelkeit, Erbrechen, übermäßiger Durst, vermehrter Harndrang, Austrocknung oder Verstopfung, Unterleibsschmerzen, Muskelschwäche, Müdigkeit, psychische Störungen, Appetitlosigkeit, Knochenschmerzen, Nierenbeschwerden und, in schweren Fällen, zu unregelmäßigem Herzschlag.

Weiterhin sehr selten: Reizbarkeit, anhaltende Kopfschmerzen, Benommenheit, Muskelkrämpfe und -zuckungen, und Kribbelgefühl.

Wenn Sie die Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten vergessen haben

Wenn Sie die Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten vergessen haben, nehmen Sie die Tablette ein sobald Sie sich daran erinnern. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten abbrechen

Wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden möchten, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen können mit bestimmten Häufigkeiten auftreten, die folgendermaßen definiert sind:

- Sehr häufig: tritt bei mehr als 1 von 10 Anwendern auf
- Häufig: tritt bei weniger als 1 von 10 Anwendern auf
- Gelegentlich: tritt bei weniger als 1 von 100 Anwendern auf
- Selten: tritt bei weniger als 1 von 1 000 Anwendern auf
- Sehr selten: tritt bei weniger als 1 von 10 000 Anwendern auf
- Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Beenden Sie sofort die Einnahme von D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten und suchen sofort einen Arzt auf, wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken:

Selten:

- Übelkeit (Nausea), Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfung, Blähungen (Flatulenz), Völlegefühl, Bauchschmerzen.
- Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht.

Gelegentlich:

- Hohe Calciumspiegel im Blut (Hyperkalzämie: mögliche Symptome wie starker Durst, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Verstopfung, Bauchschmerzen, Knochenschmerzen, größere Harnmengen als üblich, Muskelschwäche, Schläfrigkeit, Verwirrtheit, Müdigkeit und in schweren Fällen Herzrhythmusstörungen) oder im Urin (Hyperkalzurie).

Sehr selten:

- Milch-Alkali-Syndrom (wird üblicherweise nur bei Überdosierung beobachtet, siehe "Wenn Sie eine größere Menge D-vital forte 1000 mg/880 IE Kautabletten eingenommen haben, als Sie sollten").

Nicht bekannt:

- Überempfindlichkeitsreaktionen wie Schwellung von Gesicht, Zunge, Lippen (Angioödem) oder Schwellung im Rachen (Larynxödem) mit plötzlicher Atemnot und starkem Hautausschlag.
- Wenn Sie an einer eingeschränkten Nierenfunktion leiden, haben Sie ein erhöhtes Risiko für das Auftreten erhöhter Phosphatmengen im Blut, erhöhter Calciummengen in den Nieren sowie die Bildung von Nierensteinen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz

Avenue Galilée Galileelaan 5/03 1210 BRÜSSEL	Postfach 97 1000 BRÜSSEL Madou
--	--------------------------------------

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
crpv@chru-nancy.fr

Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87

Fax : (+33) 3 83 65 61 33

oder

Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la Santé à Luxembourg

pharmacovigilance@ms.etat.lu

Tél.: (+352) 247-85592

Fax : (+352) 247-95615

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton oder der Blisterpackung nach "EXP.:" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten enthält

- Die Wirkstoffe sind: Calcium und Cholecalciferol. Jede Kautablette enthält:
 - 2 500 mg Calciumcarbonat (entsprechend 1 000 mg Calcium)
 - 8,8 mg Cholecalciferol-Trockenkonzentrat (Pulverform) (entsprechend 22 µg Cholecalciferol = 880 IE Vitamin D₃).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Isomalt (E953); Xylitol (E967); Sorbitol (E420); Citronensäure wasserfrei; Natriumdihydrogencitrat; Magnesiumstearat; Carmellose-Natrium; Orangenaroma CPB 239 (enthält natürliches Orangenölkonzentrat; natürliches / naturidentisches Mandarinenöl; natürliches / naturidentisches tropisches flüssiges Fruchtaroma; natürliches / naturidentisches Orangenöl; natürliches / naturidentisches Aroma mit mehreren Früchten; Mannit (E421); Maltodextrin; Gluconolacton; Sorbitol 1,953%; Propylenglykol 0,382%, Benzylalkohol 0,28% und Natrium 0,001%); Orangenaroma CVT 255 (enthält natürliches Orangenöl; natürliches Mandarinenöl; naturidentisches Orangengeschmackspulver; Mannitol (E421); Gluconolacton; Sorbitol (E420) 1,763%; mittelkettige Triglyceride); Aspartam (E951); Acesulfam-Kalium; Cholecalciferol-Konzentrat (enthält Natriumascorbat; all-rac-alpha-Tocopherol; Stärke; modifiziert (Mais); Sucrose; mittelkettige Triglyceride; kolloidiales Siliciumdioxid).

Wie D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten aussieht und Inhalt der Packung

D-vital forte orange 1000 mg/880 IE Kautabletten sind runde, weiße Tabletten mit glatter Oberfläche und einer Bruchkerbe. Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

Die Kautabletten sind in einer Blisterpackung aus laminiertes Aluminium/Papier-Folie in folgenden Packungsgrößen erhältlich: 6, 10, 20, 30, 40, 48, 60, 60 (Bündelpackung 2x30), 90, 90 (Bündelpackung 3x30), 96, 100 (Bündelpackung 5x20) Kautabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Belgien

Will-Pharma
Rue du Manil 80
B-1301 Wavre

Luxembourg

Will-Pharma Luxembourg
Rue du Merschgrund 54
L-8373 Hobscheid

Hersteller

Hermes Pharma GmbH
Georg-Kalb-Straße 5
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland

Zulassungsnummer

Belgien: BE420901
Luxembourg: 2012050202

Art der Abgabe

Belgien: Apothekenpflichtig
Luxembourg: Apothekenpflichtig

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

[NL/H/5267/001/IA/003]

BE_PIL_de_v.1.1_27082021

BE	D-vital forte orange 1000 mg/880 UI comprimés à croquer/kauwtabletten/Kautabletten
LU	D-vital forte orange 1000 mg/880 UI comprimés à croquer/kauwtabletten/Kautabletten
NL	Calci-BoneD3 1000 mg/880 I.E., orange, kauwtabletten

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 08/2021.