

Notice : information du patient

Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg comprimés pelliculés **Perindopril/Indapamide Viatris 5 mg/1,25 mg comprimés pelliculés** *périndopril arginine et indapamide*

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Perindopril/Indapamide Viatris et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Perindopril/Indapamide Viatris
3. Comment prendre Perindopril/Indapamide Viatris
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Perindopril/Indapamide Viatris
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Perindopril/Indapamide Viatris et dans quel cas est-il utilisé ?

Perindopril/Indapamide Viatris est une association de deux substances actives, le périndopril et l'indapamide. Il s'agit d'un antihypertenseur utilisé dans le traitement de l'hypertension.

Le périndopril appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA), qui élargissent les vaisseaux sanguins et facilitent ainsi le travail du cœur, qui pompe le sang à travers les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique, c'est-à-dire un type de médicament qui augmente la quantité d'urine produite par les reins. Ces deux substances actives agissent ensemble pour réduire et contrôler votre tension artérielle.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Perindopril/Indapamide Viatris ?

Ne prenez jamais Perindopril/Indapamide Viatris

- si vous êtes allergique au périndopril ou à tout autre inhibiteur de l'ECA, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés à la rubrique 6),
- si vous avez déjà présenté des symptômes tels qu'une respiration sifflante, un gonflement du visage ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées graves lors d'un traitement antérieur par un inhibiteur de l'ECA, ou si vous ou un membre de votre famille avez présenté ces symptômes dans toute autre circonstance (il s'agit d'un trouble appelé œdème de Quincke),
- si vous avez pris ou si vous prenez actuellement l'association sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter un type d'insuffisance cardiaque de longue durée

(chronique) chez les adultes, car le risque d'angio-œdème (gonflement rapide sous la peau dans une région telle que la gorge) est augmenté. L'association sacubitril/valsartan ne doit pas être initiée moins de 36 heures après la dernière dose de Perindopril/Indapamide Viatris. Si le traitement par l'association sacubitril/valsartan est arrêté, le traitement par Perindopril/Indapamide Viatris ne doit pas être initié moins de 36 heures après la dernière dose de l'association sacubitril/valsartan,

- si vous souffrez d'une maladie hépatique grave ou d'une maladie appelée encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous souffrez d'une maladie rénale grave ou si vous êtes sous dialyse,
- si vous avez un taux faible ou élevé de potassium dans le sang
- si l'on soupçonne que vous souffrez d'une insuffisance cardiaque décompensée non traitée (rétention hydrique importante, difficulté à respirer),
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (dans ce cas, il est préférable d'éviter Perindopril/Indapamide Viatris, voir rubrique 'Grossesse et allaitement'),
- si vous allaitez,
- Perindopril/Indapamide Viatris contient de l'huile de soja. Si vous êtes allergique aux arachides ou au soja, n'utilisez pas ce médicament.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle

Avertissements et précautions

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Perindopril/Indapamide Viatris :

- si vous avez une sténose de l'aorte (rétrécissement du principal vaisseau sanguin conduisant au cœur), une cardiomyopathie hypertrophique (maladie du muscle cardiaque), ou une sténose de l'artère rénale (rétrécissement de l'artère approvisionnant le rein en sang),
- si vous souffrez de tout autre problème de cœur ou de reins,
- si vous avez de problèmes de foie,
- si vous souffrez d'une maladie du collagène (maladie cutanée), telle que le lupus érythémateux disséminé ou la sclérodermie,
- si vous souffrez d'athérosclérose (durcissement des artères),
- si vous souffrez d'hyperparathyroïdie (hyperactivité de la glande parathyroïde),
- si vous souffrez de goutte,
- si vous êtes diabétique,
- si vous suivez un régime pauvre en sel ou utilisez des substituts de sels contenant du potassium,
- si vous prenez du lithium ou des diurétiques d'épargne potassique (spironolactone, triamterène), car il faut éviter de les prendre en association avec Perindopril/Indapamide Viatris (voir rubrique 'Prise d'autres médicaments).
- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - un « antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II » (ARA-II) (aussi connu sous le nom de sartans – par exemple valsartan, telmisartan, irbésartan), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
 - Aliskiren
- si vous prenez l'un des médicaments suivants, le risque d'angio-œdème (gonflement rapide sous la peau dans des zones telles que la gorge) est augmenté :
 - racécadotril, un médicament utilisé pour traiter la diarrhée,
 - médicaments utilisés pour prévenir le rejet d'organes transplantés et contre le cancer (p. ex. temsirolimus, sirolimus, évérolimus),
 - vildagliptine, un médicament utilisé pour traiter le diabète.
- Si vous présentez une diminution de la vision ou une douleur oculaire. Ces dernières pourraient être des symptômes d'une accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroïdien) ou d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et pourraient se produire dans un délai de quelques heures à une semaine après

la prise de Perindopril/Indapamide Viatris. En l'absence de traitement, cela peut conduire à une altération définitive de la vision. Si vous avez déjà eu une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais Perindopril/Indapamide Viatris ».

Si vous pensez être enceinte (ou pouvoir le devenir), vous devez en informer votre médecin. Perindopril/Indapamide Viatris n'est pas recommandé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois, car il peut nuire gravement à votre bébé pendant cette période de la grossesse (voir rubrique 'Grossesse et allaitement').

Lorsque vous prenez Perindopril/Indapamide Viatris, vous devez aussi informer votre médecin ou l'équipe médicale :

- si vous devez subir une anesthésie et/ou une intervention chirurgicale,
- si vous avez récemment souffert de diarrhée ou de vomissements ou si vous êtes déshydraté(e),
- si vous devez subir une dialyse ou une aphérèse des LDL (qui consiste à éliminer le cholestérol de votre sang à l'aide d'une machine),
- si vous devez subir un traitement de désensibilisation visant à diminuer les effets d'une allergie aux piqûres d'abeilles ou de guêpes,
- si vous devez subir un test médical nécessitant l'injection d'un produit de contraste iodé (substance permettant de visualiser sur les radiographies des organes comme le rein ou l'estomac)

Les athlètes doivent être informés du fait que Perindopril/Indapamide Viatris contient une substance active (indapamide) susceptible de provoquer une réaction positive aux tests antidopage.

Perindopril/Indapamide Viatris ne doit pas être administré aux enfants.

Autres médicaments et Perindopril/Indapamide Viatris

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance

Ne prenez jamais Perindopril/Indapamide Viatris si vous prenez les médicaments suivants :

- lithium (pour le traitement de la dépression)

Le traitement par Perindopril/Indapamide Viatris ne doit pas être démarré moins de 36 heures après la dernière dose de l'association sacubitril/valsartan. L'association sacubitril/valsartan ne doit pas être démarrée moins de 36 heures après la prise de la dernière dose du traitement par Perindopril/Indapamide Viatris.

Le traitement par Perindopril/Indapamide Viatris peut être influencé par d'autres médicaments. Veillez à informer votre médecin si vous prenez les médicaments suivants, car une attention particulière peut s'avérer nécessaire :

- autres médicaments traitant l'hypertension,
- procaïnamide (pour le traitement des battements cardiaques irréguliers),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte),
- terfénadine ou astémizole (antihistaminiques contre le rhume des foins ou les allergies),
- corticostéroïdes utilisés pour traiter diverses affections, notamment l'asthme sévère et la polyarthrite rhumatoïde,

- immunosuppresseurs utilisés pour traiter des maladies auto-immunes, ou pour éviter un rejet après une greffe (p. ex. ciclosporine),
- médicaments pour le traitement du cancer,
- érythromycine par injection (un antibiotique),
- halofantrine (utilisée pour traiter certains types de malaria),
- pentamidine (utilisée pour traiter les pneumonies),
- or injectable (utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde),
- vincamine (utilisée pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les personnes âgées, notamment les pertes de mémoire),
- bépridil (utilisé pour traiter l'angine de poitrine),
- sultopride (pour le traitement des psychoses),
- médicaments contre les troubles du rythme cardiaque (p. ex. quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol),
- digoxine ou autres glycosides cardiotoniques (pour le traitement des problèmes cardiaques),
- baclofène (pour traiter la rigidité musculaire survenant dans les maladies comme la sclérose en plaques),
- médicaments traitant le diabète, comme l'insuline, la metformine ou la gliptine,
- calcium y compris les suppléments de calcium,
- laxatifs stimulants (p. ex. séné),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (p. ex. ibuprofène) ou salicylés à dose élevée (p. ex. aspirine),
- amphotéricine B par injection (pour traiter les maladies fongiques graves),
- médicaments traitant les troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété ou la schizophrénie... (p. ex. antidépresseurs tricycliques ou neuroleptiques),
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),
- suppléments de potassium (y compris substitués de sel), diurétiques d'épargne potassique et autres médicaments qui peuvent augmenter la quantité de potassium dans votre sang (p. ex. triméthoprime et co-trimoxazole pour les infections bactériennes ; ciclosporine, un immunosuppresseur utilisé pour prévenir le rejet d'organes transplantés ; et héparine, un médicament utilisé pour fluidifier le sang en prévention de la formation de caillots).

Le traitement par Perindopril/Indapamide Viatris peut être affecté par d'autres médicaments. Votre médecin pourrait avoir besoin de modifier la dose de vos médicaments et/ou prendre d'autres précautions, si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- si vous prenez un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA-II) ou de l'aliskiren (voir aussi les informations dans les rubriques « Ne prenez jamais Perindopril/Indapamide Viatris » et « Avertissements et précautions »).
- médicaments, qui sont le plus souvent utilisés pour traiter la diarrhée (racécadotril) ou pour éviter les rejets d'organes transplantés (sirolimus, évérolimus, temsirolimus et autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs de mTOR). Voir rubrique « Avertissements et précautions ».
- association sacubitril/valsartan (utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque chronique). Voir rubrique « Ne prenez jamais Perindopril/Indapamide Viatris ».
- vildagliptine, un médicament utilisé pour traiter le diabète. Voir rubrique « Avertissements et précautions ».

Perindopril/Indapamide Viatris avec des aliments et boissons

Il est préférable de prendre Perindopril/Indapamide Viatris avant le repas.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Si vous pensez être enceinte (ou pouvoir le devenir), vous devez en informer votre médecin. En principe, votre médecin vous recommandera d'arrêter Perindopril/Indapamide Viatris avant de tomber enceinte, ou dès que vous savez que vous êtes enceinte, et vous conseillera de prendre un autre médicament à la place de Perindopril/Indapamide Viatris. Perindopril/Indapamide Viatris n'est pas recommandé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois, car il peut nuire gravement à votre bébé s'il est pris après le troisième mois de grossesse.

Allaitement

Ne prenez jamais Perindopril/Indapamide Viatris si vous allaitez. Informez votre médecin immédiatement si vous allaitez ou si vous allez commencer à allaiter.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Perindopril/Indapamide Viatris n'altère généralement pas la vigilance, mais différentes réactions peuvent survenir chez certains patients, telles qu'un étourdissement ou une fatigue liés à une baisse de la tension sanguine. Si vous présentez ces réactions, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être altérée.

Perindopril/Indapamide Viatris contient du lactose et de l'huile de soja

Si votre médecin vous a dit que vous souffrez d'une intolérance à certains sucres, tels que le lactose, consultez-le avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes allergique aux arachides ou au soja, n'utilisez pas ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Perindopril/Indapamide Viatris ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 comprimé une fois par jour. Votre médecin peut décider d'augmenter la dose à 2 comprimés par jour ou de modifier le schéma posologique si vous souffrez d'insuffisance rénale. Prenez votre comprimé de préférence le matin et avant un repas. Avalez le comprimé avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de Perindopril/Indapamide Viatris que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de comprimés, prenez **immédiatement** contact avec votre médecin, votre pharmacien, le centre Antipoison (070/245.245) ou avec le service d'urgence hospitalier le plus proche. L'effet le plus probable en cas de surdosage est une hypotension. Si une hypotension importante survient (symptômes tels qu'étourdissement ou évanouissement), il peut être utile de s'allonger avec les jambes surélevées.

Si vous oubliez de prendre Perindopril/Indapamide Viatris

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle. **Ne** prenez **pas** de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Perindopril/Indapamide Viatris

Étant donné que le traitement de l'hypertension dure généralement toute la vie, vous ne devez pas arrêter ce médicament sans en avoir discuté au préalable avec votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Perindopril/Indapamide Viatris peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous développez l'un des symptômes suivants, **arrêtez** tout de suite de prendre le médicament et consultez immédiatement votre médecin :

- gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, difficulté à respirer
- étourdissement grave ou évanouissement,
- rythme cardiaque anormalement rapide ou irrégulier.
- Diminution de la vision ou douleur dans les yeux, signes possibles d'une accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroïdien).

Par ordre décroissant de fréquence, les effets indésirables peuvent inclure :

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 utilisateur sur 10) :

- maux de tête, sensation d'étourdissement, vertige, sensation d'ébriété due à une hypotension,
- troubles visuels,
- acouphène (sensation de bruits dans les oreilles),
- toux, essoufflement,
- affections gastro-intestinales (nausées, douleur épigastrique, anorexie, vomissements, douleur abdominale, troubles du goût, bouche sèche, dyspepsie ou digestion difficile, diarrhée, constipation),
- réactions allergiques (telles qu'éruptions cutanées, démangeaisons),
- crampes, sensation de fourmillements,
- sensation de fatigue,
- diminution du taux de potassium dans le sang.

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 utilisateur sur 100) :

- sautes d'humeur, troubles du sommeil,
- bronchospasme (compression de la poitrine, respiration sifflante et essoufflement),
- œdème de Quincke (les symptômes incluent une respiration sifflante et un gonflement du visage ou de la langue),
- purpura (points rouges en forme de pointe sur la peau), urticaire,
- problèmes de reins,
- impuissance (incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection),
- diminution du taux de sodium dans le sang pouvant entraîner une déshydratation et une pression artérielle basse
- transpiration,
- dépression.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 utilisateur sur 1000)

- aggravation du psoriasis,
- urines foncées, nausées ou vomissements, crampes musculaires, confusion et convulsion. Ces symptômes peuvent être ceux d'un trouble appelé SIADH (Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique). Si vous présentez ces symptômes, contactez votre médecin dès que possible.
- diminution ou absence de production d'urine,
- bouffée congestive,

- insuffisance rénale aigüe,
- diminution du taux de chlorure dans le sang,
- diminution du taux de magnésium dans le sang.

Très rare (peut affecter jusqu'à 1 utilisateur sur 10 000)

- confusion,
- affections cardiovasculaires (battements cardiaques irréguliers, angor, crise cardiaque),
- pneumonie éosinophile (un type rare de pneumonie),
- rhinite (nez bouché ou écoulement nasal),
- manifestations cutanées graves telles qu'un érythème polymorphe,
- si vous souffrez d'un lupus érythémateux disséminé (un type de maladie du collagène), celui-ci peut s'aggraver,
- des cas de réactions de photosensibilité (modification de l'aspect de la peau) après une exposition au soleil ou aux rayons UVA artificiels ont également été rapportés,
- des affections du sang, des reins, du foie ou du pancréas et modifications des valeurs de laboratoire (tests sanguins) peuvent survenir,
- votre médecin devra peut-être effectuer des tests sanguins pour surveiller votre état de santé,
- en cas d'insuffisance hépatique (problèmes de foie), il existe un risque de développement d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
1000 Bruxelles
Madou
Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail : adr@afmps.be

Luxembourg :

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
ou
Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé
Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Perindopril/Indapamide Viatris

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg et 5 mg/1,25 mg après la date de péremption mentionnée sur le flacon, la boîte ou la plaquette thermoformée après 'EXP'. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg et 5 mg/1,25 mg conditionné en flacons ne doit pas être utilisé pendant plus de 6 mois après la première ouverture du flacon.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Perindopril/Indapamide Viatris

Les substances actives sont le périndopril arginine et l'indapamide.

Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg :

Un comprimé contient 2,5 mg de périndopril arginine et 0,625 mg d'indapamide

Perindopril/Indapamide Viatris 5 mg/1,25 mg :

Un comprimé contient 5 mg de périndopril arginine et 1,25 mg d'indapamide.

Les autres composants sont :

Noyau :

Silice colloïdale hydrophobe, lactose monohydraté (voir rubrique 2 « Perindopril/Indapamide Viatris contient du lactose et de l'huile de soja »), stéarate de magnésium, maltodextrine, povidone (K 30), glycolate d'amidon sodique (de type A).

Pelliculage (Opadry AMB Blanc OY-B-28920) :

Lécithine (de soja) (E322) (voir rubrique 2 « Perindopril/Indapamide Viatris contient du lactose et de l'huile de soja »), alcool polyvinylique, talc (E553b), dioxyde de titane (E171), gomme de xanthane (E415).

Aspect de Perindopril/Indapamide Viatris et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg sont des comprimés pelliculés blancs en forme de gélules, biconvexes, comportant l'impression 'P', une barre de cassure et '1' sur une face et l'impression 'M', une barre de cassure et '1' sur l'autre face.

Les comprimés pelliculés Perindopril/Indapamide Viatris 5 mg/1,25 mg sont des comprimés pelliculés blancs en forme de gélules, biconvexes, portant l'impression 'PI' sur une face et l'impression 'M2' sur l'autre face.

Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg est disponible en plaquettes thermoformées de 10, 14, 30, 60, 90 et 100 comprimés pelliculés et en flacon en plastique de 30 comprimés pelliculés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Perindopril/Indapamide Viatris 5 mg/1,25 mg est disponible en plaquettes thermoformées de 10, 14, 30, 60, 90 et 100 comprimés pelliculés et en flacon en plastique de 30 comprimés pelliculés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Viatris GX

Terhulpesteenweg 6A

B-1560 Hoeilaart

Fabricant

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoye Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlande

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, 2900, Hongrie

Mylan Germany GmbH, Benzstrasse 1, Bad Homburg 61352, Allemagne

Numéros d’Autorisation de Mise sur le Marché

BE:

2,5 mg/0,625 mg

Flacon: BE414276

Plaquettes thermoformées: BE414267

5 mg/1,25 mg

Flacon : BE414294

Plaquettes thermoformées : BE414285

LU:

2,5 mg/0,625 mg 2016040071

5 mg/1,25 mg 2016040072

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l’Espace Économique Européen sous les noms suivants :

Belgique	Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg comprimés pelliculés Perindopril/Indapamide Viatris 5 mg/1,25 mg comprimés pelliculés
République Tchèque	Peragimid Combi 5 mg/1,25 mg, potahované tablety
Danemark	Pergindamyl 5,0 mg/1,25 mg filmovertrukne tabletter
Finlande	Pergindamyl 2,5 mg/0,625 mg kalvopäällysteiset tabletit Pergindamyl 5,0 mg/1,25 mg kalvopäällysteiset tabletit
France	Perindopril Arginine Indapamide Viatris 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé Perindopril Arginine Indapamide Viatris 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé
Allemagne	Perindopril-Arginin/Indapamid Viatris 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten Perindopril-Arginin/Indapamid Viatris 5 mg/ 1,25 mg Filmtabletten
Hongrie	Perindopril AS PreCombo Perindopril AS Combo
Irlande	Perindopril Arginine/Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Tablets Perindopril Arginine/Indapamide Mylan 5 mg/1.25 mg Tablets
Italie	Perindopril e Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Perindopril e Indapamide Mylan 5 mg/1.25 mg
Luxembourg	Perindopril/Indapamide Viatris 2,5 mg / 0,625 mg comprimés pelliculés Perindopril/Indapamide Viatris 5 mg / 1,25 mg comprimés pelliculés
Pologne	Co-Presomyl Co-Presomyl Forte
Portugal	Perindopril + Indapamida Anova' Perindopril + Indapamida Anova'
Roumanie	Perindopril/Indapamidă Viatris 2,5 mg/0,625 mg comprimate filmate Perindopril/Indapamidă Viatris 5 mg/1,25 mg comprimate filmate
République slovaque	Perimyl Arginin Combi 2,5 mg/0,625 mg Perimyl Arginin Combi 5 mg/1,25 mg Filmom obalené tablety
Slovénie	Perindopril/indapamid Mylan 5 mg/1,25 mg filmsko obložene tablete
Pays-Bas	Perindopril arginine/Indapamide Viatris 2,5/0,625 mg, filmomhulde tabletten Perindopril arginine/Indapamide Viatris 5/1,25 mg, filmomhulde tabletten
Royaume-Uni (Irlande du	Perindopril arginine / Indapamide 5 mg/1.25 mg film-coated tablets

Nord)	
-------	--

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 09/2023.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2024.