

Notice: information de l'utilisateur**Zyvoxid 100 mg/5 ml granulés pour suspension buvable**
linézolide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Zyvoxid et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Zyvoxid
3. Comment prendre Zyvoxid
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Zyvoxid
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Zyvoxid et dans quel cas est-il utilisé?

Zyvoxid est un antibiotique du groupe des oxazolidinones qui agit en arrêtant la croissance de certaines bactéries (germes) responsables d'infections. Il est utilisé pour traiter la pneumonie et certaines infections de la peau ou sous la peau. Votre médecin déterminera si Zyvoxid est apte à traiter votre infection.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Zyvoxid?**Ne prenez jamais Zyvoxid:**

- Si vous êtes allergique au linézolide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, par exemple phénelzine, isocarboxazide, sélégiline, moclobémide). Ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson.
- Si vous allaitez. Cela est dû au fait que Zyvoxid passe dans le lait maternel et pourrait nuire à l'enfant.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Zyvoxid.

Zyvoxid ne vous convient peut-être pas si vous répondez **oui** à l'une des questions suivantes. Informez-en votre médecin si c'est le cas, car il devra contrôler votre état de santé général et votre tension artérielle avant et pendant votre traitement ou il estimera peut-être qu'un autre traitement est plus approprié pour vous.

Consultez votre médecin si vous n'êtes pas certain qu'un de ces points vous concerne.

- Souffrez-vous d'hypertension artérielle, que vous soyez traité ou pas pour cela?
- Avez-vous été diagnostiqué(e) comme ayant une thyroïde hyperactive?
- Souffrez-vous d'une tumeur des glandes surrénales (phéochromocytome) ou d'un syndrome carcinoïde (causé par des tumeurs du système hormonal, avec des symptômes de diarrhée, rougeur de la peau, respiration sifflante)?

- Souffrez-vous de dépression maniaque, d'un trouble schizo-affectif, de confusion mentale ou d'autres problèmes mentaux?
- Avez-vous des antécédents d'hyponatrémie (faible taux de sodium dans le sang) ou prenez-vous des médicaments qui abaissent les taux de sodium dans le sang, par exemple certains diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide ?
- Prenez-vous des opioïdes ?

L'utilisation de certains médicaments, notamment les antidépresseurs et les opioïdes, avec Zyvoxid peut entraîner un syndrome sérotoninergique, une affection potentiellement mortelle (voir rubrique 2 « Autres médicaments et Zyvoxid » et rubrique 4).

Faites attention avec Zyvoxid

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous:

- Êtes âgé.
- Avez facilement des contusions et si vous saignez facilement.
- Êtes anémique (présentez une baisse du taux de globules rouges).
- Êtes sujet(te) aux infections.
- Avez des antécédents de crises épileptiques.
- Avez des problèmes de foie ou de reins, en particulier si vous êtes en dialyse.
- Souffrez de diarrhée.

Informez immédiatement votre médecin si, au cours du traitement, vous souffrez de:

- Problèmes de vision tels que vision trouble, modifications de la perception des couleurs, difficulté à distinguer les détails ou si votre champ de vision se rétrécit.
- Perte de sensibilité dans les bras ou les jambes ou sensation de fourmillement ou de picotement dans les bras ou les jambes.
- Vous pourriez souffrir de diarrhée pendant ou après la prise d'antibiotiques, y compris Zyvoxid. En cas de diarrhée sévère ou persistante ou si vous constatez que vos selles contiennent du sang ou du mucus, vous devez immédiatement arrêter de prendre Zyvoxid et consulter votre médecin. Si c'est le cas, vous ne devez pas prendre de médicaments qui arrêtent ou ralentissent l'évacuation des selles.
- Nausées ou vomissements récurrents, douleurs abdominales ou respiration rapide.
- Douleurs, sensibilité ou faiblesse musculaires inexpliquées, et/ou urines foncées. Il peut s'agir de signes d'une affection grave appelée rhabdomyolyse (dégradation des muscles), pouvant entraîner des lésions rénales.
- Sensation de malaise avec faiblesse musculaire, maux de tête, confusion et troubles de la mémoire pouvant indiquer une hyponatrémie (faible taux de sodium dans le sang).

Autres médicaments et Zyvoxid

Il existe un risque d'interaction entre Zyvoxid et certains autres médicaments, qui pourrait entraîner l'apparition d'effets indésirables tels que des modifications de la tension artérielle, de la température ou du rythme cardiaque.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Informez votre médecin si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines les médicaments suivants, car Zyvoxid **ne doit pas** être pris si vous prenez déjà ces médicaments ou si vous les avez pris récemment (voir aussi rubrique 2 ci-dessus « Ne prenez jamais Zyvoxid »).

- Des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, par exemple phénelzine, isocarboxazide, sélégiline, moclobémide). Ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson.

Informez également votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants. Votre médecin décidera peut-être toutefois de vous administrer Zyvoxid, mais il devra contrôler votre état de santé général et votre tension artérielle avant et pendant votre traitement. Dans d'autres cas, votre médecin estimera peut-être qu'un autre traitement est plus approprié pour vous.

- Décongestionnants contre le rhume ou la grippe contenant de la pseudoéphédrine ou de la phénylpropanolamine.
- Certains médicaments destinés à traiter l'asthme, tels que salbutamol, terbutaline, fénotérol.
- Certains antidépresseurs appelés tricycliques ou ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine). Ils sont nombreux, notamment amitriptyline, citalopram, clomipramine, dosulépine, doxépine, fluoxétine, fluvoxamine, imipramine, lofépramine, paroxétine, sertraline.
- Des médicaments destinés à traiter la migraine, tels que sumatriptan et zolmitriptan.
- Des médicaments destinés à traiter les réactions allergiques sévères et soudaines, tels qu'adrénaline (épinéphrine).
- Des médicaments qui augmentent la tension artérielle, tels que noradrénaline (norépinéphrine), dopamine et dobutamine.
- Des opioïdes, p. ex. péthidine — utilisés pour traiter les douleurs modérées à sévères.
- Des médicaments destinés à traiter les troubles anxieux, tels que buspirone.
- Des médicaments qui empêchent le sang de coaguler, tels que warfarine.
- Un antibiotique appelé rifampicine.

Zyvoxid avec des aliments, boissons et de l'alcool

- Vous pouvez prendre Zyvoxid avant, pendant ou après le repas.
- Évitez de manger de grandes quantités de fromage affiné, d'extraits de levure ou d'extraits de soja p. ex. sauce soja, et de consommer de l'alcool, en particulier de la bière à la pression et du vin. Cela est dû au fait que Zyvoxid peut réagir avec une substance appelée tyramine, qui est naturellement présente dans certains aliments. Cette interaction peut entraîner une élévation de votre tension artérielle.
- Si vous développez un mal de tête pulsatile après avoir mangé ou bu, dites-le immédiatement à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Grossesse, allaitement et fertilité

L'effet de Zyvoxid chez la femme enceinte n'est pas connu. Il ne peut donc pas être pris pendant la grossesse sauf si recommandé par votre médecin. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne pouvez pas allaiter durant le traitement avec Zyvoxid parce qu'il passe dans le lait maternel et pourrait nuire à l'enfant.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Zyvoxid peut causer des vertiges ou des problèmes avec votre vue. Si c'est le cas, ne conduisez pas et ne manipulez pas de machines. Le fait de ne pas vous sentir bien peut compromettre votre capacité à conduire ou manipuler des machines.

Zyvoxid contient**Aspartame**

Lorsqu'il est reconstitué pour former une suspension, ce médicament contient 210 mg d'aspartame par dose, équivalent à 35 mg/5 ml. L'aspartame contient une source de phénylalanine. La phénylalanine peut être dangereuse si vous êtes atteint(e) de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement par l'organisme.

Sucrose, sorbitol, mannitol et fructose

Ce médicament contient du sucrose, du mannitol, du sorbitol et du fructose.

Lorsqu'il est reconstitué pour former une suspension, ce médicament ne contient pas plus de 100,8 mg de fructose par dose, équivalent à 16,8 mg/5 ml.

Lorsqu'il est reconstitué pour former une suspension, ce médicament ne contient pas plus de 262,8 mg de sorbitol par dose, équivalent à 43,8 mg/5 ml. Le sorbitol est une source de fructose.

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament.

Le fructose peut abîmer les dents lorsqu'il est utilisé fréquemment ou sur une longue période (par ex., pendant deux semaines ou plus).

En raison de sa teneur en mannitol et en sorbitol, la suspension buvable peut avoir un léger effet laxatif.

Sodium

Lorsqu'il est reconstitué pour former une suspension, ce médicament contient 68,43 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par dose, équivalent à 11,4 mg pour 5 ml. La quantité de sodium par dose équivaut à 3,4 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. Il faut en tenir compte si vous suivez un régime pauvre en sodium.

Benzoate de sodium

Lorsqu'il est reconstitué pour former une suspension, ce médicament contient 60 mg de benzoate de sodium par dose, équivalent à 10 mg/5 ml. Le benzoate de sodium peut augmenter les taux d'une substance appelée bilirubine. Des taux élevés de bilirubine peuvent entraîner un ictère (jaunissement de la peau et des yeux) et peuvent également provoquer des lésions cérébrales (encéphalopathie) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

Alcool (éthanol)

Lorsqu'il est reconstitué pour former une suspension, ce médicament ne contient pas plus de 6 mg d'alcool (éthanol) par dose, équivalent à 1 mg/5 ml (0,02 % p/v). La quantité d'alcool de chaque dose équivaut à moins de 0,15 ml de bière ou 0,06 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

3. Comment prendre Zyvoxid?

Adultes

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Zyvoxid se présente sous forme de granulés que vous pourrez prendre après reconstitution en suspension exclusivement par un professionnel de santé.

La dose recommandée de Zyvoxid suspension est de six cuillères de 5 ml (600 mg de linézolide) deux fois par jour (toutes les 12 heures).

Avant l'emploi, retourner doucement le flacon quelques fois. NE PAS SECOUER.

Si vous êtes en dialyse rénale, vous devez prendre Zyvoxid après votre dialyse.

Une cure de traitement dure généralement de 10 à 14 jours, mais peut parfois durer jusqu'à 28 jours. La sécurité d'emploi et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été établies pendant des périodes de traitement supérieures à 28 jours. Votre médecin décidera de la durée pendant laquelle vous devez être traité.

Pendant votre traitement avec Zyvoxid, votre médecin devra réaliser régulièrement des tests sanguins afin de contrôler votre numération globulaire.

Votre médecin devra contrôler votre vue si vous prenez Zyvoxid pendant plus de 28 jours.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Zyvoxid n'est normalement pas utilisé pour traiter les enfants et les adolescents (de moins de 18 ans).

Si vous avez pris plus de Zyvoxid que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Zyvoxid, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Zyvoxid

Prenez la dose de médicament oubliée dès que vous y pensez. Prenez la dose suivante 12 heures après et continuez à prendre le médicament toutes les 12 heures. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Zyvoxid

À moins que votre médecin ne vous dise d'arrêter le traitement, il est important que vous continuiez à prendre Zyvoxid. Si vous arrêtez de le prendre et que vos symptômes initiaux réapparaissent, informez-en immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Informez immédiatement votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien si vous présentez l'un de ces effets indésirables pendant votre traitement avec Zyvoxid.

Les effets indésirables graves (avec la fréquence entre parenthèses) du Zyvoxid sont:

- Réactions cutanées sévères (peu fréquent), gonflement, en particulier autour du visage et du cou (peu fréquent), respiration sifflante et/ou difficulté à respirer (rare). Ceci peut être le signe d'une réaction allergique et il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement avec Zyvoxid. Réactions cutanées telles qu'éruption violette en relief due à une inflammation des vaisseaux sanguins (rare), peau rouge sensible et desquamation (dermatite) (peu fréquent), éruption cutanée (fréquent), démangeaisons (fréquent).
- Problèmes de vision (peu fréquent) tels que vision trouble (peu fréquent), modifications de la perception des couleurs (fréquence indéterminée), difficulté à distinguer les détails (indéterminé) ou si votre champ de vision se rétrécit (rare).
- Diarrhée sévère contenant du sang et/ou du mucus (colite associée aux antibiotiques, y compris colite pseudo-membraneuse) qui, dans de rares circonstances, peut entraîner des complications potentiellement mortelles (peu fréquent).
- Nausées ou vomissements récurrents, douleurs abdominales ou respiration rapide (rare).
- Des crises d'épilepsie (peu fréquent) ont été signalées avec Zyvoxid.
- Syndrome sérotoninergique (fréquence indéterminée) : vous devez informer votre médecin si vous présentez agitation, confusion, délire, rigidité, tremblements, incoordination ou crises d'épilepsie, battements cardiaques rapides, problèmes respiratoires sévères et diarrhée (évoquant un syndrome sérotoninergique) lors de la prise simultanée d'antidépresseurs appelés ISRS ou d'opioïdes (voir rubrique 2).
- Saignements ou contusions inexpliqués, qui peuvent être dus à des modifications du nombre de certaines cellules dans le sang, susceptibles de modifier la coagulation sanguine ou d'entraîner une anémie (peu fréquent).
- Modifications du nombre de certaines cellules dans le sang, qui peuvent modifier votre capacité à combattre l'infection (fréquent). Certains signes d'infection comprennent: de la fièvre (fréquent), maux de gorge (peu fréquent), ulcères de la bouche (peu fréquent) et fatigue (peu fréquent).

- Rhabdomyolyse (rare) : les signes et symptômes comprennent des douleurs, une sensibilité ou une faiblesse musculaires inexplicables, et/ou urines foncées. Il peut s'agir de signes d'une affection grave appelée rhabdomyolyse (dégradation des muscles), pouvant entraîner des lésions rénales.
- Inflammation du pancréas (peu fréquent).
- Convulsions (peu fréquent).
- Accidents ischémiques transitoires (perturbation temporaire de l'irrigation cérébrale, responsable de symptômes de courte durée tels que perte de vision, faiblesse dans les jambes et les bras, élocution brouillée et perte de connaissance) (peu fréquent).
- Bourdonnements d'oreilles (acouphènes) (peu fréquent).

Un engourdissement, un fourmillement ou une vision trouble ont été signalés par des patients qui ont reçu Zyvoxid pendant plus de 28 jours. Si vous présentez des problèmes de vision, vous devez consulter votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables incluent:

Fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10):

- Infections fongiques, en particulier "muguet" vaginal ou oral.
- Maux de tête.
- Goût métallique dans la bouche.
- Diarrhée, nausées ou vomissements.
- Modifications des résultats de certains tests sanguins, notamment ceux destinés à mesurer les protéines, les sels ou les enzymes qui servent à mesurer votre fonction rénale ou hépatique ou vos taux de sucre sanguin.
- Difficulté à s'endormir.
- Augmentation de la tension artérielle.
- Anémie (baisse du taux de globules rouges).
- Vertiges.
- Douleurs abdominales localisées ou généralisées.
- Constipation.
- Indigestion.
- Douleurs localisées.
- Baisse du taux de plaquettes.

Peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100):

- Inflammation du vagin ou de la zone génitale chez les femmes.
- Sensations telles que fourmillement ou engourdissement.
- Gonflement, lésion ou changement de couleur de la langue.
- Sécheresse buccale.
- Besoin d'uriner plus fréquemment.
- Frissons.
- Sensation de soif.
- Transpiration accrue.
- Hyponatrémie (baisse du taux de sodium dans le sang).
- Hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang).
- Insuffisance rénale.
- Ballonnement abdominal.
- Augmentation du taux de créatinine.
- Douleurs à l'estomac.
- Modifications de la fréquence cardiaque (par ex. augmentation de la fréquence).
- Réduction des numérations cellulaires sanguines.
- Faiblesse et/ou modifications sensorielles.

Rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000):

- Décoloration noire de la surface de la langue, qui a une apparence velue.
- Décoloration superficielle des dents, qui peut être corrigée par un nettoyage dentaire professionnel (détartrage manuel).

Les effets indésirables suivants ont également été signalés (fréquence indéterminée: ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

- Alopecie (perte des cheveux).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be - Division Vigilance :

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Zyvoxid

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Toute suspension non utilisée doit être éliminée dans les 21 jours qui suivent la reconstitution.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Zyvoxid

- La substance active est le linézolide. Après reconstitution, chaque suspension de 5 ml contient 100 mg de linézolide.
- Les autres composants sont le sucrose, le mannitol, la cellulose microcristalline (E460), la carboxyméthylcellulose sodique (E466), l'aspartame, la silice colloïdale anhydre (E551), le citrate de sodium, la gomme xanthane, le benzoate de sodium, l'acide citrique anhydre, le chlorure de sodium, l'éthanol et des édulcorants (fructose, maltodextrine (dérivé du maïs), glycyrrhizinate mono-ammonium, sorbitol). Les aromatisants sont l'arôme d'orange, l'arôme de menthe, l'arôme de vanille et l'arôme de crème d'orange (voir rubrique 2 « Zyvoxid contient de l'aspartame ; du sucrose, du sorbitol, du mannitol et du fructose ; du sodium ; du benzoate de sodium ; et de l'alcool (éthanol) »).

Aspect de Zyvoxid et contenu de l'emballage extérieur

Zyvoxid granulés pour suspension buvable est fourni dans un flacon brun contenant un granulât/poudre de couleur blanche à jaune-orange, qui peut contenir des grumeaux blancs à jaune-orange ou des grumeaux blancs à jaune-orange-brun. Après reconstitution avec de l'eau, le liquide parfumé à l'orange (suspension) a l'aspect d'un liquide (suspension) blanc à jaune-orange. Chaque flacon est conditionné dans une boîte avec une mesurette de 2,5 ml/5 ml.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Pfizer SA, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgique.

Fabricant

Pfizer Service Company BV, Hermeslaan 11, 1932 Zaventem, Belgique.

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché

BE228322

LU 2010020717

Mode de délivrance: médicament soumis à prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Économique Européen et au Royaume-Uni (Irlande du Nord) sous les noms suivants :

Allemagne	Zyvoxid
Autriche	Zyvoxid
Belgique	Zyvoxid
Chypre	Zyvoxid
Espagne	Zyvoxid
Estonie	Zyvoxid
Finlande	Zyvoxid
France	Zyvoxid
Grèce	Zyvoxid
Irlande	Zyvox
Italie	Zyvoxid
Lettonie	Zyvoxid
Luxembourg	Zyvoxid
Malte	Zyvox
Norvège	Zyvoxid
Pays-Bas	Zyvoxid
Pologne	Zyvoxid
République Tchèque	Zyvoxid
Royaume-Uni (Irlande du Nord)	Zyvox
Slovaquie	Zyvoxid
Slovénie	Zyvoxid
Suède	Zyvoxid

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 03/2026.

Date d'approbation d'AFMPS : 05/2026

Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de santé

Instructions pour la préparation de la suspension buvable:

Le lizénolide est fourni en granulés et doit être préparé exclusivement par un professionnel de santé.

Séparer les granulés et reconstituer la suspension en ajoutant 123 ml d'eau en deux volumes approximativement égaux pour former 150 ml de suspension buvable. Secouer vigoureusement la suspension entre chaque ajout d'eau. Après reconstitution, le médicament a l'aspect d'une suspension blanche à jaune-orange.

Avant l'utilisation, retourner doucement le flacon plusieurs fois. NE PAS SECOUER.

La dose habituelle de Zyvoxid suspension est de six cuillères de 5 ml (600 mg de linézolide) deux fois par jour (toutes les 12 heures).

Tout médicament inutilisé ou déchet doit être éliminé en respectant la réglementation locale.

Voir également la rubrique 3 « Comment prendre Zyvoxid ».

BEL 26C05