

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

### Clarithromycine UNO EG 500 mg retard Filtabletten Clarithromycin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Clarithromycine UNO EG und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Clarithromycine UNO EG beachten?
3. Wie ist Clarithromycine UNO EG einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Clarithromycine UNO EG aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Clarithromycine UNO EG und wofür wird es angewendet**

Clarithromycine UNO EG ist ein Antibiotikum, das zur Gruppe der sogenannten Makrolide gehört. Antibiotika hemmen das Bakterienwachstum (Bazillen), die Infektionen hervorrufen.

Clarithromycine UNO EG Tabletten sind retard Filtabletten, was bedeutet, dass der Wirkstoff von der Tablette langsam freigesetzt wird, sodass Sie nur eine Tablette täglich einnehmen müssen.

Clarithromycine UNO EG wird angewendet zur Behandlung von Infektionen bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren, wie:

- Infektionen in der Brust, z.B. Bronchitis und Pneumonie
- Rachen- und Nebenhöhleninfektionen
- leichte bis mittelschwere Haut- und Gewebsinfektionen, wie Follikulitis, Cellulitis und Erysipel

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Clarithromycine UNO EG beachten?**

**Clarithromycine UNO EG darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Clarithromycin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Clarithromycine UNO EG oder andere Makrolid-Antibiotika, wie Erythromycin oder Azithromycin sind
- wenn Sie Ergotamin- oder Dihydroergotamin-Tabletten einnehmen oder Ergotamin-Inhaler gegen Migräne anwenden
- wenn Sie Terfenadin oder Astemizol (häufig eingenommen zur Behandlung von Heufieber oder Allergien) oder Cisaprid (angewendet zur Behandlung von Sodbrennen) oder Pimozid-Tabletten (zur Behandlung von Krankheiten, die Ihre Denk-, Fühl- oder Verhaltensweise beeinträchtigen) einnehmen. Die Einnahme dieser Arzneimittel kann in manchen Fällen schwere Herzrhythmusstörungen hervorrufen. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt über alternative Arzneimittel
- wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, von denen bekannt ist, dass sie schwere Herzrhythmusstörungen hervorrufen können
- wenn Sie Colchicine (werden üblicherweise zur Behandlung von Gicht angewendet) einnehmen,

- da dies zu schweren Nebenwirkungen führen kann
- wenn Sie Ticagrelor, Ivabradin oder Ranolazin (gegen Angina oder zur Verringerung des Risikos eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls) einnehmen.
  - wenn Sie Lovastatin oder Simvastatin (bestimmte Arzneimittel zur Senkung Ihres Cholesterins)
  - wenn Sie ein Arzneimittel einnehmen, das Lomitapid enthält
  - wenn Sie schwere Nierenprobleme haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen. Ihr Arzt kann Ihnen eine andere Form von Clarithromycin verschreiben.
  - wenn Sie bekannte Herzprobleme haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen
  - wenn Sie an Herzrhythmusstörungen (ventrikuläre Arrhythmie, einschließlich Torsade-de-Pointes-Tachykardie) litten oder derzeit leiden oder Abweichungen im Elektrokardiogramm (EKG, Aufzeichnung der elektrischen Herzaktivität), auch „langes QT-Syndrom“ genannt zu sehen waren/sind
  - wenn Sie schwere Leberprobleme haben
  - wenn Sie anormal niedrige Kaliumwerte im Blut haben (Hypokaliämie).
  - wenn Ihr Kalium- oder Magnesiumspiegel im Blut zu niedrig ist (Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie)

Clarithromycine UNO EG Tabletten sind nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren geeignet.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Clarithromycine UNO EG einnehmen

- wenn Sie irgendwelche Herz-, Leber- oder Nierenprobleme haben
- wenn Sie Clarithromycin davor mehrmals oder über einen längeren Zeitraum angewendet haben
- wenn sich bei Ihnen schwerer oder langdauernder Durchfall (pseudomembranöse Kolitis) während oder nach der Einnahme von Clarithromycine UNO EG entwickelt, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt. Dickdarmentzündung (pseudomembranöse Kolitis) wurde bei nahezu allen antibakteriellen Arzneimitteln beobachtet, einschließlich Clarithromycin
- wenn Sie gegen Lincomycin und Clindamycin allergisch sind
- wenn Ihre Blutkaliumspiegel vorher niedrig waren

Wenn Sie sich während der Einnahme von Clarithromycine UNO EG einem Bluttest unterziehen, kann er erhöhte Leberenzyme zeigen. Diese Werte kehren üblicherweise auf ein normales Niveau zurück, und es ist unwahrscheinlich, dass Symptome auftreten werden. Jedoch kann Clarithromycine UNO EG in seltenen Fällen Gelbsucht und andere Leberstörungen hervorrufen, die schwerwiegend oder in extrem seltenen Fällen sogar fatal sein können. Wenn Sie sich allgemein unwohl fühlen oder sich bei Ihnen eine Gelbfärbung der Haut und/oder der Augen entwickelt, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt. Nierenprobleme, einschließlich erhöhter Proteinspiegel, die normalerweise durch die Nieren ausgeschiedet werden, und in seltenen Fällen Niereninsuffizienz wurden ebenfalls beobachtet. Gelegentlich kann ein Bluttest auch niedrige Zahlen von weißen Blutzellen zeigen.

### **Einnahme von Clarithromycine UNO EG zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Sie dürfen Clarithromycine UNO EG nicht einnehmen, wenn Sie eines der obenerwähnten Arzneimittel im Abschnitt „Clarithromycine UNO EG darf nicht eingenommen werden,“ einnehmen.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen, weil Ihre Dosis vielleicht angepasst werden muss, oder Sie sich regelmässig Untersuchungen unterziehen werden müssen.

- Insulin oder sonstige Antidiabetika (wie z. B. Tolbutamid, Gliclazid, Glibenclamid, Nateglinid, Repaglinid)
- Digoxin, Chinidin oder Disopyramid (Herzmittel)

- Warfarin, oder andere Gerinnungshemmer, z. B. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban (zur Blutverdünnung)
- Atorvastatin, Rosuvastatin (HMG-CoA-Reductasehemmer, üblicherweise bekannt als Statine und zur Senkung des Cholesterins (eines Fetts) im Blut angewendet)
- Carbamazepin, Valproat, Phenytoin oder Phenobarbital (Arzneimittel bei Epilepsie)
- Theophyllin (zum besseren Atmen)
- Triazolam, Alprazolam oder Midazolam (Sedativa)
- Omeprazol, Aprepitant (gegen Magenstörungen)
- Zidovudin, Efavirenz, Nevirapin, Ritonavir, Atazanavir, Saquinavir, Etravirin (Antivirale Arzneimittel zur Behandlung von HIV)
- Rifabutin (ein Antibiotikum, das gegen einige Infektionen wirksam ist)
- Rifampicin, Rifapentin (zur Behandlung von Tuberkulose)
- alle Betalaktam-Antibiotika
- Streptomycin oder Gentamicin (aminoglykoside Antibiotika)
- Itraconazol, Fluconazol (Arzneimittel gegen Pilze)
- Sildenafil, Tadalafil oder Vardenafil (zur Behandlung von erektiler Dysfunktion)
- Tolterodin (zur Behandlung der Symptome des Syndroms der hyperaktiven Blase)
- Methylprednisolon (ein Kortikosteroid zur Behandlung von Entzündung)
- Vinblastin (ein Chemotherapeutikum zur Behandlung von Krebs)
- Ziprasidon oder Quetiapin (Antipsychotika)
- Eletriptan (angewendet bei Migräne)
- Halofantrin (angewendet zur Behandlung von Malaria)
- Cilostazol (angewendet zur Verbesserung der Durchblutung in den Beinen)
- Tacrolimus, Sirolimus oder Ciclosporin (bei Organtransplantationen)
- Johanniskraut (pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Depression)
- Verapamil, Amlodipin, Diltiazem (angewendet zur Behandlung von Bluthochdruck und unregelmäßigem Herzschlag).

Dies ist auch wichtig, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die

- Hydroxychloroquin oder Chloroquin (zur Behandlung von Krankheiten wie rheumatoider Arthritis oder zur Behandlung oder Vorbeugung von Malaria). Die Einnahme dieser Arzneimittel gleichzeitig mit Clarithromycin kann das Risiko von Herzrhythmusstörungen und anderen schweren Nebenwirkungen, die Ihr Herz betreffen können, erhöhen.
- Kortikosteroide, die oral, als Injektion oder als Inhalation angewendet werden (um das Immunsystem des Körpers zu unterdrücken – dies ist bei der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen nützlich)

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Nehmen Sie Clarithromycine UNO EG nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da die Sicherheit von Clarithromycine UNO EG Tabletten in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht bekannt ist.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Führen Sie kein Fahrzeug oder bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie sich benommen, schwindelig oder verwirrt während der Einnahme dieses Arzneimittels fühlen.

### **Clarithromycine UNO EG enthält Lactose.**

Bitte nehmen Sie Clarithromycine UNO EG erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. Wie ist Clarithromycine UNO EG einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie Sie Clarithromycine UNO EG einnehmen müssen.

#### ***Erwachsene und Anwendung bei Kindern (ab 12 Jahren)***

Die übliche empfohlene Dosis von Clarithromycine UNO EG bei Erwachsenen und Kindern (ab 12 Jahren) beträgt eine 500mg-Tablette einmal täglich.

Ihr Arzt kann die Dosis auf zwei 500 mg retard Tabletten bei schweren Infektion erhöhen. Sie müssen beide Tabletten zur selben Zeit einnehmen.

#### ***Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren***

Diese Tabletten sind für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet, da flüssige Arzneimittel im Allgemeinen vorzuziehen sind. Ihr Arzt wird ein anderes Arzneimittel verschreiben, das für Ihr Kind geeignet ist.

#### ***Nieren- und Leberinsuffizienz***

Patienten mit schweren Nieren- und Leberproblemen dürfen Clarithromycine UNO EG nicht einnehmen.

#### **Art der Anwendung**

- Die Tabletten müssen im Ganzen mit etwas Flüssigkeit geschluckt werden.
- Die Tabletten müssen weder zerkaut NOCH halbiert werden.
- Die Tabletten müssen einmal täglich eingenommen werden, vorzugsweise zum gleichen Zeitpunkt jeden Tag Ihres Behandlungszyklus.
- Die Tabletten müssen mit Nahrung eingenommen werden.

#### **Dauer der Behandlung**

Die übliche Behandlungsdauer beträgt 6 bis 14 Tage. Ihr Arzt wird jedoch über die Länge Ihrer Behandlung entscheiden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Clarithromycine UNO EG eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich eine grössere Menge von Clarithromycine UNO EG eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antifgiftzentrum (070/245.245), oder die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses. Nehmen Sie das Behältnis und übrig bleibende Tabletten mit. Symptome einer Überdosis umfassen Übelkeit oder Erbrechen, Durchfall, Verdauungsstörung oder Magenschmerzen und allergische Reaktionen sind möglich.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Clarithromycine UNO EG vergessen haben**

Wenn Sie die Einnahme einer Clarithromycine UNO EG-Tablette vergessen haben, nehmen Sie eine Tablette ein, sobald Sie sich daran erinnern. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Clarithromycine UNO EG abbrechen**

Brechen Sie die Einnahme von Clarithromycine UNO EG Tabletten nicht ab, weil Sie sich besser fühlen. Es ist wichtig, die Tabletten so lange einzunehmen, wie Ihnen Ihr Arzt empfohlen hat, da das Problem sonst zurückkehren kann.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem

auftreten müssen. Im Allgemeinen wird Clarithromycine UNO EG gut vertragen, und folgende Nebenwirkungen, die bei Patienten beobachtet werden, die mit Clarithromycin behandelt werden, sind hauptsächlich von leichter oder mittelschwerer Art. Die meisten Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Störungen (Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen).

Wenn eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt, **brechen Sie die Einnahme von Clarithromycine UNO EG ab** und informieren Sie **sofort** Ihren Arzt oder begeben Sie sich zur Notfallaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses:

- schwere Bauch- und Rückenschmerzen, die durch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse hervorgerufen werden.
- schwerer Durchfall mit Blut im Stuhl während oder nach der Einnahme von Clarithromycine UNO EG. Durchfall kann über zwei Monate nach der Behandlung mit Clarithromycine UNO EG auftreten.
- dunkler Urin, heller Stuhl, Gelbfärbung der Haut und/oder der Augen (Gelbsucht), Übelkeit, Fieber.
- allergische Reaktionen, einschließlich Ausschläge wurden mit Clarithromycin beobachtet. In sehr seltenen Fällen können Atembeschwerden, Ohnmacht und Anschwellung von Gesicht und Rachen auftreten, die eine Notbehandlung erfordern. Allergische Ausschläge können in Schwere von leichten juckenden Hautausschlägen bis zu einer seltenen schwereren Krankheit variieren, die Stevens-Johnson-Syndrom genannt wird (die Mund-, Lippen- und Hautgeschwüre hervorrufen kann), oder zu toxischer epidermaler Nekrolyse (die eine schwere Krankheit und ein Absterben der Haut hervorrufen kann) führen.
- wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, wenn bei Ihnen eine schwere Hautreaktion auftritt: ein roter, schuppiger Ausschlag mit Erhebungen unter der Haut und Blasen (exanthematische Pustulose). Die Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Infektion durch Bazillen hervorgerufen wurde, die Clarithromycine UNO EG nicht behandeln kann, können sich Ihre Symptome verschlimmern. Sollte dies der Fall sein, konsultieren Sie Ihren Arzt.

**Häufige Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 10 Menschen betreffen):**

- Schlaflosigkeit (Insomnie)
- Veränderungen des Geschmackssinnes (Dysgeusie)
- Bauchschmerzen
- Durchfall
- Verdauungsstörung (Dyspepsie)
- Übelkeit
- Kopfschmerzen
- Erbrechen
- abnormale Lebertests
- Ausschlag
- übermäßiges Schwitzen

**Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Menschen betreffen):**

- Entzündung des Magens und des Darms, Mundentzündung, Ausschlag, Scheidenentzündung und Scheideninfektionen
- niedrige Zahl einer bestimmten Art von weißen Blutzellen (Leukopenie)
- Überempfindlichkeit
- Appetitmangel (Anorexie), verminderter Appetit
- Angst, Nervosität
- Schläfrigkeit (Somnolenz)
- Schwindel
- Zittern (Tremor)
- Ohrensausen (Tinnitus), Schwindelgefühl oder "Drehschwindel" (Vertigo) und Beeinträchtigung des Hörvermögens

- das Herz hört auf zu schlagen (Herzstillstand), unregelmäßiger Herz- und Pulsschlag, abnormales EKG (Herzkurve), vorzeitige Herzschläge (Extrasystolen), Herzklopfen (Palpitationen)
- Nasenbluten
- Verstopfung
- Mundtrockenheit
- Regurgitation
- rektale Schmerzen
- Flatulenzen
- Magen-Darm-Störungen, einschließlich Blutung
- Entzündung der Mundhöhle
- Verfärbung der Zunge
- Veränderungen von Bluttests der Leberfunktion
- juckende Haut, Ausschlagsquaddeln
- Muskelschmerzen
- Schwäche (Asthenie)

**Häufigkeit nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)**

- Infektion des Dickdarms (pseudomembranöse Kolitis)
- bakterielle Infektionen der Haut (Erysipel)
- Reduzierung von bestimmten Blutzellen, einschließlich Blutplättchen, die die Blutgerinnung hervorrufen
- schwere allergische Reaktion, die Atembeschwerden oder Schwindel hervorrufen kann
- psychiatrische Störungen, wie Depression, abnormale Träume
- entzückt oder übertrieben erregt sein (Manie)
- Verwirrtheit
- Selbstbewusstsein (Depersonalisation)
- Desorientierung
- Dinge sehen (Halluzinationen) und andere psychotische Störungen
- Krampfanfälle (Konvulsionen)
- Verlust des Geschmackssinnes und Veränderungen des Geruchssinnes
- Prickelgefühl in der Haut (Parästhesie)
- Taubheit
- abnormale elektrische Aktivitätskurve des Herzens (EKG), Veränderungen des Herzrhythmus, lebensbedrohlicher unregelmäßiger Herzschlag
- Blutung
- Zunge- und Zahnverfärbung
- Entzündung der Bauchspeicheldrüse (akute Pankreatitis)
- Leberinsuffizienz
- Gelbfärbung der Haut oder des Augenweißes, die durch Leber- oder Blutprobleme (Gelbsucht) hervorgerufen wird
- Stevens-Johnson-Syndrom (schwere Hautkrankheit)
- toxische epidermale Nekrolyse (schwere Hautkrankheit)
- Hautausschlag mit Fieber und Entzündung der Organe einhergehend (DRESS)
- Akne
- abnormaler Muskelabbau, der zu Nierenproblemen führen kann
- Muskelschmerzen oder –schwäche
- Niereninsuffizienz
- Nierenentzündung
- Veränderungen der Urinfarbe
- Anstieg der Blutgerinnungszeit.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über: **Belgien:** Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte – Abteilung Vigilanz – Postfach 97 – B-1000 Brüssel Madou – oder über die Website: [www.notifierunefetindiserable.be](http://www.notifierunefetindiserable.be) .

**Luxemburg:** Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – E-mail: [crpv@chru-nancy.fr](mailto:crpv@chru-nancy.fr) – Tel.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 oder Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à Luxembourg – E-mail: [pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu) – Tel.: (+352) 247-85592. Link zum Formular: <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Clarithromycine UNO EG aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nach „EXP“ nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der packung und weitere Informationen

### Was Clarithromycine UNO EG enthält

- Der Wirkstoff ist: Clarithromycincitrat.  
Jede retard Filmtablette enthält 500 mg Clarithromycin.

- Die sonstigen Bestandteile sind:

#### Tablettenkern:

Lactose-Monohydrat  
Hydroxypropylmethylcellulose (E464)  
Hydroxypropylmethylcellulosephthalat  
Magnesiumstearat (E572)  
Talkum (E553b)

#### Filmüberzug:

Hypromellose (HPMC 2910)(E464)  
Lactose-Monohydrat  
Chinolingelb Aluminiumlack (E104)  
Titandioxid (E171)  
Macrogol/PEG 4000  
Macrogol/PEG 400  
Talkum (E553b)

### Wie Clarithromycine UNO EG aussieht und Inhalt der Packung

Gelbe, längliche, bikonvexe retard Tablette.

Clarithromycine UNO EG ist in Blisterpackungen erhältlich mit:  
5, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30 retard Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

*Pharmazeutischer Unternehmer*

EG (Eurogenerics) NV – Heizel Esplanade b22 – 1020 Brüssel

*Hersteller*

STADA Arzneimittel AG - Stadastraße 2–18 - 61118 Bad Vilbel - Deutschland

Stada Arzneimittel GmbH - Muthgasse 36 - 1190 Wien - Österreich

EG (Eurogenerics) NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brüssel

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

AT: Clarithromycin STADA Uno 500mg Filmtabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

BE: Clarithromycine UNO EG 500 mg retard Filmtabletten

IT: CLARITROMICINA EG STADA 500 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato

LU: Clarithromycine UNO EG 500 mg comprimés pelliculés à libération prolongée

NL: Claritromycine PharOS 500 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte

**Zulassungsnummer:** BE397275.

**Abgabeform:** verschreibungspflichtig.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt/überarbeitet im 05/2024/ 04/2024.**