

Gebrauchsinformation: information für Anwender
Neo-Sabenyl 0,8 g/100 ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung
zur Anwendung auf der Haut

Chlorophen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Neo-Sabenyl und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Neo-Sabenyl beachten?
3. Wie ist Neo-Sabenyl anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Neo-Sabenyl aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Neo-sabenyl und wofür wird es angewendet?

Neo-Sabenyl ist empfohlen zur:

- Waschen von verschmutzten oder eiternden Wunden oder einer mit Schimmel (Mykose) infizierten Haut.
- Reinigung von mit Krusten bedeckten Verletzungen, sowie von bestimmten Geschwüren (varizöse Ulcera).
- Entfernung von Ohrenschmalzpfropfen und Reinigung des entzündeten Gehörgangekzems.
- Desinfektion des sanitären Materials, der Gefäße, der Wäsche, der Bettlaken, der Windeln, des Geschirrs, der Fliesen, der Wände und so weiter.
- Desinfektion der Instrumente.
- Handwaschung, Vorbereitung des Operationsfeldes und geburtshilfliche Desinfektion (obstetrische Antisepsis).

2. Was sollten sie vor der anwendung von Neo-sabenyl beachten?

Neo-Saberyl darf nicht angewendet werden,

Wenn Sie allergisch gegen Chlorphen oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Neo-Saberyl anwenden.

- Verwenden Sie Neo-Saberyl in Wasser verdünnt.
- Um die beste desinfizierende (antiseptische) Wirkung zu erreichen, wird empfohlen, Neo-Saberyl zu verdünnen mit weichem Wasser oder mit gekochtem Wasser (15 Minuten).
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen.
- Vermeiden Sie die langfristige Anwendung von Neo-Saberyl auf großflächig infizierter Haut.
- Blut und Eiter verringern die Wirkung von Neo-Saberyl.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Anwendung von Neo-Saberyl zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Anwendung von Neo-Saberyl zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Äther (eine flüchtige Flüssigkeit) verringert die Wirkung von Neo-Saberyl.

Anwendung von Neo-Saberyl zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Die großflächige und langfristige Benutzung von Neo-Saberyl sollte bei der schwangeren Frau vermieden werden.

Stillzeit

Die großflächige und langfristige Benutzung von Neo-Saberyl sollte während der Stillzeit vermieden werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Neo-Saberyl enthält keine Hilfsstoffe mit gekannter Wirkung

3. Wie ist Neo-sabenyl anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittels immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Benutzung muss Neo-Sabenyl in Wasser verdünnt werden.

Die Wirkung von Neo-Sabenyl wird durch Seife nicht verringert.

Äußerliche Anwendung.

Die empfohlene Dosis beträgt:

- Die Reinigung der Wunden, der Läsionen mit Schorf, der bestimmten Geschwüren (varizöse Ulcera), der durch einen Schimmel (Mykose) infizierte Haut, des Gehörgangekzems und für die geburtshilfliche Desinfektion (obstetrische Antisepsis): 2 bis 5 Anteile (20 bis 50 ml) pro Liter Wasser verdünnen.
- Die Handwaschung, die Vorbereitung des Operationsfeldes und die Entfernung von Ohrenschmalzpfropfen: 5 bis 10 Anteile (50 bis 100 ml) pro Liter Wasser verdünnen.
- Die Desinfektion von Gefäßen: 2 bis 4 Anteile (20 bis 40 ml) pro Liter Wasser verdünnen.
- Die Desinfektion der Bettlaken, der Wäsche, der Windeln, des Geschirrs, der Fliesen, der Wände und so weiter.: 5 bis 10 Anteile (50 bis 100 ml) pro 5 Liter Wasser verdünnen.
- Die Desinfektion der Instrumente: 10 bis 20 Anteile (100 bis 200 ml) pro Liter Wasser verdünnen. Falls die Verchromung der Instrumente beschädigt ist, fügt man 20 g Sodabenzoat pro gebrauchsfertiges Neo-Sabenyl Lösungsliter hinzu.

Wenn Sie eine größere Menge von Neo-Sabenyl angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Neo-Sabenyl haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Falls Neo-Sabenyl zufällig heruntergeschluckt wird, kann eine Vergiftung (Intoxikation) auftreten. Sie kann sich durch Sehstörungen (Doppelsehen oder Diplopie), Verwirrtheit, Gliederzucken (Konvulsionen), Benommenheit und Atembeschwerden äußern.

Sie sollten den Arzt sofort rufen, u.a. um eine Nierenschädigung vorzubeugen.

Wenn Sie die Anwendung von Neo-Sabenyl vergessen haben

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wenn Sie die Anwendung von Neo-Sabenyl abbrechen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittels Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende Nebenwirkungen sind möglich:

- Reizungen der Haut und Schleimhäute.
- Allergisches Kontaktekzem.
- Bei Anwendung von Neo-Sabenyl auf entzündeter Haut oder Schleimhäuten ist eine systemische Wirkung bei großflächiger und längerfristiger Anwendung nicht ausgeschlossen. In diesem Fall können möglicherweise folgende Nebenwirkungen auftreten:
 - o Verwirrtheit,
 - o Krämpfe (Muskelkrämpfe und Zuckungen im ganzen Körper)
 - o Lethargie (Sie fühlen sich träge, haben wenig Energie und möchten viel schlafen)
 - o Atembeschwerden.
 - o Diplopie (Doppelbilder)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien: Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - Abteilung Vigilanz - Postfach 97 - 1000 BRÜSSEL Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@fagg-afmps.be -

Luxemburg : Centre Regional de Pharmacovigilance de Nancy – e-mail : crpv@chru-nancy.fr

Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Oder Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la santé à Luxembourg - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Tél. : (+352) 247-85592

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Neo-sabenyl aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Sie dürfen dieses Arzneimittels nach dem auf der Verpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der packung und weitere informationen.

Was Neo-Sabenyl enthält

- Der Wirkstoff ist Chlorophen 0,8 g/100 ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind Trolamin Laurylsulfat, Dinatrium Edetat, Lavendelöl, Isopropylalkohol, gereinigtes Wasser.

Wie Neo-Sabanyl aussieht und Inhalt der Packung

Glasflasche mit 200 ml und 1 l. Die 200 ml- und die 1 l- Flaschen werden mit einem 10 ml-Messbecher geliefert.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./ S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgien

Zulassungsnummer: BE048824 (200 ml und 1 l)

Art der Abgabe: Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im: 09/2022