

Notice: information de l'utilisateur

Neo-Saberyl 0,8 g/100 ml solution à diluer pour application cutanée

Chlorophène

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Neo-Saberyl et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Neo-Saberyl?
3. Comment utiliser Neo-Saberyl?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Neo-Saberyl?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Neo-Saberyl et dans quel cas est-il utilisé?

Neo-Saberyl est indiqué dans:

- Le lavage des plaies souillées ou purulentes ou de la peau infectée par un champignon (mycose).
- Le nettoyage des lésions avec croûtes et des certains ulcères (ulcères variqueux).
- L'enlèvement des bouchons de cérumen et le nettoyage de l'eczéma infecté du conduit auditif.
- Désinfection du matériel sanitaire, récipients, linge, draps, langes, vaisselle, carrelage, murs, et cetera.
- Désinfection des instruments.
- Lavage des mains, préparation du champ opératoire et désinfection obstétricale (antisepsie obstétricale).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Neo-Sabényl?

N'utilisez jamais Neo-Sabényl

Si vous êtes allergique au chlorophène ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Neo-Sabényl.

- Utilisez Neo-Sabényl dilué dans de l'eau.
- Pour obtenir le meilleur effet désinfectant (antiseptique), il est recommandé de diluer Neo-Sabényl avec de l'eau douce ou de l'eau bouillie (15 minutes),
- Évitez tout contact avec les yeux.
- Évitez l'utilisation de Neo-Sabényl sur une grande surface de peau enflammée pendant un temps prolongé.
- Le sang et le pus diminuent l'activité de Neo-Sabényl.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Neo-Sabényl».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Autres médicaments et Neo-Sabényl

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. L'éther (un liquide volatil) diminue l'activité de Neo-Sabényl.

Neo-Sabényl avec des aliments, boissons et de l'alcool

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

On évitera chez la femme enceinte d'appliquer Neo-Sabényl sur de grandes surfaces et pendant un temps prolongé.

Allaitement

On évitera chez la femme allaitante d'appliquer Neo-Sabényl sur de grandes surfaces et pendant un temps prolongé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Neo-Sabényl ne contient pas d'excipients à effet connu.

3. Comment utiliser Neo-Sabényl?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Neo-Sabenyl doit être dilué dans de l'eau avant d'être utilisé.

L'activité de Neo-Sabenyl n'est pas diminuée en présence de savon.

Usage externe.

La dose recommandée est:

- Le nettoyage des plaies, des lésions avec croûtes, des certains ulcères (ulcères variqueux), de la peau infectée par un champignon (mycose), de l'eczéma du conduit auditif et pour la désinfection obstétricale (antisepsie obstétricale): diluez 2 à 5 mesurettes (20 à 50 ml) par litre d'eau.
- Le lavage des mains, la préparation du champ opératoire et l'enlèvement des bouchons de cérumen: diluez 5 à 10 mesurettes (50 à 100 ml) par litre d'eau.
- La désinfection des récipients: diluez 2 à 4 mesurettes (20 à 40 ml) par litre d'eau.
- La désinfection des draps, linge, langes, vaisselle, carrelage, murs, et cetera.: diluez 5 à 10 mesurettes (50 à 100 ml) par 5 litres d'eau.
- La désinfection des instruments: diluez 10 à 20 mesurettes (100 à 200 ml) par litre d'eau.

Si le chromage des instruments est abîmé, on ajoutera 20 g de benzoate de soude par litre de solution de Neo-Sabenyl prête à l'emploi.

Si vous avez utilisé plus de Neo-Sabenyl que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Neo-Sabenyl, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si l'on avale accidentellement du Neo-Sabenyl, une intoxication peut se produire; elle pourra se manifester par un trouble de la vue (vision double ou diplopie), de la confusion, des convulsions, de la somnolence et des difficultés respiratoires.

Appelez immédiatement votre médecin, notamment pour prévenir toute atteinte rénale.

Si vous oubliez d'utiliser Neo-Sabenyl

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous arrêtez d'utiliser Neo-Sabenyl

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants sont possibles:

- Irritation de la peau et des muqueuses.
- Eczéma allergique de contact.
- Lorsque Neo-Sabényl est utilisé sur une peau ou des muqueuses enflammées, un effet systémique n'est pas exclu lorsqu'il est appliqué sur une grande surface et de façon prolongée. Dans ce cas, les effets secondaires suivants peuvent survenir :
 - o confusion
 - o convulsions (crampes musculaires et secousses dans tout le corps)
 - o léthargie (vous vous sentez léthargique, avez peu d'énergie et voulez beaucoup dormir)
 - o difficultés respiratoires.
 - o diplopie (vision double)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance Boîte Postale 97 - 1000 BRUXELLES Madou - Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be

Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy- e-mail : crpv@chru-nancy.fr – Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 **ou** Division de la Pharmacie et des Médicaments - Direction de la santé à Luxembourg – e-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu - Tél. : (+352) 247-85592

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament

5. Comment conserver Neo-Sabényl?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Il n'y a pas de précautions particulières de conservation. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après «EXP». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Ce que contient Neo-Sabényl

- La substance active est chlorophène 0,8 g/100 ml.
- Les autres composants sont laurylsulfate de trolamine, édétate disodique, huile essentielle de lavande, alcool isopropylique, eau purifiée.

Aspect de Neo-Sabenyl et contenu de l'emballage extérieur

Flacon en verre de 200 ml et 1 l. Les flacons de 200 ml et 1 l sont fournis avec un godet de 10 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./ S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE048824 (200 ml et 1 l)

Mode de délivrance: Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2022