

NOTICE**Endogard Plus XL Comprimés pour chiens****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovénie

Fabricant responsable de la libération des lots:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croatie
Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, France
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Endogard Plus XL Comprimés pour chiens
Praziquantel, embonate de pyrantel, fébantel

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Chaque comprimé contient :

Praziquantel	175 mg
Embonate de pyrantel	504 mg
Fébantel	525 mg

Comprimés ovales, biconvexes, à bords biseautés et présentant une ligne sur les deux faces. De couleur légèrement jaune verdâtre.

Les comprimés peuvent être divisés en deux parties égales.

4. INDICATION(S)

Pour le traitement des infestations mixtes chez les chiens adultes par les vers ronds et vers plats des espèces suivantes :

Nématodes :

Ascarides: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formes immatures tardives et formes matures)

Ankylostomes: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultes)

Cestodes :

Vers plats: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la pipérazine (présente dans plusieurs produits vermifuges pour chiens).

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

Ne pas dépasser la dose prescrite en cas de traitement de chiennes gestantes.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

De très rares cas de vomissements, avec ou sans diarrhée, peuvent se produire.

La fréquence des effets indésirables est définie en utilisant la convention suivante :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 au cours d'un traitement)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens (de grande et très grande taille).

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Pour administration orale.

Posologie :

Les doses recommandées sont : 15 mg de fébantel/kg de poids vif, 14,4 mg de pyrantel/kg de poids vif et 5 mg de praziquantel/kg de poids vif. Cela correspond à 1 comprimé par 35 kg de poids vif.

Les comprimés peuvent être divisés en deux parties égales.

Aucune restriction alimentaire n'est requise avant ou après l'administration du produit. Le(s) comprimé(s) peuvent être administrés au chien soit directement, soit mélangés à la nourriture.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour s'assurer d'un dosage correct, il est nécessaire de déterminer le poids vif de l'animal le plus précisément possible.

Pour contrôler le *Toxocara*, les chiennes allaitantes doivent recevoir une dose 2 semaines après la mise bas, et la dose doit être répétée toutes les 2 semaines jusqu'au sevrage.

En cas de forte infestation par des vers ronds, répéter la dose 14 jours plus tard.

Pour le contrôle de routine, les chiens adultes doivent être traités tous les 3 mois.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après EXP. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à chaque espèce cible : _____

Les puces sont l'hôte intermédiaire d'un type commun de ver plat, le *Dipylidium caninum*. L'infestation par le ver plat est certaine de se reproduire à moins qu'un contrôle de la présence d'hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc soit entrepris.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée chez les chiens de moins de 17,5 kg de poids vif. Chaque comprimé partiellement utilisé doit être éliminé.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Pour une bonne hygiène, les personnes qui administrent le comprimé directement à un chien ou le mélangent à la nourriture du chien, doivent se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice.

Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte :

Consulter un vétérinaire avant d'appliquer un traitement contre les vers ronds à des femelles gravides. Le produit peut être utilisé pendant la lactation.

Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les premiers deux tiers de la période de gestation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Ne pas administrer simultanément avec de la piperazine car les effets anthelmintiques du pyrantel et de la piperazine (présente dans plusieurs vermifuges produits pour chiens) peuvent avoir une action antagoniste.

L'utilisation concomitante avec d'autres composés cholinergiques peut induire une toxicité.

Surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes), si nécessaire : _____

Le produit est bien toléré chez les chiens. Des études de sécurité ont montré que des doses correspondant à cinq fois la dose recommandée peuvent causer des vomissements occasionnels.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Mai 2020

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 2 comprimés (1 plaquette de 2 comprimés)
Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 4 comprimés (2 plaquettes de 2 comprimés)
Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 10 comprimés (1 plaquette de 10 comprimés)
Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 12 comprimés (2 plaquettes de 6 comprimés)
Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 24 comprimés (4 plaquettes de 6 comprimés)

Plaquette d’Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 30 comprimés (3 plaquettes de 10 comprimés ou 5 plaquettes de 6 comprimés)

Plaquette d’Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 50 comprimés (5 plaquettes de 10 comprimés)

Plaquette d’Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 60 comprimés (10 plaquettes de 6 comprimés ou 6 plaquettes de 10 comprimés)

Plaquette d’Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 100 comprimés (10 plaquettes de 10 comprimés)

Plaquette d’Alu-Alu imprimé et perforé: boîte de 102 comprimés (17 plaquettes de 6 comprimés).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V392104

Sur délivrance libre

Distributeur:

Virbac Belgium S.A.

Avenue Esperanto 4

BE-3001 Louvain

***Seulement pour l'emballage de 60 comprimés**

1 par 35 kg

TAMPON DU CABINET

Nom du propriétaire:.....

.....

Nom de l'animal:.....

.....

Dosage:.....

.....