

NOTICE

1. Nom du médicament vétérinaire

Endogard Plus Flavour Comprimés pour chiens

2. Composition

Chaque comprimé contient :

Praziquantel	50 mg
Embonate de pyrantel	144 mg
Fébantel	150 mg

Comprimés ronds, biconvexes, jaunes avec des taches plus foncées visibles, rayées avec une ligne en forme de croix d'un côté. Les comprimés peuvent être divisés en deux ou quatre parties égales.

3. Espèces cibles

Chiens (de petite taille et de moyenne taille).

4. Indications d'utilisation

Pour le traitement des infections mixtes chez les chiens adultes et les chiots causées par les vers ronds et les vers plats des espèces suivantes :

Nématodes :

Ascarides: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formes immatures tardives et formes matures)

Ankylostomes : *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultes)

Cestodes :

Vers plats : *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*.

5. Contre-indications

Ne pas utiliser simultanément avec des composés de la pipérazine.

Ne pas dépasser la dose prescrite en cas de traitement de chiennes gestantes.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 2 kg.

6. Mises en gardes particulières

Précautions particulières:

Les puces sont l'hôte intermédiaire d'un type commun de ver plat, le *Dipylidium caninum*.

L'infestation par le ver plat est certaine de se reproduire à moins qu'un contrôle de la présence d'hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc soit entrepris.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles:

Chaque comprimé partiellement utilisé doit être éliminé.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Pour une bonne hygiène, les personnes qui administrent le comprimé directement à un chien ou le mélangent à la nourriture du chien, doivent se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez conseil à un médecin et montrez-lui la notice.

Gestation:

Ne pas utiliser chez les chiennes pendant les premiers deux tiers de la période de gestation.

Consulter un vétérinaire avant d'appliquer un traitement contre les vers ronds à des femelles gravides.

Lactation:

Le produit peut être utilisé pendant la lactation (voir "Contre-indications" et "Indications nécessaires à une administration correcte").

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions:

Ne pas administrer simultanément avec de la piperazine car les effets anthelminthiques du pyrantel et de la piperazine (présente dans plusieurs médicaments vétérinaires vermifuges pour chiens) peuvent avoir une action antagoniste.

L'utilisation concomitante avec d'autres composés cholinergiques peut induire une toxicité.

Surdosage:

Les benzimidazoles présentent une grande marge de sécurité. Le pyrantel n'est pas absorbé systématiquement à chaque mesure. Le praziquantel possède aussi une grande marge de sécurité jusqu'à cinq fois la dose recommandée.

7. Effets indésirables

Chiens:

Rare (1 à 10 animaux / 10 000 animaux traités):	Des selles molles ¹ , diarrhées ^{1,2} , vomissements ^{1,2}
--	---

¹Chez chiots: transitoire.

²Chez les chiens adultes: très rares cas de vomissements, avec ou sans diarrhée

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire. Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en utilisant les coordonnées figurant à la fin de cette notice, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification: adversedrugreactions_vet@fagg-afmps.be.

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration

Voie orale.

Posologie

Les doses recommandées sont : 15 mg de fébantel/kg de poids vif, 14,4 mg de pyrantel/ kg de poids vif et 5 mg de praziquantel/kg de poids vif. Cela correspond à 1 comprimé par 10 kg de poids vif.

Les comprimés peuvent être divisés en deux /quatre parties égales pour permettre un dosage correct.

Le(s) comprimé(s) peuvent être administrés au chien soit directement, soit mélangés à la nourriture. Aucune restriction alimentaire n'est requise avant ou après l'administration du médicament vétérinaire.

9. Indications nécessaires à une administration correcte

Pour s'assurer d'un dosage correct, il est nécessaire de déterminer le poids vif de l'animal le plus précisément possible.

Les chiots peuvent être vermifugés avec ce médicament vétérinaire dès qu'ils sont âgés de 2 semaines, et ce toutes les deux semaines jusqu'à l'âge de 12 semaines. Ensuite, ils doivent être traités à des intervalles de 3 mois. Il est recommandé de traiter simultanément la chienne et les chiots.

Pour contrôler le *Toxocara*, les chiennes allaitantes doivent recevoir une dose 2 semaines après la mise bas, et toutes les 2 semaines jusqu'au sevrage.

Pour le contrôle de routine, une dose unique est recommandée à des intervalles de 3 mois.

En cas de forte infestation par des vers ronds, répéter la dose 14 jours plus tard.

10. Temps d'attente

Sans objet.

11. Précautions particulières de conservation

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte après Exp.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. Précautions particulières d'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser des dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable. Ces mesures devraient contribuer à protéger l'environnement.

Demandez à votre vétérinaire ou à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin.

13. Classification des médicaments vétérinaires

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance

14. Numéros d'autorisation de mise sur le marché et présentations

BE-V392095

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 2 comprimés (1 plaquette de 2 comprimés)

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 4 comprimés (2 plaquettes de 2 comprimés)

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 10 comprimés (1 plaquette de 10 comprimés)

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 30 comprimés (3 plaquettes de 10 comprimés)

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 50 comprimés (5 plaquettes de 10 comprimés)

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 100 comprimés (10 plaquettes de 10 comprimés)

Plaquette d'Alu-Alu imprimé et perforé : boîte de 300 comprimés (30 plaquettes de 10 comprimés).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

15. Date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois

Juin 2025

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. CoordonnéesTitulaire de l'autorisation de mise sur le marché

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

Fabricant responsable de la libération des lots:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croatie

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065 M LID, 06516 Carros Cedex, France

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovénie

Représentants locaux et coordonnées pour notifier les effets indésirables présumés:

VIRBAC BELGIUM NV, Esperantolaan 4, BE-3001 Leuven

Tél : +32-(0)16 387 260

phv@virbac.be

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

17. Autres informations

*Valable que pour l'emballage de 100 comprimés

1 par 10 kg

TAMPON DU CABINET

Nom propriétaire :

.....

Nom de l'animal :

.....

Dosage :

.....