

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

**Sildenafil Viatris 25 mg Filmtabletten**  
**Sildenafil Viatris 50 mg Filmtabletten**  
**Sildenafil Viatris 100 mg Filmtabletten**  
Sildenafil

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Sildenafil Viatris und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sildenafil Viatris beachten?
3. Wie ist Sildenafil Viatris einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sildenafil Viatris aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Sildenafil Viatris und wofür wird es angewendet?**

Sildenafil Viatris gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln mit der Bezeichnung Phosphodiesterase-Typ-5 (PDE-5)-Hemmer. Es wirkt, indem es bei sexueller Erregung die Entspannung der Blutgefäße in Ihrem Penis unterstützt. Dadurch kann Blut leichter in den Penis fließen. Sildenafil Viatris wird Ihnen nur dann zu einer Erektion verhelfen, wenn Sie sexuell stimuliert werden.

Sildenafil Viatris dient zur Behandlung der erektilen Dysfunktion beim erwachsenen Mann, die manchmal auch als Impotenz bezeichnet wird. Diese liegt vor, wenn ein Mann keinen für die sexuelle Aktivität ausreichend harten, aufgerichteten Penis bekommen oder beibehalten kann.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sildenafil Viatris beachten?**

##### **Sildenafil Viatris darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Sildenafil oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Nitrate genannt werden, da die Kombination zu einem gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks führen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen, die häufig zur Linderung der Beschwerden bei Angina pectoris (oder „Brustschmerzen“) verordnet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die als Stickstoffmonoxid-Donatoren bekannt sind, wie Amylnitrit („Poppers“), da auch diese Kombination einen gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks bewirken kann
- wenn Sie Riociguat einnehmen. Dieses Arzneimittel wird zur Behandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie (d. h. Bluthochdruck in der Lunge) und chronischer thromboembolischer pulmonaler Hypertonie (d. h. Bluthochdruck in der Lunge infolge von Blutgerinnseln) angewendet. Es hat sich gezeigt, dass PDE-5-Hemmer wie Sildenafil die

blutdrucksenkende Wirkung dieses Arzneimittels verstärken. Wenn Sie Riociguat einnehmen oder sich nicht sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

- wenn Sie eine schwere Herz- oder Lebererkrankung haben
- wenn Sie vor Kurzem einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten, oder wenn Sie einen niedrigen Blutdruck haben
- wenn Sie bestimmte seltene erbliche Augenerkrankungen haben (wie *Retinitis pigmentosa*)
- wenn Sie bereits einmal einen Sehverlust aufgrund einer nicht arteriitischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) hatten.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sildenafil Viatris einnehmen,

- wenn Sie eine Sichelzellenanämie (Veränderung der roten Blutkörperchen), Leukämie (Blutkrebs) oder multiples Myelom (Knochenmarkkrebs) haben
- wenn Sie eine Deformation Ihres Penis oder Peyronie-Krankheit haben
- wenn Sie Herzprobleme haben. Ihr Arzt soll sorgfältig überprüfen, ob Ihr Herz der zusätzlichen Beanspruchung durch Geschlechtsverkehr gewachsen ist
- wenn Sie zurzeit ein Magengeschwür haben, oder wenn eine Störung der Blutgerinnung (wie z. B. Hämophilie) vorliegt.
- wenn Sie eine plötzliche Abnahme oder einen Verlust der Sehkraft bemerken, brechen Sie die Behandlung mit Sildenafil Viatris ab und benachrichtigen Sie sofort einen Arzt.

Sie dürfen Sildenafil Viatris nicht gleichzeitig mit Sildenafil-haltigen Arzneimitteln zur Behandlung von hohem Blutdruck in den Blutgefäßen der Lunge (pulmonale arterielle Hypertonie, PAH) oder mit irgendwelchen anderen PDE5-Hemmern anwenden.

Sie dürfen Sildenafil Viatris nicht einnehmen, wenn Sie keine Erektionsstörung haben.

Sie dürfen Sildenafil Viatris nicht einnehmen, wenn Sie eine Frau sind.

#### Kinder und Jugendliche

Sildenafil Viatris darf von Personen unter 18 Jahren nicht eingenommen werden.

#### Besondere Überlegungen für Patienten mit Nieren- oder Lebererkrankungen

Sie sollten Ihren Arzt informieren, falls Sie eine Funktionsstörung der Nieren oder der Leber haben. Ihr Arzt wird entscheiden, ob für Sie eine niedrigere Dosierung nötig ist.

### **Einnahme von Sildenafil Viatris zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Sildenafil Viatris Tabletten und manche Arzneimittel können sich gegenseitig beeinflussen, insbesondere solche, die zur Behandlung von Brustschmerzen eingesetzt werden. Bei einem medizinischen Notfall sollten Sie dem medizinischen Fachpersonal, das Sie behandelt, sagen, dass Sie Sildenafil Viatris eingenommen haben und wann Sie es eingenommen haben. Nehmen Sie Sildenafil Viatris nicht während der Behandlung mit anderen Arzneimitteln ein, wenn Ihr Arzt Ihnen nicht ausdrücklich sagt, dass Sie dies tun können.

Sie dürfen Sildenafil Viatris nicht einnehmen, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Nitrate genannt werden, oder Nicorandil (ein Nitrat-ähnliches Arzneimittel), da die Kombination dieser Arzneimittel zu einem gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks führen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen, die häufig zur Linderung der Beschwerden bei Angina pectoris (oder „Brustschmerzen“) verordnet werden.

Sie dürfen Sildenafil Viatris nicht einnehmen, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die als Stickstoffmonoxid-Donatoren bekannt sind, wie Amylnitrit („Poppers“), da auch diese Kombination zu einem gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks führen kann.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie bereits Riociguat einnehmen.

Wenn Sie als Protease-Hemmstoffe bekannte Arzneimittel einnehmen, wie sie zur Behandlung der HIV-Infektion eingesetzt werden, wird Ihr Arzt die Behandlung möglicherweise mit der niedrigsten Sildenafil Viatris -Dosis (25 mg) beginnen.

Bei einigen Patienten, die Alphablocker zur Behandlung von Bluthochdruck oder Prostatavergrößerung einnehmen, kann es zu Schwindelgefühl und Benommenheit kommen, die durch einen zu niedrigen Blutdruck beim raschen Aufsetzen oder Aufstehen verursacht sein können. Einige Patienten hatten derartige Beschwerden, wenn sie Sildenafil zusammen mit Alphablockern verwendeten. Zumeist geschieht dies innerhalb von 4 Stunden nach der Einnahme von Sildenafil Viatris. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass derartige Beschwerden bei Ihnen auftreten, sollten Sie Ihren Alphablocker in einer regelmäßigen Tagesdosis einnehmen, bevor Sie Sildenafil Viatris nehmen. Ihr Arzt wird Ihnen in einem solchen Fall möglicherweise eine niedrigere Anfangsdosis (25 mg) Sildenafil Viatris verordnen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen einzunehmen, die Sacubitril/Valsartan enthalten und zur Behandlung von Herzinsuffizienz verwendet werden.

### **Einnahme von Sildenafil Viatris zusammen mit Nahrungsmitteln und Alkohol**

Sildenafil Viatris kann mit oder ohne Nahrung eingenommen werden (siehe Abschnitt 3 „Wie ist Sildenafil Viatris einzunehmen?“). Sie werden aber möglicherweise feststellen, dass es länger dauert, bis Sildenafil Viatris wirkt, wenn Sie es mit einer reichhaltigen Mahlzeit einnehmen.

Alkoholgenuss kann vorübergehend die Fähigkeit herabsetzen, eine Erektion zu erreichen. Um den bestmöglichen Nutzen von Ihrem Arzneimittel zu erhalten, sollten Sie keine übermäßigen Mengen Alkohol trinken, bevor Sie Sildenafil Viatris einnehmen.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Sildenafil Viatris ist nicht zur Anwendung bei Frauen bestimmt.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Sildenafil Viatris kann Schwindel verursachen und das Sehvermögen beeinflussen. Achten Sie darauf, wie Sie auf die Einnahme von Sildenafil Viatris reagieren, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen.

### **Sildenafil Viatris enthält Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

## **3. Wie ist Sildenafil Viatris einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 50 mg.

**Nehmen Sie Sildenafil Viatris nicht häufiger als einmal am Tag ein.**

Sie sollten Sildenafil Viatris ungefähr 1 Stunde vor dem beabsichtigten Geschlechtsverkehr einnehmen. Schlucken Sie die Tablette unzerkaut und trinken Sie dazu ein Glas Wasser.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Sildenafil Viatris zu stark oder zu schwach ist. Sildenafil Viatris wird Ihnen nur dann zu einer Erektion verhelfen, wenn Sie sexuell stimuliert werden. Der Zeitraum bis zum Wirkungseintritt von Sildenafil Viatris ist von Patient zu Patient verschieden, er liegt üblicherweise bei ½ - 1 Stunde. Sie werden möglicherweise feststellen, dass es länger dauert, bis Sildenafil Viatris wirkt, wenn Sie es mit einer reichhaltigen Mahlzeit einnehmen.

Sie sollten Ihren Arzt unterrichten, falls Sildenafil Viatris bei Ihnen keine Erektion auslöst oder die Erektion nicht ausreichend lange anhält, um den Geschlechtsverkehr zu vollenden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Sildenafil Viatris eingenommen haben, als Sie sollten** Nebenwirkungen können häufiger auftreten und schwerwiegender sein. Dosen von mehr als 100 mg erhöhen die Wirksamkeit nicht.

*Nehmen Sie keine höhere Dosis als diejenige ein, die Ihnen Ihr Arzt verordnet hat.*

Wenn Sie eine größere Menge von Sildenafil Viatris eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Die Nebenwirkungen, die in Verbindung mit Sildenafil Viatris beschrieben werden, sind zumeist leicht bis mäßig und von kurzer Dauer.

**Wenn Sie eine der folgenden schweren Nebenwirkungen feststellen, brechen Sie die Einnahme von Sildenafil Viatris ab und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe:**

**Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen):**

- Eine allergische Reaktion  
Symptome umfassen plötzlich pfeifende Atmung, Atembeschwerden oder Schwindel, Schwellung von Augenlidern, Gesicht, Lippen oder Rachen.
- Schmerzen in der Brust  
Wenn dies während oder nach dem Geschlechtsverkehr auftritt, begeben Sie sich in eine halb sitzende Position und versuchen Sie, sich zu entspannen.  
**Verwenden Sie keine Nitrate**, um Ihre Brustschmerzen zu lindern.

**Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen):**

- Anhaltende und manchmal schmerzhaftere Erektion  
Wenn Sie eine Erektion haben, die länger als 4 Stunden anhält, müssen Sie sich sofort an einen Arzt wenden.
- Ein plötzlich eingeschränktes oder ausfallendes Sehvermögen
- Schwere Hautreaktionen

Mögliche Symptome sind starkes Abschälen und Anschwellen der Haut, Blasenbildung an Mund, Genitalien und um die Augen, Fieber.

- Krampfanfälle oder Konvulsionen.

**Weitere gemeldete Nebenwirkungen:**

**Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Personen betreffen):**

- Kopfschmerzen.

**Häufig (kann bis zu 1 von 10 Personen betreffen):**

- Übelkeit, Gesichtsrötung, Hitzewallungen (Symptome umfassen ein plötzliches Wärmegefühl in Ihrem Oberkörper), Verdauungsstörungen, Beeinflussung des Sehvermögens (einschließlich Störungen des Farbsehens wie Blausehen, verschwommenes Sehen, Sehstörung), verstopfte Nase und Schwindel.

**Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen):**

- Erbrechen, Hautausschläge, Augenreizung, blutunterlaufene/gerötete Augen, Augenschmerzen, Sehen von Lichtblitzen, verstärktes Helligkeitsempfinden, Lichtempfindlichkeit, tränende Augen, Herzklopfen, Herzjagen, hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, Muskelschmerzen, Schläfrigkeit, vermindertes Tastgefühl, Drehschwindel, Ohrensausen, Mundtrockenheit, verstopfte Nebenhöhlen, Entzündung der Nasenschleimhaut (Symptome umfassen laufende Nase, Niesen und verstopfte Nase), Schmerzen im Oberbauch, gastroösophageale Refluxkrankheit (Symptome umfassen Sodbrennen), Schmerzen in den Armen oder Beinen, Nasenbluten, Vorhandensein von Blut im Harn, Hitzeempfinden und Müdigkeit.

**Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen):**

- Ohnmacht, Schlaganfall, Herzinfarkt, unregelmäßiger Herzschlag, vorübergehend verminderte Durchblutung von Teilen des Gehirns, Gefühl von Beklemmung im Rachen, Taubheitsgefühl im Mund, Blutungen im Augenhintergrund, Doppeltsehen, verminderte Sehschärfe, anormales Gefühl im Auge, Schwellung von Auge oder Augenlid, kleine Partikel oder Punkte in Ihrem Gesichtsfeld, Sehen von Halos um Lichter, Erweiterung der Pupille des Auges, Verfärbung des Augenweißes, Penisblutung, Vorhandensein von Blut im Sperma, trockene Nase, Schwellung der Nasenschleimhaut, Reizbarkeit, plötzliche Schwerhörigkeit oder Taubheit.

Bei der Anwendungsbeobachtung nach der Markteinführung wurden selten Fälle von instabiler Angina pectoris (einer Herzerkrankung) und plötzliche Todesfälle gemeldet. Dabei ist bemerkenswert, dass die meisten, aber nicht alle der Männer, bei denen diese Nebenwirkungen auftraten, vor Einnahme des Arzneimittels Herzerkrankungen aufwiesen. Es ist nicht möglich zu beurteilen, ob diese Ereignisse in direktem Zusammenhang mit Sildenafil standen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte  
Abteilung Vigilanz  
Postfach 97  
1000 Brussel  
Madou

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

### Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy  
oder Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Sildenafil Viatris aufzubewahren?**

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
- Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Sildenafil Viatris enthält**

- Der Wirkstoff ist: Sildenafil. Jede Tablette enthält 25 mg, 50 mg oder 100 mg Sildenafil (als Sildenafil-Citrat).
- Die sonstigen Bestandteile sind:
  - Tablettenkern: mikrokristalline Cellulose, wasserfreies Calciumhydrogenphosphat, Croscarmellose-Natrium (Siehe Abschnitt 2, „Sildenafil Viatris enthält Natrium“), Magnesiumstearat.
  - Filmüberzug: Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Indigocarmin Aluminiumsalz (E132), Triacetin.

### **Wie Sildenafil Viatris aussieht und Inhalt der Packung**

Die 25-mg-Tabletten sind blaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „M“ auf einer Seite und „SL“ über „25“ auf der anderen Seite.

Die 50-mg-Tabletten sind blaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „M“ auf einer Seite und „SL“ über „50“ auf der anderen Seite.

Die 100-mg-Tabletten sind blaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „M“ auf einer Seite und „SL“ über „100“ auf der anderen Seite.

Sildenafil Viatris 25 mg Filmtabletten sind in Blisterpackungen mit 1, 2, 4, 8 oder 12 Tabletten.

Sildenafil Viatris 50 mg und 100 mg Filmtabletten sind in Blisterpackungen mit 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 oder 48 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

*Pharmazeutischer Unternehmer:*

Viatrix GX  
Terhulpesteenweg 6A  
B-1560 Hoeilaart

*Hersteller:*

Gerard Laboratories  
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road  
Dublin 13  
Irland

Mylan Hungary Kft  
H-2900 Komarom  
Mylan utca 1  
Ungarn

Mylan Germany GmbH  
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe  
Benzstrasse 1  
Bad Homburg v. d. Hoehe, Hessen, 61352  
Deutschland

**Zulassungsnummern**

BE:

25 mg: BE383257

50 mg: BE383266

100 mg: BE383275

LU:

25 mg: 2013110421

50 mg: 2013110422

100 mg: 2013110423

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Belgien: Sildenafil Viatrix 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten

Zypern: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Tschechische Republik: Sildenafil Viatrix

Dänemark: Sildenafil Viatrix

Frankreich: Sildenafil Viatrix 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimé pelliculé

Deutschland: duraviril 50 mg, 100 mg Filmtabletten

Griechenland: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Ungarn: Sildenafil Viatrix 100 mg filmtableta

Island: Sildenafil Viatrix 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmuhúðaðar töflur

Irland: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Italien: Sildenafil Mylan

Luxemburg: Sildenafil Viatrix 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés

Malta: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Norwegen: Sildenafil Viatrix

Portugal: Sildenafil Mylan

Slowakei: Sildenafil Viatrix 50 mg / 100 mg

Slowenien: Sildenafil Viatrix 50 mg, 100 mg filmsko obložene tablete

Spanien: Sildenafil Viatrix 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con película

Niederlande: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmomhulde tabletten

Vereinigtes Königreich (Nordirland): Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Packungsbeilage

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 03/2023.  
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 06/2023.**