

PACKUNGSBEILAGE**1. Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Panacur 250 mg Tabletten für Hunde und Katzen

2. Zusammensetzung

Pro Tablette:

Wirkstoff :

Fenbendazol 250 mg

Weiß bis grauweiße, längliche Tabletten mit Bruchkerbe.

3. Zieltierart(en)

Hund und Katze.

4. Anwendungsgebiet(e)

Zur Behandlung von Hunden und Katzen, die mit adulten und unreifen Formen von Magen-Darm-Spulwürmern, Hakenwürmern, Peitschenwürmern und Bandwürmern infiziert sind.

Zur Prävention und Bekämpfung von *Giardia* Infektionen bei Hunden.

Beim Hund: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Giardia*.

Bei der Katze: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Ollulanus*, *Aelurostrongylus*.

5. Gegenanzeigen

Keine.

6. Besondere Warnhinweise

Besondere Warnhinweise:

Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Nach Gebrauch Hände waschen.

Trächtigkeit und Laktation:

Verhütung und Behandlung von Darm- und Hakenwurminfektionen bei neugeborenen Welpen durch Verabreichung von Medikamenten an die Hündin in der späten Trächtigkeit (nach dem 40. Tag) und in der frühen Laktation.

Da teratogene Wirkungen bei Hunden und Katzen in sehr seltenen Fällen nicht vollständig ausgeschlossen werden können, sollte die Behandlung bis zum 40. Tag der Trächtigkeit auf der Grundlage einer Nutzen-Risiko-Bewertung durch den zuständigen Tierarzt erfolgen.

7. Nebenwirkungen

Hund

Selten (1 bis 10 Tiere / 10.000 behandelte Tiere):	Magen-Darm-Erkrankungen (wie Erbrechen und Durchfall ¹⁾)
Sehr selten (< 1 Tier/10 000 behandelte Tiere, einschließlich Einzelfallberichte):	Allergische Reaktionen

¹Durchfall ist normalerweise mild.

Katze

Sehr selten (< 1 Tier/10 000 behandelte Tiere, einschließlich Einzelfallberichte):	Magen-Darm-Erkrankungen (wie Erbrechen und Durchfall ¹⁾)
--	--

¹Durchfall ist normalerweise mild.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Zulassungsinhaber oder den örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem [{Details zum nationalen System}](#) melden.

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Orale Anwendung.

Zur Behandlung von klinische Wurminfektionen bei erwachsenen Hunden und Katzen oder abgestellten Hunde-Welpen und Kätzchen junger als 6 Monate und für die Prävention und Bekämpfung von *Giardia* Infektionen bei Hunden beträgt die Dosis 50 mg pro kg Körpergewicht an 3 aufeinanderfolgenden Tagen.

Körpergewicht	Dosierung
2,5 kg	½ Tablette pro Tag während 3 Tagen
5 kg	1 Tablette pro Tag während 3 Tagen
7,5 kg	1 ½ Tabletten pro Tag während 3 Tagen
10 kg	2 Tabletten pro Tag während 3 Tagen

Für die routinemäßige Behandlung erwachsener Hunde beträgt die Grunddosis 100 mg Fenbendazol pro kg Körpergewicht in einer Einzeldosis.

Körpergewicht	Dosierung
2,5 kg	1 Tablette
5 kg	2 Tabletten
7,5 kg	3 Tabletten
10 kg	4 Tabletten

Eine routinemäßige vorbeugende Behandlung erwachsener Tiere mit minimaler Infektionsexposition kann zwei- bis viermal pro Jahr durchgeführt werden. Für Hunde in Zwingern wird eine häufigere Behandlung im Abstand von 6 bis 8 Wochen empfohlen.

9. Hinweise für die richtige Anwendung

Für Hunde: Tabletten zerkleinern und über das Futter verabreichen oder in Wasser auflösen und mit dem Futter vermischen.

Für Katzen: Tabletten in Wasser auflösen und mit etwas Futter vermischen.

Die alleinige Verabreichung der Tabletten gelöst in etwas Wasser wird nicht empfohlen.

Eine Unterdosierung kann zu einer unwirksamen Anwendung führen und die Entwicklung von Resistenzen fördern.

Um eine korrekte Dosierung zu gewährleisten, sollte das Körpergewicht so genau wie möglich ermittelt werden.

10. Wartezeiten

Nicht zutreffend.

11. Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Unter 25°C lagern.

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nach „Exp.“ nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Das Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen, da Fenbendazol eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

Nutzen Sie Rücknahmesysteme für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder daraus entstandener Abfälle nach den örtlichen Vorschriften und die für das betreffende Tierarzneimittel geltenden nationalen Sammelsysteme. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

13. Einstufung von Tierarzneimitteln

Tierarzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

14. Zulassungsnummern und Packungsgrößen

BE-V143981

Schachtel mit 10 Tabletten in Blisterverpackung.

Schachtel mit 20 Tabletten in Blisterverpackung.

Schachtel mit 50 Tabletten in Blisterverpackung.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

15. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage

November 2024

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel sind in der Produktdatenbank der Europäischen Union verfügbar (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. KontaktangabenZulassungsinhaber:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Die Niederlande

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, 1210 Wenen, Österreich

Örtlicher Vertreter und Kontaktdaten zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

MSD Animal Health Belgium

Tel: + 32 (0)2 370 94 01